

18. e. 9.

St. Thomas's Hospital
Library.

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21305729_0002

KING'S College LONDON

TOMMIS QP31 REL

Library

RELHERAND, ANTHELME
NOUVEAUX ÉLÉMENS DE
PHYSIOLOGIE
1825

201108861 X

KING'S COLLEGE LONDON

12.e.9.

Stuart

NOUVEAUX ÉLÉMENS

DE

PHYSIOLOGIE.

Presented to the Library by
John D. Stuart

PARIS. — DE L'IMPRIMERIE DE RIGNOUX,
rue des Francs-Bourgeois-S.-Michel, n° 8.

18.e.9.

NOUVEAUX ÉLÉMENS

DE

PHYSIOLOGIE,

PAR

M. LE CHEVALIER RICHERAND,

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, Chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Louis, Chirurgien-Consultant du Roi, Chevalier de ses ordres, etc., Membre de la plupart des Sociétés savantes, nationales et étrangères.

NEUVIÈME ÉDITION,

REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE.

Γνῶθι σεαυτον.
Connois-toi toi-même.

TOME SECOND.

PARIS,

BÉCHET JEUNE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,
place de l'École de Médecine, n° 4.

1825.

736929
TOMKA

NOUVEAUX ÉLÉMENS

DE

PHYSIOLOGIE.

PREMIÈRE CLASSE.

SECOND ORDRE.

FONCTIONS DE RELATION.

Fonctions qui servent à la conservation de l'individu, en établissant ses rapports avec les êtres qui l'environnent.

CHAPITRE VII.

Des Sensations.

CXII. Nous avons vu, dans le premier volume de cet ouvrage, de quelle manière le corps de l'homme, essentiellement destructible et altérable, s'entretient dans son économie naturelle,

s'accroît et se répare en assimilant à sa propre substance des principes puisés dans les alimens qu'il digère et dans l'air qu'il respire. Nous allons maintenant examiner par l'action de quels organes l'homme soutient, avec toute la nature, les relations nécessaires à son existence; comme il est averti de la présence des objets qu'il a intérêt de connoître, à la faveur de quels moyens il établit entre eux et lui les rapports convenables, les attire ou les repousse, s'en approche ou s'en éloigne et les fuit, suivant les dangers qu'ils lui font courir, ou les jouissances qu'ils lui promettent.

L'homme possède dans toute sa plénitude ce nouveau mode d'existence refusé aux végétaux; de tous les animaux, il est celui qui ressent les impressions les plus nombreuses et les plus variées, que plus de sensations assiégent, qui combine le mieux ses émotions, matériaux de sa pensée et sources de son intelligence; il est le mieux organisé pour ressentir l'action de tous les êtres, et réagir à son tour sur tout ce qui l'affecte par des moyens puissans et multipliés. Dans l'étude que nous allons entreprendre, nous verrons plusieurs instrumens placés aux limites de l'existence, à la surface de l'être vivant, prêts à recevoir toutes les impressions; des conducteurs tendus entre ces instrumens, et un centre commun auquel tous vont se rendre, avec lequel tous communiquent; conducteurs au moyen desquels cet organe central détermine les mouvemens qui tantôt transportent

le corps d'un lieu dans un autre (*locomotion*); tantôt changent seulement la situation relative des parties (*mouvemens partiels*); d'autres fois établissent dans les organes certaines dispositions d'où naissent la voix et les diverses espèces de langage.

CXIII. Pour bien entendre le mécanisme de l'action des objets extérieurs sur notre corps, il faut suivre la succession naturelle des phénomènes du sentiment; étudier d'abord les corps qui produisent l'impression sensitive; examiner ensuite les organes qui l'éprouvent, puis les conducteurs qui la transmettent à un centre particulier chargé de la percevoir. Prenant le sens de la vue pour exemple, on ne saura jamais comment la lumière agit pour nous procurer la connaissance de certaines qualités des corps, si l'on ignore les lois auxquelles ce fluide obéit, si l'on n'a aucune idée de la conformation des yeux qu'il affecte, des nerfs qui établissent communication entre ces organes et le cerveau, ni de ce viscère lui-même, auquel les sensations, ou plutôt les mouvemens qui les constituent viennent aboutir.

CXIV. *De la lumière.* Aujourd'hui le plus grand nombre des physiciens la regardent comme un fluide que son extrême subtilité rend impalpable. Plusieurs pensent qu'elle n'est qu'une modification du calorique ou de la matière de la chaleur, et cette dernière opinion a acquis une grande vraisemblance depuis les dernières observations d'Her-

schel (1). Nous n'examinerons point si, comme le pensent Descartes et ses sectateurs, la lumière, composée de molécules arrondies, existe par elle-même, uniformément répandue dans l'espace; ou si, comme on le croit généralement d'après Newton, elle n'est qu'une émanation du soleil et des étoiles fixes, qui lancent de tous côtés une portion de leur substance, sans s'épuiser jamais par cette continuelle effusion. Il suffit de savoir : 1° que les rayons de ce fluide se meuvent avec une telle vitesse, que la lumière peut, en une seconde, franchir une distance de soixante-douze mille lieues, puisque, suivant les calculs de Roëmer et les tables de Cassini, elle parcourt en sept à huit minutes les trente trois millions de lieues qui nous séparent du soleil ; 2° que la lumière se

---

(1) Ce célèbre astronome a publié, dans le volume des Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, pour l'an 1800, une série d'expériences qui prouvent que les rayons diversement colorés échauffent plus ou moins les corps sur lesquels on les dirige, et que le rayon rouge, qui est de tous le moins réfrangible, est aussi celui qui donne le plus de chaleur.

Le thermomètre placé au delà du spectre solaire, du côté du rayon rouge, dans un endroit où devroient tomber des rayons encore moins réfrangibles que lui, s'il en existoit de visibles, monte plus haut que lorsqu'il étoit placé dans cette couleur : d'où Herschel conclut qu'il émane du soleil des rayons trop peu réfrangibles pour produire la sensation de la lumière et des couleurs, mais qui produisent la sensation de la chaleur.

nomme *directe*, lorsqu'elle vient du corps lumineux à l'œil sans rencontrer aucun obstacle; *réfléchie*, lorsqu'elle est renvoyée à cet organe par un corps opaque; *réfractée*, quand sa direction a été changée en traversant des milieux transparens de densité inégale; 3° qu'un rayon lumineux est réfléchi sous un angle égal à celui d'incidence; que celui qui traverse un corps transparent, diaphane ou perméable à la lumière, éprouve une déviation d'autant plus forte en se rapprochant de la ligne perpendiculaire, que la surface du corps est plus convexe, qu'il a plus de densité, et qu'il est formé d'élémens plus combustibles. En effet, les corps qui peuvent brûler sont, toutes choses égales d'ailleurs, de plus puissans réfringens que les corps incombustibles. C'est d'après cette curieuse observation que Newton a deviné la combustibilité du diamant, et l'existence d'un principe combustible dans l'eau, depuis mise hors de doute dans les belles expériences de la chimie moderne. 4° Qu'un rayon de lumière réfracté par le moyen d'un prisme de verre se décompose en sept rayons, qui sont le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, le pourpre et le violet. Chacun de ces rayons est d'autant moins réfrangible, qu'il est plus voisin du rouge. Ce rayon est, de tous, celui qui frappe les yeux avec le plus de force, et qui produit sur la rétine les plus vives impressions. On sait avec quel empressement les peuples sauvages recherchent les étoffes teintes de cette cou-

leur. Chez presque tous les peuples, elle teignit le manteau des rois : de toutes, elle est la plus vive, la plus éclatante; les yeux de quelques animaux paroissent la supporter avec peine. J'ai vu plusieurs maniaques dont la fureur, depuis long-temps assoupie, se réveilloit infailliblement à l'aspect d'un drap rouge ou d'une personne vêtue de cette couleur. La couleur verte est, au contraire, la plus douce, la plus constamment agréable, celle qui fatigue le moins la vue, et sur laquelle les yeux se reposent plus long-temps et plus volontiers : aussi la nature a-t-elle prodigué le vert dans la coloration de toutes les plantes ; elle a teint, en quelque manière, de cette couleur, la plus grande partie de la surface du globe. Lorsque les yeux supportent mal l'éclat d'une trop vive lumière, on en modère l'impression par l'usage des verres teints en vert, à travers lesquels tous les objets paroissent nuancés de cette couleur. Enfin, le rayon violet, placé au bas de l'échelle dont le vert occupe le milieu, est de tous le plus foible, le plus réfrangible, ou qui cède le plus aisément aux puissances réfringentes, et se dévie avec le plus de facilité. De toutes les couleurs, le violet a le moins d'éclat; les formes ressortent moins avantageusement; les saillies s'effacent couvertes de cette teinte : aussi les peintres l'emploient-ils avec modération dans leurs tableaux. Lorsqu'un corps éclairé réfléchit tous les rayons, les sensations qu'ils peuvent produire séparément se con-

fondent dans la sensation du blanc; s'il n'en réfléchit que certains, le corps paroît diversement coloré, suivant les rayons qui sont renvoyés; enfin, si tous sont absorbés, il en naît la sensation du noir, qui n'est que la négation de toutes les couleurs. Un corps noir est plongé dans une obscurité profonde, et ne s'aperçoit que par l'éclat des corps environnans. 5° De chaque point de la surface d'un corps lumineux ou éclairé part un grand nombre de rayons qui s'en éloignent en divergeant avec une force progressivement décroissante; de manière que ces rayons, s'écartant d'autant plus de la perpendiculaire qu'ils s'éloignent davantage du corps dont ils émanent ou de celui qui les réfléchit, forment des cônes dont les sommets se trouvent sur tous les points visibles du corps, et les bases appuient ou portent sur la partie antérieure de l'œil qui le regarde.

CXV. *Sens de la vue.* Les yeux, dans lesquels ce sens réside, placés dans un lieu très-élevé, dominent sur un grand nombre d'objets à la fois, et sont renfermés dans deux cavités osseuses, connues sous le nom d'*orbites*. La base de ces cavités, tournée en avant, est coupée obliquement en dehors; de manière que, leur paroi externe étant moins longue que les autres, le globe de l'œil, soutenu de ce côté seulement par des parties molles, peut se diriger en dehors, et prendre connoissance des objets placés latéralement, sans que pour cela nous ayons besoin de tourner la tête.

A mesure qu'on s'éloigne de l'homme, en descendant dans l'échelle des êtres, la coupe de la base des fosses orbitaires devient de plus en plus oblique; les yeux cessent de se diriger directement en avant; enfin la paroï externe disparoît, la vue se dirige tout-à-fait en dehors; et comme c'est des yeux que la physionomie tire son principal caractère, celle-ci se trouve absolument changée. Dans certains quadrupèdes, très-vites à la course, tels que le lièvre, la situation latérale des organes de la vue empêche que l'animal voie des corps qui lui sont directement opposés, et qui ont peu de volume; c'est la raison pour laquelle ces animaux, vivement poursuivis, tombent si facilement dans les pièges qu'on leur dresse.

L'organe de la vue est formé de trois parties essentiellement distinctes. Les unes servent à protéger le globe de l'œil, à le soustraire momentanément à l'influence de la lumière, et à le maintenir dans les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions : ce sont les sourcils, les paupières et les voies lacrymales, parties accessoires de l'organe. Le globe de l'œil présente lui-même deux parties, dont l'usage est bien différent : l'une, formée par la presque totalité de ce globe, est un véritable instrument d'optique, un objectif immédiatement placé au-devant de la rétine, chargé de faire subir aux rayons lumineux des changemens indispensables dans le mécanisme de la vision; l'autre, formée par l'expansion médullaire du nerf

optique, est l'organe immédiat de cette fonction : c'est la rétine, seule apte à ressentir l'impression de la lumière, à être ébranlée par l'attouchement délicat de ce fluide éminemment subtil. Cette impression, cet ébranlement, cette sensation, est transmise à l'organe cérébral par le nerf optique, dont la rétine n'est que l'extrémité épanouie.

CXVI. *Sourcils*, *paupières et voies lacrymales* (*tutamina oculi*), HALLER. La couleur plus ou moins foncée des poils du sourcil rend cette éminence très-propre à diminuer l'effet d'une lumière trop vive, en absorbant une partie de ses rayons. Les sourcils remplissent d'autant mieux cet usage, qu'ils forment une saillie plus considérable, et que la couleur des poils qui les recouvrent est plus foncée : aussi abaissons-nous le sourcil, en le fronçant transversalement, lorsque nous passons d'un endroit obscur dans un lieu éclairé, dont la lumière éclatante affecte désagréablement l'organe de la vue. De là encore la coutume dans laquelle sont certains peuples du Midi, chez lesquels le sourcil est ombragé de poils plus épais et d'une teinte naturellement plus rembrunie, de les noircir encore, pour qu'ils remplissent mieux les fonctions qui leur sont assignées.

Les paupières sont deux voiles mobiles tendus au-devant de l'œil, qu'elles recouvrent et laissent alternativement à découvert. Elles devoient être à la fois tendues et douées d'une grande mobilité : or elles tiennent ces deux avantages des cartilages

tarses placés dans toute la longueur de leurs bords libres, et des muscles qui entrent dans leur structure. Le tissu cellulaire, qui unit la peau mince et délicate des paupières aux fibres musculaires, contient, au lieu d'une graisse consistante qui en eût gêné les mouvemens, une lymphe gélatineuse dont l'accumulation facile donne naissance à l'œdème des paupières. Le tissu des paupières n'est pas absolument opaque, puisque, lors même que, fortement serrées l'une contre l'autre, elles recouvrent parfaitement le globe de l'œil, on peut encore, à travers leur épaisseur, distinguer le jour de l'obscurité. C'est pour cela que le retour de la lumière doit être compté parmi les causes déterminantes du réveil, et qu'il importe de laisser dans une obscurité profonde les malades fatigués par l'insomnie.

Le principal usage des paupières est de soustraire les yeux à l'action continuelle de la lumière. Comme tous les autres organes, ceux-ci ont besoin de se réparer par le repos; et ils n'eussent pu en jouir, si les rayons lumineux, en les frappant sans cesse, avoient perpétuellement excité leur sensibilité. L'ablation des paupières (1) entraîne l'insomnie. Bientôt les humeurs affluent vers l'organe

(1) Ce genre de supplice étoit en usage chez les anciens. Ce fut celui dont les Carthaginois punirent le magnanime dévouement de Régulus. (*Voyez* Plutarque, *Vies des hommes illustres.*)

devenu douloureux, par une irritation soutenue ; les yeux s'enflamment, l'inflammation fait des progrès, se propage vers l'organe cérébral, et le malade expire au milieu des tourmens les plus affreux. Grâces au progrès de la civilisation, ces supplices barbares sont depuis long-temps abolis ; mais ce qui arrive, lorsque, par l'éraillement du bord libre de l'une ou de l'autre paupière, une petite portion de la sclérotique ou de la cornée reste à découvert, prouve l'indispensable nécessité de ces parties. Le point exposé à l'action continuelle de l'air et de la lumière s'irrite et s'enflamme; de là naît une ophthalmie que l'on ne guérit qu'en réunissant, à l'aide d'une opération chirurgicale, les bords écartés de la fente, dont l'existence est la cause de la maladie. De chacun des bords libres des paupières s'élèvent de petits poils recourbés, de même couleur que ceux des sourcils : ce sont les *cils*, destinés à empêcher que des insectes ou d'autres corps légers voltigeant dans l'atmosphère ne viennent s'insinuer entre le globe de l'œil et les voiles qui le couvrent.

La partie antérieure des yeux, ainsi défendue contre les injures extérieures, est continuellement mouillée par les *larmes*. L'organe sécréteur de ce liquide est une petite glande placée dans une fossette, à la partie antérieure et externe de la voûte osseuse de l'orbite, environnée de graisse, recevant des vaisseaux et des nerfs assez gros relati-

vement à son volume, et versant le liquide qu'elle sépare au moyen de sept à huit tuyaux qui s'ouvrent à la face interne de la paupière supérieure, par des orifices capillaires dirigés en bas et en dedans. Les larmes sont une liqueur mucoso-séreuse, un peu plus pesante que l'eau distillée, inodore, salée, verdissant les couleurs bleues végétales, et contenant de la soude, du muriate et du carbonate de soude, et très-peu de phosphate de soude et de chaux.

Dans l'ophthalmie, l'irritation de la conjonctive, sympathiquement transmise à la glande lacrymale, non-seulement augmente la quantité de sa sécrétion, mais encore paroît changer les propriétés du liquide qui en est le produit. Les larmes qui, dans cette affection, coulent si abondamment, en occasionant la sensation d'une ardeur brûlante sur les parties enflammées, ne contiendroient-elles pas une plus grande quantité d'alkali fixe qu'il ne s'en trouve dans l'état ordinaire? et les douleurs ne dépendent-elles pas au moins autant de cette surabondance de la soude que de la sensibilité augmentée dans la conjonctive?

Cette dernière membrane n'est autre chose qu'un repli de la peau, qui, prodigieusement amincie, recouvre la face postérieure des paupières, puis se réfléchit sur la partie antérieure de l'œil, qu'elle unit ainsi aux paupières. De toute l'étendue de sa surface suinte une sérosité albumi-

neuse, qui se mêle aux larmes et en augmente la quantité (1).

Les larmes sont étendues en une couche d'égale épaisseur au-devant du globe de l'œil, par les mouvemens alternatifs des paupières, dont cette liqueur adoucit les frottemens, en même temps qu'elle empêche l'organe de la vue d'être desséché dans sa partie exposée au contact de l'air. Celui-ci se charge d'une partie de l'humeur lacrymale, qu'il dissout par l'évaporation. Cette évaporation des larmes est bien prouvée par le larmoiement qui survient aux personnes chez lesquelles cette humeur est abondamment sécrétée toutes les fois que l'atmosphère trop humide n'en dissout point une assez grande proportion. La *chassie*, humeur grasse et huileuse, séparée

---

(1) La peau n'est point percée dans l'endroit qui correspond au globe de l'œil; prodigieusement amincie, elle se continue, sous le nom de *conjonctive*, jusque sur la cornée transparente, à laquelle elle adhère si fortement qu'il est difficile de l'en détacher. Dans certains animaux dépourvus de paupières, la peau se continue au-devant du globe de l'œil sans diminuer d'épaisseur ; la conjonctive (si toutefois cette portion de peau mérite ce nom), étant opaque, rend le globe de l'œil, d'ailleurs imparfait, entièrement inutile. C'est ce qu'on voit dans l'espèce d'anguille désignée par le nom de *murena cœcilia*, dans les livres des naturalistes. La mixine, *gastrobranchus cœcus*, est aveugle de la même manière. Mon ancien condisciple, M. Ribes, croit que la conjonctive se termine à la circonférence de la cornée ; mais les preuves qu'il en donne ne me paroissent pas suffisantes.

par les glandes de Meïbomius, enduit les bords libres des paupières, prévient la chute des larmes sur la joue, et remplit le même usage que les corps gras dont on oint les bords d'un vase rempli, au-dessus de son niveau, d'un liquide dont on prévient ainsi l'épanchement.

Cependant la plus grande partie des larmes coule de dehors en dedans, et se dirige vers l'angle interne des paupières, déterminée dans ce sens par la pente naturelle de leur bord libre, par le sillon triangulaire qui se trouve nécessairement derrière le contact de ces bords, dont les surfaces arrondies et convexes ne se touchent que par un point, et enfin par l'action des portions palpébrales du muscle orbiculaire des paupières, dont les fibres, prenant leur point fixe à l'angle interne de l'orbite, endroit où le tendon s'insère, tirent toujours en dedans leur commissure externe.

Arrivées à l'angle interne des paupières, les larmes s'accumulent dans le *lac lacrymal,* petit espace résultant de l'écartement des bords par la *caroncule lacrymale.* Ce dernier corps, long-temps regardé par les anciens comme l'organe sécréteur des larmes, n'est qu'un amas de cryptes muqueux, recouvert par un repli très-lâche de la conjonctive. Ces follicules, de même nature que les glandes de Meïbomius, sécrètent comme elles une humeur grasse, immiscible à l'eau, quoiqu'on ait avancé le contraire; cette humeur enduit les bords libres

des paupières dans leurs portions voisines de la commissure interne, et, se desséchant durant le sommeil de la nuit, forme la plus grande partie de ces écailles que l'on détache en se frottant les yeux au moment où l'on s'éveille. A cet endroit, ces bords avoient besoin d'un enduit plus épais, les larmes qui y sont accumulées n'ayant nulle part une plus grande tendance à couler sur la joue.

Vers l'union du sixième interne du bord libre des paupières avec les cinq sixièmes externes, à l'endroit où leur portion interne, droite ou horizontale, s'unit à la portion recourbée, s'élèvent deux petits tubercules percés au sommet d'un orifice délié. Ce sont les *points lacrymaux*, distingués en supérieurs et en inférieurs, comme les paupières auxquelles ils appartiennent. Examinés sur le cadavre, les points lacrymaux ne paroissent point tuberculeux : les petites éminences, produites sans doute par un état d'orgasme et d'érection vitale, s'affaissent aux approches de la mort. Ces petites ouvertures, dirigées en dedans et en arrière, plongent sans cesse dans les larmes accumulées, les absorbent et les font passer dans le *sac lacrymal*, au moyen des *conduits lacrymaux*, dont elles ne sont que les orifices extérieurs. L'absorption des larmes, et leur transport dans le réservoir membraneux que loge la gouttière de l'os unguis, ne dépendent point de la capillarité des conduits lacrymaux; chacun

d'eux, doué d'une action vitale particulière, pompe, par une succion véritable, les larmes accumulées dans le lac lacrymal, et les fait couler dans le sac de ce nom : le propre poids du liquide, l'effort des colonnes qui se succèdent, s'ajoutent à l'action des parois du conduit. L'écoulement est encore facilité par la compression et les secousses légères qu'impriment les contractions des fibres palpébrales de l'orbiculaire, derrière lequel les conduits lacrymaux sont placés. A ces fibres sont annexés et comme surajoutés, deux petits muscles particuliers, qui, couchés sur les conduits lacrymaux jusqu'au sac lacrymal, ne peuvent avoir d'autre usage que celui de faciliter l'excrétion des larmes.

La vitalité des points et des conduits lacrymaux se décèle manifestement lorsqu'on veut y introduire le siphon de la seringue d'Anel, ou le stylet de Méjean, pour remédier aux cas de légères obstructions des voies lacrymales. Sur les malades dont on injecte les voies lacrymales, on voit le point lacrymal se resserrer vivement sur lui-même, lorsque l'extrémité du siphon n'enfile pas directement le canal. On est alors obligé d'attendre, pour l'introduire, la cessation du resserrement spasmodique, qui dure quelques instans. Les larmes qui coulent dans le sac lacrymal par le commun orifice des deux conduits lacrymaux réunis ne s'y accumulent jamais, hors le cas d'obstruction maladive; elles passent de suite dans le canal nasal, qui en est une continuation, et tombent dans

les fosses nasales, au-dessous de la partie antérieure du cornet inférieur de ces cavités. Là elles se mèlent au mucus nasal, en augmentent la quantité, le rendent plus fluide et en altèrent la composition. Les larmes ont pour usage de défendre le globe de l'œil contre l'impression irritante que ne manqueroit pas de produire le contact immédiat de l'atmosphère. Elles rendent en même temps le glissement des paupières plus facile, adoucissent les frottement de ces parties et du globe, et favorisent ainsi ses mouvemens.

CXVII. *Globe de l'œil.* On peut, ainsi que nous l'avons déjà dit, le considérer comme une machine de dioptrique placée au-devant de la rétine; chargée de réfracter les rayons lumineux, de les rassembler en un faisceau unique qui frappe un seul point de cette membrane nerveuse, exclusivement propre à en ressentir l'impression. Une enveloppe extérieure, membraneuse, dure et consistante, en soutient toutes les parties. A l'intérieur de cette première membrane, appelée *sclérotique*, existe la *choroïde,* tunique noirâtre qui tapisse l'intérieur de la sclérotique, et fait de l'œil une véritable chambre obscure. A la partie antérieure du globe, la sclérotique laisse une ouverture circulaire dans laquelle la *cornée* transparente est reçue; à une ligne environ de distance de ce segment convexe, enchâssé dans l'ouverture antérieure de la sclérotique, se trouve l'*iris,* cloison membraneuse placée de champ, et percée d'une ouverture ar-

rondie (*la pupille*), qui se dilate ou devient plus étroite, suivant que l'iris se resserre ou s'étend.

A une demi-ligne environ, plus en arrière que l'iris, vers l'union du quart antérieur du globe de l'œil avec ses trois quarts postérieurs, vis-à-vis l'ouverture pupillaire, est un corps lenticulaire, renfermé dans une capsule membraneuse, invariablement fixée dans la place qu'elle occupe par son adhérence à la membrane du corps vitré.

Derrière le *cristallin* (c'est ainsi qu'on appelle cette lentille transparente), les trois quarts postérieurs de la profondeur de l'œil sont remplis par une humeur visqueuse, transparente, renfermée dans les cellules d'une membrane extrêmement fine, connue sous le nom d'*hyaloïde*. Cette *humeur vitrée* forme les deux tiers environ d'une sphère dont on auroit détaché le segment antérieur; c'est à sa surface que s'étend et se développe l'expansion pulpeuse du nerf optique ou la rétine qui se trouve ainsi concentrique à la choroïde et à la sclérotique.

Le globe de l'œil étant à peu près sphérique, l'étendue de tous ses diamètres ne diffère guère: l'antéro-postérieur est de dix à onze lignes, le transverse et le vertical ont un peu moins de longueur. Dans l'espace que mesure ce diamètre antéro-postérieur qui forme l'axe visuel, se trouvent, d'avant en arrière, la cornée, l'humeur aqueuse de la chambre antérieure, l'iris et son trou central ou la pupille, l'humeur aqueuse de la chambre

postérieure, le cristallin, environné par le corps ciliaire, puis le corps vitré renfermé dans la membrane hyaloïde; et derrière ces parties transparentes de l'œil que traversent les rayons lumineux, en se rapprochant de la perpendiculaire, sont la rétine, qui reçoit l'impression, puis la choroïde, dont l'enduit noirâtre absorbe les rayons qui traversent la rétine mince et diaphane, puis la sclérotique, percée pour l'entrée du nerf optique dans le globe de l'œil.

La cornée enclavée dans le vide antérieur de la sclérotique, comme le verre d'une montre dans la châsse de son couvercle, a environ un tiers de ligne d'épaisseur; elle figure au-devant de l'œil un segment de sphère plus petite, ajouté à la partie antérieure d'une sphère plus grande : derrière elle se trouve l'humeur aqueuse, qui remplit ce que l'on nomme les chambres de l'œil; espaces distingués en antérieur, plus grand, limité par la cornée en avant, et par l'iris en arrière; et en postérieur, plus petit, et séparant le cristallin de l'iris, dont la face postérieure couverte d'un enduit noirâtre porte le nom d'*uvée* (1). La pesan-

(1) Quelques anatomistes ont douté de l'existence de la chambre postérieure de l'œil; mais il suffit, pour s'en convaincre, de soumettre un œil à la congélation : alors il se forme toujours un glaçon entre le cristallin et l'uvée. Ce glaçon ne vient point de ce que l'humeur de la chambre antérieure, acquérant par la congélation, comme tous les liquides, une

teur spécifique de l'humeur aqueuse n'est guère supérieure à celle de l'eau distillée. Quelques-uns l'ont même crue plus légère, sa nature est albumineuse, et elle contient quelques sels en dissolution. Le cristallin, renfermé dans sa capsule membraneuse et transparente, est un corps lenticulaire, plus solide que liquide, sa consistance est surtout considérable vers son centre; là, sa substance forme une espèce de noyau auquel s'appliquent des couches concentriques, dont la densité diminue à mesure qu'elles s'approchent de la surface, où les couches les plus extérieures, vérita-

---

force d'expansion considérable, a passé derrière l'iris par l'ouverture de la pupille; car la force expansive des liquides qui se congèlent étant relative à leur volume, le corps vitré, qui se prend en même temps que l'humeur aqueuse, doit empêcher sa rétrogradation par la pupille. Enfin, la face postérieure de l'iris, ou l'uvée, est couverte par un enduit noirâtre qui s'en détache aisément: or, si la face antérieure du cristallin l'eût touchée immédiatement, elle se fût chargée de ce vernis, qui eût troublé sa transparence naturelle, indispensable à l'accomplissement du mécanisme de la vision. Il est donc constant que la chambre postérieure existe, étant à l'antérieure comme 2 à 5, et contenant les deux cinquièmes environ de l'humeur aqueuse, dont la quantité totale est estimée à 5 grains, et que l'iris forme une cloison flottante entre les deux portions de l'humeur aqueuse, à laquelle l'enduit noirâtre de sa face postérieure est immiscible. L'humeur aqueuse paroît être le produit de l'exhalation artérielle: elle se répare très-rapidement, comme on le voit après l'opération de la cataracte.

blement fluides, forment ce que Morgagni croyoit être une humeur particulière dont le cristallin pouvoit se nourrir par une sorte d'imbibition. Ce corps, composé de deux segmens inégalement convexes, ayant environ deux lignes d'épaisseur dans son centre, est formé d'une matière albumineuse, concrescible par l'alcohol et la chaleur ; des artérioles extrêmement fines venant de l'artère centrale de Zinn, à travers le corps vitré, lui apportent la matière de son accroissement et de sa réparation.

Le corps vitré, qui doit son nom à l'aspect du verre fondu sous lequel il se présente, moins dense que le cristallin, l'est plus que l'humeur aqueuse : très-abondant dans l'œil de l'homme, il paroît, fourni par les artérioles qui se répandent dans les parois des cellules de la membrane hyaloïde ; plus pesant que l'eau commune, il est légèrement albumineux et salé.

La sclérotique est une membrane fibreuse à laquelle s'attachent les tendons des muscles qui meuvent le globe de l'œil; elle soutient toutes les parties dont est formé cet organe, qui s'affaisse et se détruit toutes les fois que la continuité de son enveloppe extérieure est détruite. La choroïde, plus mince, principalement vasculaire, sert moins d'enveloppe aux autres parties que de tapis noirâtre, destiné à absorber les rayons lumineux, lorsqu'ils ont produit sur la rétine une impression suffisante. Si elle n'existoit pas, la lumière seroit

réfléchie après avoir frappé la membrane nerveuse, ses rayons se croiseroient et ne pourroient produire que des sensations confuses. Mariotte avoit pensé que la choroïde étoit le siége immédiat de la vision, et que la rétine n'étoit que l'épiderme de cette membrane. Cette hypothèse n'eût point eu la célébrité qu'elle usurpa, si, indépendamment de l'analogie, l'on eût objecté à son auteur l'exemple de ces poissons chez lesquels la choroïde est séparée de la rétine par un corps glandulaire, opaque, que les rayons lumineux ne peuvent traverser. La rétine perd sa forme aussitôt qu'on la sépare du corps vitré ou de la choroïde entre lesquels elle est étendue, sous la forme d'une capsule très-mince et d'une mollesse voisine de la fluidité. Beaucoup de vaisseaux sanguins, provenant de l'artère centrale de Zinn, se mêlent à la substance nerveuse de la rétine, et lui donnent sa couleur foiblement rosée. Est-ce aux dilatations variqueuses ou anévrismatiques de ces petits vaisseaux que doivent être attribuées, comme le pensoit Boerhaave, les taches que l'on aperçoit sur les objets, dans cette maladie particulière de l'organe de la vue, à laquelle maître Jean donne le nom d'*imaginations ?* Pour former la rétine, le nerf optique qui pénètre dans le globe de l'œil, en perçant la sclérotique, à laquelle s'unit l'enveloppe que la dure-mère avoit fournie à ce nerf; le nerf optique, dis-je, s'exprime à travers une membrane très-mince, qui, criblée d'une infinité de petits trous, ferme cette ouver-

ture, et appartient autant à la choroïde qu'à la sclérotique, puis s'épanouit pour fournir l'expansion qui double la concavité de la choroïde et recouvre la surface convexe du corps vitré. Toute l'étendue de la rétine, également nerveuse et sensible, peut recevoir l'impression des rayons de la lumière, quoique quelques physiciens aient seulement attribué cette faculté à sa partie centrale, qu'ils ont nommée axe ou pore optique. Cette partie centrale est assez remarquable dans l'homme par une tache jaunâtre, découverte par Sœmmering : au milieu de cette tache qui se trouve à la partie externe de l'entrée du nerf optique dans le globe de l'œil, se voit un point obscur qui indique un pertuis peu profond, et dont on ignore l'usage. Cette particularité de structure ne s'observe que dans les yeux de l'homme et sur ceux du singe.

Les nerfs optiques diffèrent notablement des autres paires cérébrales par leur grosseur, la délicatesse de leur substance, qui paroît une continuation immédiate des fibres médullaires du cerveau, à laquelle les méninges fournissent une enveloppe commune, et non point un canal membraneux particulier pour chaque fibre; en outre ces nerfs s'épanouissent pour offrir au contact de la lumière une surface considérable, surface dont l'étendue se trouve augmentée, chez certains animaux doués d'une grande portée de vue, au moyen de plicatures multipliées. C'est au moyen de ce mécanisme multiplicateur des surfaces que, chez l'aigle, le

milan, le vautour et autres oiseaux de proie, l'étendue de la rétine est doublée ou même triplée. Le nombre et l'étendue des plis de la rétine semblent même augmentés par l'exercice de la vision C'est du moins ce qui résulte de la comparaison de l'œil d'un oiseau de proie, nourri depuis plusieurs années dans une ménagerie, avec l'œil d'autres oiseaux semblables tués à la chasse. Chez l'oiseau captif le champ de la vision étoit réduit à quelques pieds, tandis que dans l'état de liberté il embrassoit un horizon immense (1).

Les nerfs de la vision s'entrecroisent au-devant de la selle turcique; cette décussation est évidente chez les poissons et les reptiles; elle l'est bien moins dans les oiseaux et les mammifères; mais les faits pathologiques et l'art expérimental se réunissent pour prouver qu'il y a croisement des nerfs optiques. Si l'on enlève l'un des hémisphères cérébraux, comme l'a fait Rolando sur les oiseaux, la vue se perd du côté opposé. Dans l'hémiplégie, l'œil affecté n'appartient pas à la moitié du corps frappé de paralysie, et ce phénomène pathologique, facile à constater sur les personnes qui ont éprouvé une attaque plus ou moins forte d'apoplexie, me semble la meilleure preuve à opposer aux anatomistes qui croient que les nerfs

---

(1) Desmoulins. *Archives générales de médecine*. Novembre 1823.

optiques, en se rapprochant l'un de l'autre, n'éprouvent qu'un simple adossement. Le nerf optique amoindri d'un œil atrophié se dirige vers le lobe opposé du cerveau. Ajoutez l'entrecroisement évident des nerfs optiques chez les poissons et les reptiles, preuve d'analogie qui, jointe au fait précédent, fournit un degré de probabilité voisin de la certitude.

CXVIII. *Mécanisme et phénomènes de la vision.* Les rayons lumineux, partant d'un objet éclairé, forment un cône dont le sommet correspond au point de ce corps que l'on regarde, et dont la base est appliquée à la partie antérieure de la cornée. Tous les rayons trop divergens, et qui tombent hors de l'aire de la cornée, sur les sourcils, les paupières et la sclérotique, sont perdus pour la vision. Ceux qui frappent le miroir de l'œil, le traversent en éprouvant une réfraction proportionnée à la densité de la cornée, bien plus grande que celle de l'atmosphère, et à la convexité de cette membrane : rapprochés de la perpendiculaire, ils traversent l'humeur aqueuse moins dense, et rencontrent la membrane iris. Tous ceux qui tombent sur cette membrane sont réfléchis, et manifestent sa couleur différente dans les divers individus, et qui paroît dépendre de la texture organique et de l'arrangement particulier et singulièrement diversifié des nerfs, des vaisseaux et du tissu cellulaire qui entrent dans sa structure. Il n'y a que les plus centraux qui traversent la

pupille et servent à la vue. Ceux-ci franchiront cette ouverture en plus ou moins grand nombre, suivant qu'elle sera plus ou moins dilatée. Or la pupille s'agrandit ou devient plus étroite par la contraction ou l'expansion de l'iris.

Les mouvemens de cette membrane dépendent entièrement de la façon dont la lumière affecte la rétine. L'iris est par elle-même insensible à l'impression des rayons lumineux, comme l'a prouvé Fontana, qui l'a toujours trouvée immobile, lorsqu'il a dirigé exclusivement sur elle les rayons lumineux. Lorsque la rétine est désagréablement affectée par l'éclat d'une trop vive lumière, la pupille se rétrécit pour ne laisser passer qu'un petit nombre de rayons; elle se dilate, au contraire, lorsque nous sommes dans l'obscurité, afin d'en admettre assez pour qu'ils produisent sur la rétine une impression suffisante.

Pour expliquer les mouvemens de l'iris, il n'est pas besoin d'admettre que des fibres musculaires entrent dans sa structure, fibres musculaires dont on a récemment voulu prouver l'existence, et qui, suivant M. Maunoir de Genève, consisteroient en deux plans de fibres, les unes rayonnantes et les autres orbiculaires; il suffit de reconnoître sa texture vasculaire, spongieuse et nerveuse : l'irritation de la rétine, sympathiquement transmise à l'iris, détermine un afflux plus abondant d'humeurs; son tissu se dilate et s'étend, la circonférence de la pupille est poussée vers l'axe de cette ouverture, qui

se trouve rétrécie par cette expansion vitale du tissu membraneux. Lorsque la cause irritante cesse d'agir, que nous passons du jour à l'obscurité, les humeurs refluent dans les vaisseaux voisins, la membrane de l'iris revient sur elle-même, et la pupille s'agrandit d'autant plus que l'obscurité est plus profonde (1).

Les rayons auxquels la pupille a donné passage traversent l'humeur aqueuse de la chambre postérieure, et rencontrent bientôt le cristallin, qui les réfracte puissamment, en raison de sa densité et de sa forme lenticulaire. Rapprochés de la perpendiculaire par ce corps, ils se propagent jusqu'à la rétine, à travers le corps vitré moins dense, et qui conserve, sans l'augmenter, l'effet de réfraction produit par la lentille cristalline. Les rayons, rassemblés en un faisceau unique, frappent un seul point de la rétine, et produisent l'impression qui nous donne l'idée de certaines propriétés du corps qui les réfléchit. Comme la rétine embrasse le corps vitré, elle présente une surface très-étendue au contact des rayons : ce qui fait que nous pouvons voir à la fois un grand nombre d'objets diversement situés par rapport à nous, lors même que ces objets ou nous-mêmes changeons de place et de rapports. La lumière pénètre et traverse le tissu demi-transparent de la rétine; et comme tamisée

(1) La dilatation habituelle de la pupille est un symptôme de foiblesse, d'affection vermineuse, etc.

par cette pulpe nerveuse, elle arrive jusqu'à la choroïde, chargée d'absorber ses rayons. Y a-t-il alors combinaison intime de la pulpe nerveuse et de la lumière, comme le pensent ceux qui en donnent pour preuve cette sensation que l'on provoque en comprimant le globe de l'œil au milieu de l'obscurité la plus profonde? Les taches que nous voyons sur les corps, après avoir long-temps fixé la vue sur certains objets colorés, tiendroient-elles également à cette sorte d'imprégnation, ou, comme on le croit plus généralement, à la sensibilité de la rétine, accrue ou diminuée par le fait de l'inaction ou de l'exercice?

Les rayons lumineux réfractés par les parties transparentes de l'œil figurent donc, dans l'intérieur même de cet organe, un cône dont la base correspond à la cornée, et appuie sur celle de la pyramide lumineuse extérieure, tandis que son sommet se trouve sur un point quelconque de la rétine. On pense généralement que les pyramides lumineuses qui partent de tous les points de l'objet que l'on regarde se croisent en traversant le globe de l'œil, de manière que l'objet lui-même s'y peint dans une situation renversée. En admettant cette opinion établie sur une expérience physique, on doit chercher pourquoi nous voyons les objets droits, quoique leur image soit renversée sur la rétine. La meilleure explication qu'on ait donnée de ce phénomène est due au philosophe Berkeley, qui l'a proposée dans son ouvrage an-

glais, ayant pour titre *Théorie de la vision*, etc. Selon lui, il n'est pas besoin du toucher pour redresser cette erreur dans laquelle la vue devroit nous entraîner. Comme nous rapportons toutes nos sensations à nous-mêmes, la rectitude de l'objet n'est que relative, et son inversion existe réellement au fond de l'œil.

On entend par *point de vision distincte*, la distance à laquelle on peut lire un livre dont les caractères sont de médiocre grosseur, ou distinguer tout autre objet d'une égale ténuité. Cette distance n'est pas renfermée dans des limites très-étroites, puisque nous pouvons lire le même livre, qu'il soit rapproché à six pouces de l'œil, ou que son éloignement soit six à sept fois plus considérable. Cette faculté qu'ont les yeux de s'accommoder à la distance et à la petitesse des objets ne peut dépendre, comme on s'est plu à le répéter, de l'allongement ou du raccourcissement du globe par les muscles qui le meuvent; ses quatre muscles droits ne sont, en aucun cas, capables de le comprimer sur ses côtés, et de l'allonger en changeant sa forme sphérique; leur action simultanée ne peut qu'enfoncer le globe dans l'orbite, l'aplatir de devant en arrière, diminuer sa profondeur, et rendre par conséquent la réfraction moins énergique, lorsque les objets sont très-éloignés ou très-petits : ce dernier effet pourroit même être contesté. L'œil, qui se meut et repose sur le coussinet graisseux qui remplit le fond de l'orbite,

n'est jamais assez fortement pressé pour perdre sa figure sphérique, qui, de toutes les formes que peuvent revêtir les corps, est celle qui, par sa nature particulière, résiste le mieux aux changemens. Les extrémités des *processus ciliaires* qui environnent la circonférence du cristallin ne peuvent agir sur cette lentille transparente, la comprimer ni la mouvoir; car ces petits replis membraneux dont l'assemblage compose le disque rayonné, connu sous le nom de *corps ciliaires* (1), ne jouissant d'aucune force contractile, sont incapables de mouvoir le cristallin, avec lequel leurs extrémités simplement contiguës n'ont aucune adhérence, et qui d'ailleurs est inamoviblement fixé dans la fossette qu'il occupe, par les adhérences de sa capsule avec la membrane du corps vitré. Les divers degrés de resserrement ou de dilatation dont la prunelle est susceptible donnent de ce problème physiologique une solution bien plus satisfaisante.

Les rayons lumineux qui partent d'un objet très-voisin sont très-divergens; l'œil manqueroit des forces réfringentes nécessaires pour les rassembler en un faisceau unique, si, la pupille se resserrant par l'élargissement de l'iris, les rayons les plus divergens, ou qui forment la circonférence de la pyramide lumineuse, ne se trouvoient

---

(1) On en ignore complétement l'usage.

écartés. Alors ceux qui forment le centre du cône, et qui n'ont besoin que d'une moindre réfraction pour se réunir sur un seul point de la rétine, sont seuls admis par l'ouverture rétrécie. Quand, au contraire, nous regardons un objet éloigné, d'où partent des rayons déjà très-convergens, et qui n'ont besoin que d'une foible réfraction pour être rapprochés de la perpendiculaire, nous dilatons la pupille, afin d'admettre les rayons les plus divergens qui, réunis, porteront l'image de l'objet. Il en est, sous ce point de vue, des corps très-petits comme de ceux dont une grande distance nous sépare. Un objet d'une extrême ténuité, et que l'on ne voit pas en le mettant à deux pouces de l'œil, devient visible si on le regarde au travers d'une étroite ouverture.

Quoique l'image de chaque objet se trace en même temps dans chacun des deux yeux, nous n'avons qu'une sensation simple, parce que les deux sensations sont en harmonie ou se confondent, et ne servent, en s'ajoutant l'une à l'autre, qu'à rendre l'impression plus forte et plus durable. On a depuis long-temps remarqué que la vue avoit plus de précision et de justesse lorsqu'on ne se servoit que d'un œil; et Jurine pense que la force réunie des deux yeux ne l'emporte que d'un treizième sur celle d'un œil exercé séparément. La correspondance d'affection exige la direction des axes optiques sur les mêmes objets, et, pour peu que cette direction soit dérangée, nous voyons

réellement double : c'est ce qui arrive dans le *strabisme*.

Si les yeux jouissent d'une force de réfraction trop énergique, soit par la trop grande convexité de la cornée et du cristallin, la densité plus considérable des humeurs ou la profondeur excessive du globe, les rayons lumineux, trop tôt réunis, s'entrecroisent, divergent de nouveau, tombent épars sur la rétine, et ne produisent qu'une sensation confuse. Dans ce vice de la vision, appelé *myopie*, les malades ne peuvent distinguer que les objets très-rapprochés, d'où partent des rayons dont la grande divergence a besoin d'un instrument qui jouisse d'une grande force de réfraction. Dans la *presbytie*, au contraire, la cornée trop aplatie, le cristallin peu convexe, ou situé trop profondément, les humeurs trop peu abondantes, font que les rayons ne sont pas encore rassemblés lorsqu'ils tombent sur la rétine ; de manière que les malades ne voient bien que les objets éloignés, parce que les rayons qui en viennent, très-convergens, n'ont pas besoin d'être beaucoup réfractés.

La *myopie* est quelquefois l'effet de l'habitude que contractent les enfans de regarder de très-près les objets qui fixent leur attention. La pupille s'accoutume alors à une grande constriction et ne se dilate plus qu'avec peine. On devine aisément que, pour corriger cette vicieuse disposition, il faut présenter à l'enfant des objets éloignés qui piquent

vivement sa curiosité, et le tenir à quelque distance de tout ce qu'il regarde.

La sensibilité de la rétine est, dans certaines occasions, tellement exaltée, que l'œil supporte avec peine l'impression de la plus foible lumière. Les nyctalopes, c'est ainsi que l'on nomme ceux qui sont atteints de cette maladie, distinguent les objets au milieu des plus épaisses ténèbres : quelques rayons sont capables d'ébranler suffisamment leur organe.

On raconte qu'un gentilhomme anglais, renfermé dans une fosse obscure, parvint graduellement à distinguer tout ce qui y étoit contenu : rendu à la lumière, dont il avoit en quelque sorte perdu l'habitude, il n'en put supporter l'éclat; les bords de la pupille, auparavant très-dilatés, se contractoient au point d'effacer entièrement l'ouverture. Lorsqu'au contraire, la rétine est peu sensible, les malades ne peuvent voir qu'au grand jour. Cette autre lésion de la vue, désignée par le nom d'*héméralopie*, peut être regardée comme le premier degré de la paralysie totale du nerf optique ou goutte sereine. Elle reconnoît pour cause tout ce qui peut émousser la sensibilité de la rétine. Saint-Yves rapporte, dans son ouvrage sur les maladies des yeux, plusieurs observations d'héméralopie : elles ont pour sujets des ouvriers employés dans l'hôtel des monnoies à la fonte des métaux. Les habitans des contrées boréales, où la terre est couverte par la neige pendant la plus

grande partie de l'année, deviennent de bonne heure héméralopes : les uns et les autres contractent cette disposition parce que leurs yeux sont habituellement fatigués par l'éclat d'une vive lumière.

Enfin, pour que le mécanisme de la vision s'accomplisse, il faut encore que toutes les parties de l'œil soient dans certaines conditions, dont l'absence est plus ou moins fâcheuse. Il est surtout nécessaire que les membranes et les humeurs que les rayons lumineux doivent traverser jouissent d'une transparence parfaite. Ainsi les taies de la cornée, l'occlusion de la pupille par la conservation de la membrane qui bouche cette ouverture durant les premiers mois de la vie du fœtus; la cataracte, affection qui consiste dans l'opacité du cristallin ou de sa capsule, le glaucome ou le défaut de transparence du corps vitré, affoiblissent ou même abolissent complètement la faculté visuelle, en empêchant les rayons d'arriver jusqu'à la rétine. Cette membrane elle-même doit jouir d'une sensibilité modérée, afin d'être convenablement affectée par leur contact. La choroïde, dont elle remplit la concavité, doit offrir un enduit assez noir pour absorber les rayons lumineux qui la traversent. C'est à l'affoiblissement sensible dans la teinte de la choroïde, à mesure que l'on avance en âge, autant qu'à l'affaissement, à l'induration, à la coloration des différentes parties de l'œil, ainsi qu'à la sensibilité de la

rétine, émoussée par un long usage, qu'on doit attribuer le trouble et la foiblesse de la vision chez les personnes avancées en âge. La foiblesse extrême des yeux des *Albinos* prouve également la nécessité de l'absorption de la lumière par l'enduit noir dont la choroïde se trouve recouverte. Tout le monde a pu voir un grenadier de la Garde de Paris, faisant son service à la porte des spectacles, et attirant l'attention par ses moustaches et ses cheveux blancs, contrastant d'une manière remarquable avec la jeunesse de son visage. Cet individu n'est âgé que de trente-quatre ans : dès sa plus tendre jeunesse, ses cheveux ont offert la couleur du lin en étoupes. Ses yeux, très-délicats et très-foibles en même temps, ne peuvent supporter l'éclat d'une vive lumière, et lui deviennent complètement inutiles dans l'obscurité. L'iris et le fond de l'œil sont d'un rouge rosé : cette couleur, que présentent fréquemment plusieurs animaux domestiques, tels que les lapins et les pigeons, tient à l'absence de l'enduit noir dont sont revêtues la face interne de la choroïde et la face postérieure de l'iris; et comme, au moment de la mort, le sang abandonne les petits vaisseaux dont est pourvu le tissu de ces membranes, elles deviennent alors parfaitement transparentes, et leurs yeux, présentés à la lumière, permettent d'apercevoir, à travers le tissu d'une sclérotique très-mince, les images des objets tracés sur la rétine dans une situation renversée.

Les yeux sont, de tous les organes des sens, ceux qui ont acquis le plus grand développement dans un enfant qui vient de naître; ils ont même alors à peu près le volume qu'ils doivent conserver pendant le reste de la vie : de là vient que les figures des enfans, dont les yeux sont proportionnellement plus grands, sont rarement désagréables, parce que c'est de ces organes que la physionomie tire ses principaux caractères. Ne pourroit-on pas dire que, si la nature a plus tôt achevé l'organe de la vue, c'est que, les changemens qu'il imprime aux rayons de la lumière se déduisant d'une nécessité purement physique, la perfection de l'instrument étoit indispensable à l'exercice de la sensation ?

Les yeux ne sont pas immobiles dans le lieu qu'ils occupent. Entraînés dans des mouvemens très-variés par quatre muscles droits et deux obliques, ils se dirigent vers tous les objets dont nous voulons prendre connaissance, et l'on observe qu'il y a entre les muscles qui meuvent les deux yeux une telle correspondance d'action, que ces organes tournent à la fois dans le même sens, se portent ensemble vers le même objet, de manière que les axes visuels sont exactement parallèles. Il arrive quelquefois que cette harmonie de mouvemens se dérange; et de là naît le strabisme, affection qui, dépendant presque toujours de la force inégale des muscles de l'œil, peut être distinguée en autant d'espèces qu'il y a de muscles

qui peuvent entraîner le globe de l'œil dans leur sens, lorsqu'ils se trouvent accidentellement doués d'une force prédominante. Buffon a encore assigné pour cause de strabisme l'aptitude différente des yeux à être affectés par la lumière. Selon ce naturaliste célèbre, il peut arriver que, l'un des yeux ayant plus de sensibilité, les enfans chez lesquels cette différence existe ferment le plus foible pour se servir du plus fort, que l'exercice fortifie davantage, tandis que le repos affoiblit encore celui qui reste dans l'inaction. L'examen d'une grande quantité de jeunes gens soumis à la conscription militaire, et réclamant l'exemption pour causes d'infirmités, m'a appris que le strabisme est constamment lié à la force inégale des deux yeux. Toujours l'œil inerte est plus foible, presque inutile; et il étoit bien nécessaire que le globe divergent fût ainsi neutralisé, sans quoi l'image qu'il auroit transmise au cerveau, différente de celle qui arrive par l'œil sain, eût introduit du trouble et de la confusion dans les fonctions visuelles. L'œil louche, inactif, tombe par degrés dans cet état de débilité par défaut d'exercice, que Brown a si bien nommé foiblesse indirecte.

Des six muscles de l'œil, quatre seulement, ceux que l'on nomme ses muscles droits, sont-ils destinés à ses mouvemens volontaires, tandis que les deux obliques, animés par la quatrième paire de nerfs, exécutent les mouvemens involontaires par les-

quels le globe tourne sur lui-même, de manière que la pupille se dirige obliquement en haut ou en bas? Suivant cette opinion, récemment émise par M. C. Bell (1), la quatrième paire de nerfs joint encore à ce dernier usage celui de combiner les mouvemens du globe de l'œil et des paupières, et de lier l'œil au système de la respiration, simple conjecture qui ne nous paroît point offrir un degré suffisant de probabilité. En effet, les mouvemens obliques de l'œil s'exécutent sous l'influence de la volonté, sans quoi il seroit impossible de simuler et de diriger à son gré l'expression faciale pour la partie à laquelle l'œil contribue, comme on le voit faire aux mimes de toute espèce.

Le sens de la vue me paroît, bien plus que celui de l'odorat, mériter le nom que J.-J. Rousseau a donné à ce dernier, de sens de l'imagination. Comme cette brillante faculté de l'âme, la vue, qui nous fournit des idées si riches et si diversifiées, est sujette à nous entraîner dans bien des erreurs: on peut douter qu'elle donne la notion de la distance, puisque l'aveugle-né de Cheselden croyoit immédiatement appliqués à son œil tous les corps qu'il pouvoit apercevoir: elle nous expose à de faux jugemens sur la figure et la grandeur des objets, puisque, conformément aux lois de

---

(1) Physiologie de l'œil, Journal de médecine et des sciences naturelles. *Londres*, 1824.

l'optique, une tour carrée, vue dans le lointain, nous paroît ronde, et que des arbres très-élevés, vus aussi dans une perspective éloignée, ne nous paroissent pas plus grands que des arbrisseaux plus voisins de nous. Un corps qui se meut avec rapidité nous semble immobile, etc. C'est par le toucher que se corrigent ces erreurs, que Condillac, dans son Traité des Sensations (1), a peut-être exagérées.

CXIX. L'organe de la vue, considéré dans les différens animaux qui en sont pourvus, présente des variétés qui sont bien manifestement en rapport avec les milieux dans lesquels ils vivent. Ainsi les oiseaux qui s'élèvent dans les hautes régions de l'air ont une troisième paupière, remarquable surtout dans l'aigle, qui lui doit le pouvoir de fixer le soleil; et dans les oiseaux nocturnes, dont elle paroît garantir l'œil, extrêmement délicat, des impressions d'une trop vive lumière. Chez eux aussi, la sécrétion des larmes est très-abondante, le milieu qu'ils habitent étant très-propre à en favoriser l'évaporation. La plupart des poissons n'ont au contraire aucune paupière mobile; leurs yeux ne sont point mouillés par l'humeur lacrymale; l'eau dans laquelle ils sont habituellement plongés semble leur en tenir

(1) Consultez cet ouvrage, rempli d'ailleurs de vues excellentes sur la métaphysique des sensations, des passions, et de tous les actes moraux et intellectuels.

lieu : quelques-uns ont néanmoins les yeux enduits d'un vernis onctueux, bien propre à adoucir les frottemens du liquide.

Le globe de l'œil, dans les oiseaux, présente une cornée très-convexe, quelquefois même absolument hémisphérique; il jouit par-là d'une force de réfraction très-énergique. Les puissances réfringentes paroissent bien plus foibles dans les yeux des poissons, dont la partie antérieure est aplatie; mais l'eau dans laquelle ils vivent rendoit chez eux l'humeur aqueuse inutile; car la densité de cette humeur étant à peu près semblable à celle de l'eau, elle n'eût déterminé aucune réfraction : bien plus, dans les poissons de mer, se trouvant inférieure en densité à l'eau salée, elle eût brisé les rayons, en les éloignant de la perpendiculaire. En effet, la force réfringente d'un milieu n'est jamais qu'une quantité relative; ce n'est pas la densité du milieu qui détermine son degré, mais la différence de densité qui existe entre lui et le milieu auquel il est contigu. Pour suppléer à l'aplatissement de la cornée provenant de la petite quantité ou même de l'absence de l'humeur aqueuse, les poissons ont reçu un cristallin très-dense, sphérique, et dont la sphéricité appartient à une petite sphère.

L'œil des oiseaux dont la cornée est poussée en avant par une humeur aqueuse très-abondante, a dans ce fluide une force de réfraction très-puissante; l'air des hautes régions de l'atmosphère, à

raison de sa raréfaction extrême, étant peu propre à rapprocher les rayons lumineux.

L'ouverture de la pupille est plus dilatable dans le chat, la chouette, les oiseaux nocturnes, et généralement pour tous les animaux qui peuvent voir dans l'obscurité. La sensibilité de la rétine paroît aussi plus vive chez cette classe d'êtres; plusieurs semblent incommodés par la lumière du jour, et ne poursuivent leur proie qu'au milieu des plus épaisses ténèbres.

Le cristallin de plusieurs oiseaux aquatiques, tels que les cormorans, est sphérique comme celui des poissons; et ce n'est point, comme on le verra à l'article de la *Station*, la seule particularité de structure que présentent ces sortes d'amphibies. Enfin la choroïde de certains quadrupèdes, plus facilement séparable en deux lames distinctes que celle de l'homme, présente au fond de l'œil, au lieu d'un enduit noirâtre uniformément répandu, une tache assez large, diversement colorée, brillante, et présentant chez quelques-uns les couleurs les plus belles et les plus éclatantes. Il est difficile d'assigner quelque usage à cette plaque colorée, connue sous le nom de *tapis*.

Réfléchis par cet enduit opaque, les rayons de la lumière doivent, en traversant l'œil, croiser la direction de ceux qui pénètrent, nuire par conséquent à la netteté de la vision, ou du moins dénaturer l'impression visuelle d'une manière qu'il nous est impossible d'apprécier. On a dit avec

raison, que, pourvus de sens moins parfaits, et souvent moins nombreux que ceux de l'homme, les animaux devoient avoir d'autres idées de l'univers. N'est-il point également probable qu'à raison du trouble qu'occasione nécessairement dans la vue la réflexion des rayons lumineux par le tapis, ils se font de la puissance de l'homme des idées fausses, et malgré l'empire des animaux accordé à l'homme par le Créateur, suivant la Genèse, ceux que la nature a doués de forces prodigieuses ou d'armes offensives obéiroient-ils à leur roi, s'ils le voyoient dans toute sa foiblesse, dans sa nudité, en un mot, tel qu'il est? La tête des insectes qui ont des yeux multiples tient à leur corps, en suit tous les mouvemens : leur existence est d'ailleurs si fragile, que la nature devoit leur prodiguer les moyens d'apercevoir les choses qui peuvent leur être nuisibles.

Le nerf optique pourroit-il être remplacé comme organe essentiel et spécial de la vision? un filet de la cinquième paire, l'ophthalmique de Willis pourroit-il, se rendant à l'œil, ressentir l'impression de la lumière? Dans la taupe, la musaraigne-musette, le zemmi, le chrysoclore, le rat-taupe du cap, et autres animaux de la même famille, le nerf oculaire vient évidemment du trijumeau. Le nerf optique manque aussi-bien que les muscles de l'œil, et les nerfs destinés à leurs mouvemens. Or, comme plusieurs de ces animaux sont incontestablement doués de la faculté de voir; et que,

malgré l'opinion vulgaire, la taupe elle-même n'est point complétement aveugle, on est bien forcé d'admettre ce transport, ou plutôt cette transposition d'un sens, d'un nerf sur un autre nerf, fait que mon savant collègue, M. le professeur Duméril, a établi le premier à l'occasion du sens de l'odorat chez les poissons, et sur lequel, M. Cuvier a voulu, fonder cette loi générale de l'action du système nerveux ; que *la différence des fonctions des nerfs dépend plutôt de l'organisation différente des parties auxquelles ils se distribuent*, ou pour mieux dire avec M. Serres, dans lesquelles ils se forment, *que de leur essence propre.*

Aux preuves fournies par l'anatomie comparée en faveur de cette loi l'art expérimental a voulu joindre les siennes, malheureusement bien moins concluantes. C'est ainsi que M. Magendie pense que le nerf optique, chez l'homme, pourroit bien ne point servir à la vision, car l'œil des animaux qu'il a mutilés en détruisant la cinquième paire est évidemment devenu rouge et enflammé. Il est impossible que des expériences semblables ne dérangent point l'état normal des fonctions sur les êtres qu'on y soumet; et l'on ne peut déduire aucune conséquence raisonnable de ces dérangemens, que toute autre lésion grave provoqueroit d'une manière aussi certaine.

L'importance du nerf trifacial seroit-elle mieux établie par le fait curieux que vient d'observer

tout récemment M. le docteur Serres (1), à l'hospice de la Pitié? Un épileptique avoit perdu la vue de l'œil droit ; l'odorat, le goût, étoient abolis du même côté ; l'ouïe étoit très-dure à droite. A l'ouverture du cadavre, la cinquième paire du côté droit parut, à son origine, convertie en une matière molle, jaunâtre, et presque gélatiniforme; le reste étoit infiltré, le ganglion, devenu jaunâtre, étoit plus volumineux; le reste du nerf n'avoit que trois lignes de largeur, tandis que le nerf du côté gauche étoit large de quatre lignes et demie. Les filets musculaires du nerf affecté paroissoient sains ; aussi la mastication n'étoit-elle point empêchée.

Dans l'homme et les mammifères, la cinquième paire établit une sorte de liaison entre les organes de la vue, de l'odorat, de l'ouïe et du goût. Organe exclusif de ce dernier sens, le nerf de la cinquième paire envoie dans l'œil les nerfs qui vont à l'iris ; et l'on a vu quel étroit rapport de sensibilité et de fonctions unit cette membrane à la rétine : la première branche de la cinquième paire se répand aussi dans l'orbite, et donne la sensibilité aux paupières et à la conjonctive; la seconde branche, ou maxillaire supérieur, envoie dans les fosses nasales plusieurs rameaux, dont les plus remarquables sont les nerfs sphéno-palatins, lesquels procèdent d'un ganglion placé dans le sommet de la fosse zygomatique, et se distribuent à

(1) *Archives générales de médecine.* Août 1824.

la partie supérieure et postérieure des fosses nasales, tout près de l'endroit où l'on place le siége de l'odorat.

Enfin, la troisième branche ou maxillaire inférieur, après avoir animé les muscles de la mastication, fournit le lingual, lequel, après avoir communiqué avec le facial ou portion dure de la septième paire, dont il reçoit le filet connu sous le nom de *corde du tambour*, va se rendre à la langue. Il suit de cette distribution, dont nous venons d'indiquer seulement les principales circonstances, que, par ses trois branches, le trijumeau s'étend à tous les organes des sens placés à la tête; qu'à la liaison anatomique ainsi établie entre eux, il doit joindre un rapport physiologique ou sympathique plus direct et plus intime. Il n'est point pour cela l'organe spécial ni principal de la vue, de l'odorat et de l'audition; mais tout prouve que chez l'homme il y sert accessoirement, fortifie la sensation, et la rend plus complète. Tandis que, pour nous le nerf trijumeau n'est qu'un simple organe de renforcement; il fournit les nerfs de la vision chez les animaux dépourvus du nerf optique, et ceux de l'odorat des cétacés. Les animaux invertébrés, les mollusques, les insectes et les crustacés, manquant d'encéphale, n'ont point, comme les vertébrés, pour chaque sens un nerf principal et un accessoire : chez eux le trijumeau fournit le nerf unique qui va se rendre à chaque sens.

CXX. *Organe de l'ouïe. — Du son.* Le son n'est

pas, comme la lumière, un corps existant par lui-même : on donne ce nom à la sensation que nous éprouvons lorsque les vibrations d'un corps élastique frappent nos oreilles. Tous les corps peuvent le produire, pourvu que leurs molécules soient susceptibles d'un certain degré de réaction et de résistance. Lorsqu'un corps sonore est frappé, ses molécules intégrantes éprouvent un ébranlement subit, se déplacent, et se livrent à des oscillations plus ou moins rapides. Ce frémissement intérieur se fait ressentir aux corps appliqués à sa surface : si l'on place la main sur une cloche ébranlée par le choc de son battant, on éprouve un trémoussement plus ou moins marqué. L'air qui enveloppe le corps sonore reçoit et transmet ses vibrations avec d'autant plus d'avantage, qu'il jouit de plus d'élasticité. Ainsi l'on observe que, toutes choses égales d'ailleurs, la voix se fait entendre de plus loin pendant l'hiver, lorsque l'atmosphère est à la fois sèche et condensée par le froid.

Les rayons sonores ne sont autre chose que des séries de molécules aériennes, le long desquelles la vibration se transmet, depuis le corps sonore jusqu'à l'oreille qui perçoit le bruit résultant de sa percussion. Ces molécules participent aux vibrations qui leur sont communiquées; elles changent de place et de figure, d'autant plus qu'elles sont plus voisines du corps frappé, d'autant moins qu'elles en sont plus éloignées; car le son foiblit à mesure que les distances augmentent. Mais dis-

tinguez bien ce mouvement oscillatoire des molécules aériennes de celui par lequel l'atmosphère agitée par les vents se transporte en masse et change de lieu. Semblable à celui du balancier d'une pendule, qui se meut sans cesse, sans franchir jamais les limites du même espace, ce mouvement oscillatoire agite les molécules dans le lieu qu'elles occupent, de telle manière qu'elles vont et reviennent, lorsque la vibration est éteinte, à l'endroit où elles étoient au moment où elle a commencé. L'air atmosphérique, mu en masse, ne produit aucun son, à moins qu'il ne rencontre sur son passage un corps qui vibre par la percussion qu'il éprouve.

La force du son dépend en entier de l'étendue des vibrations qu'éprouvent les molécules du corps sonore. Dans une grosse cloche, frappée avec violence, l'agitation des molécules est telle, qu'elles parcourent de longs intervalles, et que la figure du corps en est visiblement changée. Les tons aigus ou graves viennent du plus ou moins grand nombre de vibrations dans un temps donné; or, les vibrations seront d'autant plus fréquentes, que le corps sonore aura moins de diamètre et d'étendue. Deux cordes à boyau également longues, ayant la même grosseur, et tendues au même degré, font, dans un temps donné, le même nombre de vibrations, produisent le même son : cela s'appelle *unisson*, en musique. Si l'on raccourcit l'une des deux cordes de moitié, elle éprouve une fois plus

de vibrations, produit un son une fois plus aigu, ou supérieur d'une *octave*. Si, ne diminuant rien à sa longueur, on lui ôte la moitié de son volume, on obtiendra le même résultat. On accélérera de mêmes les vibrations, en tendant avec plus de force la corde sonore. La diversité des sons que rend une basse, une harpe, et en général tout instrument à cordes, dépend de ce que leur tension, leur longueur et leur grosseur sont inégales.

Cette division du son fondamental est une opération de l'intelligence, qui aperçoit dans un bruit qui semble monotone une infinité de variétés et de nuances qu'elle exprime par des signes convenus. Mais, de même que la lumière réfractée par le prisme présente une foule de teintes intermédiaires entre les sept couleurs primitives, et que la transition est graduée de l'une à l'autre de ces sept couleurs, ainsi la division du son primitif en sept tons exprimés par des notes n'a rien d'absolu, et laisse subsister dans leurs intervalles un grand nombre de signes qui en augmentent ou en diminuent la valeur, etc.

Le son a donc été analysé comme la lumière : ce que le prisme a fait pour celle-ci, l'oreille l'a exécuté relativement à celui-là, et les modifications dont le son est susceptible sont aussi nombreuses et aussi diverses que les nuances entre les couleurs primitives.

Le son se propage avec bien moins de vitesse que la lumière. Le bruit d'un canon qui est éloigné

d'une certaine distance n'est entendu qu'un instant après que l'œil à vu la déflagration du salpêtre. Ses rayons divergent et se réfléchissent comme ceux de la lumière, lorsqu'ils rencontrent un obstacle sous un angle égal à celui de leur incidence. On peut augmenter la force du son, comme l'éclat de la lumière, en rassemblant, en réunissant ses rayons. Les rayons sonores qui vont frapper un corps dur et élastique, réfléchis par ce corps, ne lui impriment pas moins un mouvement vibratile, d'où naît un son secondaire, qui augmente la force du son primitif.

Lorsque ces sons secondaires, produits par le choc d'un corps plus ou moins éloigné, arrivent à l'oreille plus tard que le son primitif, ils constituent le phénomène désigné par le nom d'*écho*. Qui ne connoît l'allégorie ingénieuse par laquelle l'ancienne mythologie a exprimé sa nature, en faisant de l'écho la fille de l'air et de la terre?

CXXI. *Organe de l'ouie et mécanisme de l'audition.* L'organe de l'ouïe, dans l'homme, est formé de trois parties bien distinctes : l'une placée à l'extérieur, sert à rassembler et à transmettre les rayons sonores, qui sont modifiés en traversant une cavité intermédiaire entre l'oreille externe et l'oreille interne. C'est dans les cavités de cette troisième partie de l'organe, creusées dans l'épaisseur du rocher, que réside exclusivement le nerf chargé de la perception des sons. Le pavillon de l'oreille et le conduit auditif externe peuvent être

COLLE KING'S

comparés à un cornet acoustique, dont la partie évasée, figurée par le pavillon, rassemble les rayons sonores que transmet ensuite la portion étroite représentée par le conduit auditif. La surface du pavillon est surmontée de plusieurs éminences, séparées par des enfoncemens dont la profondeur est proportionnée à leur saillie : sa face concave n'est point tout-à-fait tournée en dehors chez ceux qui n'ont point aplati l'oreille en la comprimant par des vêtemens trop serrés; elle est un peu dirigée en avant, et cette disposition favorable à la collection des sons est surtout remarquable chez les nations sauvages, dont l'ouïe est, comme l'on sait, d'une grande finesse. La base du pavillon est formée par une substance fibro-cartilagineuse, mince, élastique, propre à réfléchir les sons, et, par les vibrations dont elle est susceptible, à en augmenter la force et l'intensité. Une peau très-mince, sous laquelle il ne s'amasse point de graisse qui en eût diminué l'élasticité, recouvre ce cartilage; de petits muscles se portant de l'une à l'autre de ses éminences, peuvent le relâcher en les approchant, et le mettre ainsi à l'unisson des sons aigus ou graves. Ces petits muscles, connus sous le nom d'*intrinsèques de l'oreille*, et qui sont le grand et le petit muscle de l'hélix, le muscle du tragus, celui de l'anti-tragus et le transversal, sont, comme les muscles extrinsèques, plus forts et plus prononcés chez les animaux timides et à longues oreilles. Dans le lièvre, les fi-

bres de ces muscles sont tellement prononcées, leur action est si apparente chez cet animal foible et craintif, qui, ne pouvant échapper qu'en fuyant aux périls dont son existence est sans cesse menacée, avoit besoin d'être de bonne heure averti de leur approche, qu'il peut non-seulement imprimer à ses oreilles des formes variées, en faire des cornets plus ou moins avantageux, mais encore les mouvoir en tous sens, les diriger vers la partie d'où vient le bruit qui le frappe, les porter au-devant des sons, et recueillir les plus légers.

La configuration du pavillon de l'oreille n'est point, dans l'homme, assez avantageuse, quoi qu'en ait dit Boerhaave, pour que tous les rayons sonores qui, venant le frapper, se trouvent réfléchis sous un angle égal à celui de leur incidence, soient dirigés vers le conduit auditif externe. Réunis pour la plupart en un seul faisceau, et dirigés vers la conque, ils s'engagent dans le conduit auditif externe, et les frémissemens qu'ils excitent dans ses parois osso-cartilagineuses contribuent à augmenter leur force. Arrivés au fond du conduit, ils frappent la membrane du tympan, cloison mince et transparente, tendue entre le fond du conduit et la cavité dans laquelle sont contenus les quatre osselets de l'ouïe. Ces petits os forment une chaîne osseuse qui traverse de dehors en dedans la caisse du tambour (c'est ainsi que l'on nomme cette cavité intermédiaire), et s'étend de la membrane du tympan à celle qui unit la base de l'étrier au contour de la fenêtre ovale.

Un air élastique et toujours renouvelé par la trompe d'Eustache remplit la caisse du tambour; de petits muscles attachés au marteau et à l'étrier meuvent ces os, tendent ou relâchent les membranes auxquelles ils adhèrent, et mettent ainsi l'organe de l'ouïe dans un juste rapport avec les sons qui le frappent. On sent aisément que le relâchement de la membrane du tympan, opéré par l'action du muscle antérieur du marteau, doit affoiblir les sons aigus, tandis que la tension de la même membrane par le muscle interne du même os peut augmenter la force des sons graves. De même que, par le resserrement ou la dilatation de la pupille, l'œil s'accommode à la lumière, et peut admettre un plus ou moins grand nombre de ses rayons, suivant l'impression qu'ils produisent, de même, par le relâchement ou la tension des membranes du tympan et de la fenêtre ovale, l'oreille affoiblit ou renforce les sons, dont la violence exciteroit désagréablement sa sensibilité, ou qui, trop foibles, ne produiroient pas sur elle une impression suffisante. L'iris et les muscles du marteau et de l'étrier sont donc *modérateurs* des impressions auditives et visuelles : les connexions sympathiques sont aussi étroites entre les muscles et le nerf auditif, qu'entre l'iris et la rétine. L'air qui remplit la caisse du tambour est le véritable véhicule du son; cet air s'épanche dans les cellules mastoïdiennes, dont l'usage évident est d'augmenter, avec la grandeur de la caisse, la

force et l'étendue des vibrations que ce fluide y éprouve.

Ces vibrations, transmises par la membrane du tympan, sont communiquées à celles qui bouchent les fenêtres ronde et ovale, puis, au moyen de celles-ci, à l'humeur aqueuse qui remplit les diverses cavités de l'oreille interne, et dans laquelle baignent les filamens mous et déliés des nerfs auditifs ou de la portion molle de la septième paire.

Les agitations du liquide ébranlent ces nerfs, et déterminent les sensations de l'aigu ou du grave, suivant qu'elles sont ou plus lentes ou plus rapides. Il paroît que la diversité des sons doit être plutôt attribuée aux oscillations plus ou moins rapides, aux ondulations plus ou moins fortes de la *lymphe de Cotunni*, qu'à l'impression portée sur les filamens plus ou moins longs des nerfs auditifs. Ces filets nerveux sont trop mous et trop minces pour qu'on puisse les suivre dans leur dernière terminaison. Il est néanmoins probable que les formes variées des diverses parties de l'oreille interne (*canaux demi-circulaires*, *vestibule et limacon*) sont pour quelque chose dans la diversité des sons. On doit encore observer que les cavités de l'oreille sont creusées dans une portion osseuse, plus dure que toutes les substances de même nature, et très-propre à soutenir ou même à augmenter, par la réaction dont elle est capable, la force des rayons sonores. Enfin, si les

cavités de l'oreille interne étoient hermétiquement fermées, on conçoit que de violentes agitations de la lymphe de Cotunni pourroient blesser la pulpe nerveuse; mais les vibrations trop fortes du liquide ne vont point jusque-là; car il peut refluer vers les surfaces internes du crâne au moyen des deux petits conduits nommés *aqueducs*.

La partie essentielle de l'organe de l'ouïe, celle qui paroît exclusivement chargée de la sensation des sons, est sans doute celle qui existe dans tous les animaux doués de la faculté d'entendre. Cette partie est la pulpe molle du nerf auditif, flottante au milieu d'un fluide gélatineux contenu dans une poche membraneuse, mince et élastique. On la trouve dans tous les animaux, depuis l'homme jusqu'à la sèche, au-dessous de laquelle on n'a point encore reconnu l'organe de l'ouïe, quoique plusieurs espèces inférieures semblent n'en être pas absolument privées. Cette pulpe gélatineuse, dans laquelle réside l'organe de l'ouïe, s'enveloppe d'abord, dans l'écrevisse, d'une lame dure et cornée. Chez les animaux d'un ordre plus élevé, son intérieur se partage en diverses cavités osseuses. Dans les oiseaux, une cavité s'interpose entre celle qui renferme le nerf acoustique et l'extérieur de la tête; enfin, dans l'homme et les quadrupèdes, l'appareil auditif devient très-composé; l'organe de l'ouïe est renfermé dans une partie osseuse extrêmement dure, profondément située,

et séparée de l'extérieur de la tête par une cavité et un conduit que traversent les rayons sonores, rassemblés en faisceau par des cornets placés au dehors.

Cette sorte d'*analyse* naturelle de l'organe de l'ouïe est très-propre à donner des idées exactes sur la nature et l'importance des fonctions dont est chargée chacune de ses parties. Mais, pour arriver à cette détermination des usages et de l'importance relative de chaque portion de l'appareil auditif, la pathologie fournit des données aussi précieuses que l'anatomie comparée.

CXXII. Le pavillon de l'oreille peut être impunément enlevé sur l'homme, et même sur les animaux chez lesquels sa conformation est plus avantageuse : l'oreille, d'abord dure, reprend, au bout de quelques jours, sa délicatesse accoutumée. L'oblitération entière du conduit auditif externe entraîne la surdité complète. L'intégrité de la membrane du tympan n'est pas essentielle au mécanisme de l'audition; des individus sur lesquels elle s'étoit accidentellement rompue pouvoient rendre de la fumée par l'oreille, sans que pour cela ils fussent privés de la faculté d'entendre. On conçoit néanmoins que, si, au lieu de présenter une petite ouverture qui ne l'empêche point d'être frappée par le choc des rayons sonores, et d'obéir aux tractions que le manche du marteau exerce sur elle pour la tendre ou la relâcher, la membrane du tympan étoit détruite dans la plus

grande partie de son étendue, la surdité seroit presque inévitable. Il paraît qu'il suffit d'une oblitération momentanée des trompes pour occasioner la surdité dans l'angine gutturale. L'inflammation de la membrane muqueuse du pharynx se transmet à celle qui tapisse les trompes d'Eustache, laquelle n'en est qu'une continuation. Il en résulte une simple dureté d'ouie, ou même une surdité complète, qui se dissipe à mesure que l'inflammation disparoît.

Si, par l'obstruction de la trompe d'Eustache, l'air qui remplit la caisse du tambour n'est plus renouvelé, il perd son ressort et se combine avec les mucosités qui humectent la surface intérieure de la caisse du tympan. Il en est alors de cette cavité comme d'une cloche sous laquelle on a fait le vide par la machine pneumatique, et à travers laquelle les rayons sonores ne se propagent que très-difficilement. On a cru que la trompe d'Eustache avait non-seulement pour usage d'opérer le renouvellement de l'air contenu dans la caisse du tympan, mais encore de donner passage aux rayons sonores. Quand on écoute avec attention, on ouvre la bouche à un degré médiocre : c'est, dit-on, afin que le son puisse passer de cette cavité dans le pharynx, de celui-ci dans la trompe d'Eustache, et arriver par-là à l'organe de l'ouïe. Cette explication n'est point satisfaisante : en effet, l'oblitération du conduit auditif externe entraîne la surdité complète, ce qui n'arriveroit pas si les trompes

d'Eustache se prêtoient au passage des rayons sonores. Lorsqu'un homme écoute attentivement et bouche béante, les condyles, placés au devant des conduits auditifs externes, s'abaissant et se portant en avant, les conduits sont manifestement dilatés, comme il est facile d'en acquérir la certitude en introduisant le petit doigt dans l'oreille au moment où l'on exécute cet abaissement de la mâchoire. L'ouverture de la bouche dans un auditeur attentif ne prouve donc point que les rayons sonores s'introduisent par les trompes d'Eustache. Bien plus, cette introduction rendroit l'audition confuse; les rayons que l'on suppose arriver par les trompes d'Eustache frapperoient la membrane du tympan en sens contraire, et s'opposeroient aux ébranlemens que lui imprime le faisceau des rayons admis par le conduit auditif. Les trompes d'Eustache ou conduits gutturaux de l'oreille ne peuvent donc avoir d'autre usage que de servir au renouvellement de l'air qui remplit la caisse du tympan.

La luxation des osselets de l'ouïe, ou même leur destruction complète, ne cause pas la surdité; il en résulte seulement de la confusion dans la perception des sons. La destruction de l'étrier, dont la base forme la plus grande partie de la fenêtre ovale, doit néanmoins, aussi-bien que le déchirement de la membrane mince qui bouche la fenêtre ronde, occasioner la surdité par l'écoulement de

la liqueur qui remplit les cavités dans lesquelles se ramifie le nerf auditif.

L'existence de cette liqueur paroît essentielle au mécanisme de l'audition, soit qu'elle entretienne les nerfs dans l'état de mollesse et d'humidité nécessaire à la sensation, soit qu'elle leur transmette les mouvemens ondulatoires dont elle est agitée.

La surdité sénile, qui dépend, selon les auteurs, de ce que l'habitude a émoussé la sensibilité des nerfs auditifs, de ce que des impressions trop souvent répétées ont épuisé leur excitabilité, paroît quelquefois tenir au défaut de cette humeur, et à la dessiccation des cavités intérieures de l'oreille. Pendant les froids du rigoureux hiver de 1798, le professeur Pinel fit ouvrir, à l'hospice de la Salpêtrière, le crâne de plusieurs femmes mortes à un âge très-avancé, et ayant perdu l'ouïe depuis plusieurs années. Les cavités de l'oreille intérieure furent trouvées parfaitement vides : elles étoient remplie par un glaçon chez les individus plus jeunes et jouissant de la faculté d'entendre.

La surdité peut encore être produite par la paralysie de la portion molle de la septième paire; par l'affection de la partie du cerveau d'où elle prend origine. Il est impossible d'expliquer mécaniquement, comme l'a fait Willis, les diverses anomalies de l'organe de l'ouïe, les affections dans lesquelles

cet organe n'est ébranlé que par des sons forts ou foibles, agissant ensemble ou séparément sur lui.

Cet auteur rapporte qu'une femme n'entendoit le son de la voix que lorsqu'on faisoit un grand bruit auprès d'elle en battant un tambour, ou en sonnant une cloche, parce que, dit-il, dans cette circonstance, les sons les plus éclatans déterminent, dans la membrane du tympan qu'il suppose relâchée, le degré de tension nécessaire pour qu'elle vibre frappée par des sons plus foibles. Pour que cette membrane présente plus de résistance, il faut, ou bien que sa tension soit opérée par la contraction du muscle interne du marteau, ou qu'elle se contracte elle-même. L'absence totale des fibres musculaires dans la membrane du tympan de l'homme fait douter de cette contraction spontanée. Home vient cependant de constater, en Angleterre, qu'elle étoit, dans l'éléphant, musculaire et contractile (1). En admettant toutes ces suppositions, on n'a fait que reculer la difficulté, et il reste à dire pourquoi les sons les plus forts se bornent à augmenter le ton de la membrane du tympan; pourquoi l'ouïe se refuse à leur perception, qui doit étouffer celle des sons plus foibles.

CXXIII. *Des odeurs.* Les chimistes ont longtemps cru que la partie odorante des corps for-

---

(1) *Voyez* le Journal de Société philomatique, n° 38.

moit un principe particulier et distinct de toutes les autres substances qui entrent dans leur composition : ils le désignoient sous le nom commun d'*arome;* mais Fourcroy a clairement démontré que cet élément prétendu n'étoit autre chose que les molécules atténuées des corps, détachées par le calorique, et dissoutes par l'air, qui s'en charge et les porte jusqu'à la surface olfactive. D'après cette théorie, tous les corps sont odorans, puisque la matière de la chaleur peut sublimer quelques particules de ceux mêmes qui ont le plus de fixité. Linné et Lorry avoient essayé de classer les odeurs d'après le genre de sensations qu'elles produisent (1). Fourcroy a adopté, pour base du même travail, la nature chimique des corps.

---

(1) Linné admet sept classes d'odeurs : première classe, odeurs *ambrosiaques;* celles de la rose et du musc sont de ce nombre; la ténacité est leur caractère : deuxième, *fragrantes;* exemple, le lis, le safran, le jasmin; elles se dissipent aisément : troisième, *aromatiques;* comme celle du laurier : quatrième, *alliacées*, plus ou moins semblables à celle que l'ail exhale : cinquième, *fétides*, comme la valériane et les champignons : sixième, *vireuses*, comme les pavots, l'opium : septième, *nauséeuses*, comme la courge, le melon, le concombre, en général les cucurbitacées.

Lorry ne reconnoît que cinq classes d'odeurs, les odeurs *camphrées, narcotiques, éthérées, acides volatiles et alkalines.*

Fourcroy établit l'arome *muqueux;* c'est celui des plantes faussement appelées inodores; *huileux et fugace, huileux et volatil, acide et hydrosulfureux.*

Mais quelques avantages que présente cette dernière classification, il est difficile d'y comprendre les odeurs infiniment variées qui s'exhalent des substances de tous les règnes; et peut-être est-il aussi impossible de les classer que les corps dont elles émanent.

Ceci posé sur la nature des odeurs, on explique pourquoi l'atmosphère s'en charge d'autant plus aisément, qu'elle est plus chaude et plus humide. On sait que, dans un jardin couvert de fleurs, en aucun temps, l'air n'est embaumé de plus doux parfums, et l'odorat ne procure des sensations plus délicieuses que le matin, lorsque la rosée s'évapore, dissipée par les rayons du soleil. On conçoit également pourquoi les corps doués des odeurs les plus pénétrantes sont généralement très-évaporables, tels que l'éther, l'alcohol, les teintures alcoholiques, les huiles essentielles volatiles.

CXXIV. *Organe de l'odorat.* Les fosses nasales, dans lesquelles cet organe réside, sont deux grandes cavités creusées dans l'épaisseur de la face; elles se prolongent au delà par des arrière-cavités appelées *sinus frontaux, ethmoïdaux, sphénoïdaux, palatins* et *maxillaires.*

Une membrane muqueuse, assez épaisse et toujours humide, dans le tissu de laquelle se répandent les nerfs olfactifs, ainsi qu'un grand nombre d'autres nerfs et de vaisseaux, en tapisse l'intérieur, se prolonge dans les sinus qui y aboutissent, re-

couvre les saillies et les anfractuosités de leurs parois. Cette membrane, appelée *pituitaire*, molle et fongueuse, est l'organe sécréteur des mucosités nasales; plus épaisse à la surface des cornets qui hérissent l'intérieur des cavités olfactives, elle s'amincit et devient plus dure en s'enfonçant dans leurs divers sinus.

L'odorat paroît d'autant plus délicat, que, les fosses nasales ayant plus d'ampleur, la membrane pituitaire offre une surface plus étendue : l'état habituel de mollesse et d'humectation de cette membrane est encore une condition essentielle à la perfection de ce sens. Dans le chien, et dans tous les animaux qui excellent par la finesse de l'odorat, les sinus frontaux, ethmoïdaux, sphénoïdaux, palatins et maxillaires, ont un développement prodigieux, et les parois du crâne sont en grande partie excavées par ces appendices de l'appareil olfactif : chez eux aussi les cornets sont très-saillans, et les gouttières, ou méats qui les séparent, très-profondes; enfin les nerfs de la première paire ont une grosseur proportionnée. Parmi les animaux qui excellent par la finesse de l'odorat, il en est peu de plus remarquables que le cochon. Ce quadrupède immonde, habitué à vivre au milieu des odeurs les plus infectes et des ordures les plus dégoûtantes, a cependant l'odorat si subtil, qu'il sent certaines racines, quoiqu'elles soient enfouies dans la terre à des profondeurs considérables. Dans plusieurs pays, on utilise

cette qualité en l'employant à la recherche des truffes. L'animal, conduit dans les lieux où on les soupçonne, fouille bientôt la place qui les recèle, et s'en repaîtroit avec avidité, si le pâtre, satisfait de l'indication, ne le chassoit loin de ce mets destiné pour des palais plus délicats. Le volume des nerfs olfactifs est une autre mesure non moins certaine de la délicatesse de l'odorat : on les trouve d'autant plus gros dans les diverses espèces d'animaux, qu'elles ont ce sens plus exquis.

CXXV. *Sensation des odeurs.* Les seuls nerfs de la première paire cérébrale donnent-ils à la membrane pituitaire la propriété de recevoir l'impression des odeurs? et les filets nombreux qu'y répand la cinquième paire ne la font-ils jouir que de la sensibilité générale? Cette question me semble devoir être résolue par l'affirmative. La membrane pituitaire jouit, en effet, de deux modes de sensibilité cérébrale, parfaitement distincts, puisque l'un deux peut être presque totalement éteint, tandis que l'autre est beaucoup augmenté. C'est ainsi que, dans un violent coryza, la sensibilité tactile est très-vive, puisque la membrane pituitaire est douloureuse, tandis que les malades sont insensibles aux odeurs les plus fortes.

Il paroît probable que les nerfs olfactifs ne s'étendent point dans les sinus, et que ces arrière-cavités n'ajoutent à la perfection de l'odorat qu'en retenant plus long-temps une grande masse d'air chargé de molécules odorantes. J'ai vu des injec-

tions odorantes et détersives, faites dans l'antre d'Hygmore par une fistule au bord alvéolaire, ne produire aucune sensation olfactive. Une fiole pleine d'une liqueur spiritueuse ayant été présentée à l'ouverture des sinus frontaux fistuleux, le malade n'en ressentit aucune impression. Le véritable siége de l'odorat est la partie la plus élevée des fosses nasales, que le nez recouvre en forme de chapiteau. Là, la membrane pituitaire, plus humide, reçoit dans son tissu les nombreux filets de la première paire cérébrale, qui, née par deux racines du lobe antérieur du cerveau et de la scissure qui le sépare du lobe postérieur, sort du crâne par les trous de la lame criblée de l'ethmoïde, et se termine en formant, par l'épanouissement de ses filets, une sorte de tissu parenchymateux, difficile à distinguer de celui de la membrane. Les papilles olfactives seroient bientôt desséchées par le contact perpétuel de l'air atmosphérique, si elles n'étoient recouvertes par les mucosités nasales. L'usage de cette humeur est non-seulement de conserver la sensibilité des extrémités nerveuses, en prévenant leur dessiccation, mais encore d'émousser l'impression trop forte qui naîtroit de l'immédiate application des particules odorantes. Peut-être même se combine-t-elle avec les odeurs, et celles-ci n'affectent-elles les nerfs olfactifs que dissoutes par les mucosités, comme les alimens savoureux le sont par la salive.

Comme l'air est le véhicule des odeurs, elles ne

viennent frapper la membrane pituitaire que lorsque nous l'attirons par l'inspiration dans les fosses nasales. Aussi, dans les cas où quelque odeur nous est agréable, faisons-nous des inspirations courtes et fréquentes, et fermons-nous en même temps la bouche, afin que l'air qui entre dans les poumons passe entièrement par les fosses nasales. Nous respirons, au contraire, par la bouche, ou bien nous suspendons momentanément la respiration, quand les odeurs nous déplaisent.

L'odorat, comme tous les sens, est très-impressionnable chez les enfans, quoique chez eux les fosses nasales soient fort étroites, et qu'il n'existe pas de sinus. L'exaltation générale de la sensibilité, à cette époque de la vie, supplée à l'imperfection de l'organisation : et il en est, à cet égard, des fosses nasales comme de l'appareil auditif, dont un partie assez importante (le conduit auditif externe) est incomplétement développée. L'odorat se perfectionne par la perte de quelqu'un des autres sens. Tout le monde connoît l'histoire de cet aveugle que cet organe instruisoit de la sagesse de sa fille. Il s'émousse par l'usage des odeurs fortes et pénétrantes. C'est ainsi que le tabac dénature la sécrétion muqueuse qu'opère la membrane des fosses nasales, altère son tissu, dessèche ses nerfs, et éteint à la longue leur sensibilité.

La petite distance qui sépare l'origine des nerfs olfactifs dans le cerveau de leur terminaison dans les fosses nasales rend la transmission des impres-

sions qu'ils éprouvent très-prompte et très-facile. Cette proximité de l'organe cérébral engage à porter sur ces nerfs les stimulans propres à réveiller la sensibilité, lorsque la vie est suspendue, comme dans les cas de foiblesse et d'asphyxie. Les relations sympathiques établies entre la membrane pituitaire et le diaphragme expliquent également les bons effets des remèdes sternutatoires dans les cas de mort apparente.

CXXVI. *Des saveurs.* Les saveurs ne sont ni moins variées ni moins nombreuses que les odeurs, et il est aussi difficile de les réduire à des classes générales qui les rapprochent par leurs analogies, et en embrassent la totalité (1). Du reste, il n'existe pas plus d'élément savoureux que de principe odorant. La saveur des fruits change avec leur maturité, et paroît tenir à la composition intime des corps, à leur nature particulière plutôt qu'à la forme de leurs molécules, puisque les cristaux de même figure, mais appartenant à différens sels, ne produisent pas des sensations semblables. On ne peut pas distinguer les saveurs, non plus que les odeurs, en agréables et en désagréables. Ce qui est agréable à un individu déplaît à

(1) C'est ce qu'ont tenté Boerhaave, Haller et Linné, avec assez peu de succès. L'*acide*, le *doux*, l'*amer*, l'*âcre*, le *salé*, l'*alkalin*, le *vineux*, le *spiritueux*, l'*aromatique*, l'*acerbe*, tels sont les noms sous lesquels ces médecins ont désigné les caractères généraux des saveurs.

une autre personne ; et, chose remarquable, il paroît que les anciens recherchoient des mets dont l'odeur et la saveur nous feroient fuir, l'assa-fœtida, par exemple.

Pour qu'un corps affecte l'organe du goût, il doit être soluble à la température ordinaire de la salive. Tout corps insoluble est insipide, et l'on pourroit appliquer à l'organe du goût cet axiome si célèbre en chimie : *corpora non agunt, nisi soluta.* S'il y a défaut absolu de salive, et que le corps que l'on mâche soit parfaitement privé d'humidité, il n'affectera la langue desséchée que par ses propriétés tactiles, et point du tout par ses qualités gustatives. Les corps les plus savoureux sont ceux qui se prêtent le plus aisément aux diverses combinaisons ou décompositions chimiques, tels que les sels acides, alkalins et neutres. Lorsque, dans les affections gastriques, la langue se couvre d'un limon muqueux ou blanchâtre, jaunâtre ou bilieux, nous n'avons qu'une fausse idée des saveurs, l'enduit plus ou moins épais empêche le contact immédiat des particules sapides ; lorsqu'elles agissent d'ailleurs sur les papilles nerveuses, l'impression qu'elles produisent se confond avec celle que causent les matières saburrales ; c'est pourquoi tout aliment paroît amer quand la disposition bilieuse existe, fade dans les maladies où l'élément muqueux prédomine, etc.

CXXVII. *Sens du goût.* Aucun sens n'est plus voisin du toucher et ne lui ressemble davantage.

La surface gustative ne diffère des tégumens communs qu'en ce que le chorion, le corps muqueux et l'épiderme qui enveloppent le corps charnu de la langue, ont plus de mollesse, moins d'épaisseur, reçoivent une plus grande quantité de nerfs et de vaisseaux, sont habituellement mouillés par la salive et par des mucosités que sécrètent des glandes muqueuses placées dans leur épaisseur. Ces cryptes muqueux, et les nerfs qui se répandent dans l'enveloppe cutanée de la langue, soulèvent l'épiderme très-mince qui recouvre sa face supérieure, et forment un grand nombre de papilles distinguées, à raison de leur forme, en *fongueuses*, en *coniques*, et en *villeuses*. A l'exception de celles de la première espèce, ces petites éminences sont formées par les extrémités des nerfs qu'environne un lacis de vaisseaux sanguins : c'est à ces vaisseaux que les papilles doivent la propriété de se gonfler, de s'élever, de devenir plus saillantes en entrant dans une sorte d'érection, quand nous mâchons des alimens de haut goût, ou que nous appétons vivement un mets savoureux. Les papilles fongueuses se trouvent surtout placées à la partie la plus reculée de la face supérieure de la langue, vers sa base, dans la portion qui concourt à la formation de l'isthme du gosier. La compression qu'exerce sur elles le bol alimentaire, au moment où il passe de la bouche dans le pharynx, en exprime les mucosités, qui, lubrifiant le contour de l'ouverture, servent à faciliter son passage : ces

follicules muqueuses remplissent, à cet égard, le même usage que les glandes amygdales.

La face supérieure de la langue est le siége du goût : on ne peut cependant nier que les lèvres, les gencives, la membrane qui couvre la voûte palatine (1) et le voile du palais, ne puissent être affectées par l'impression de quelques saveurs.

On observe que, dans les différens animaux, l'organe du goût est d'autant plus parfait, que les nerfs de la langue sont plus gros, sa peau plus fine et plus humide, son tissu plus flexible, sa surface plus étendue, ses mouvemens plus faciles et plus variés. Ainsi l'os de la langue des oiseaux, en diminuant sa flexibilité ; les écailles osseuses de la langue du cygne, en diminuant l'étendue de sa surface sensible ; l'adhérence de la langue aux mâchoires, dans les grenouilles, les salamandres et le crocodile, en nuisant à la liberté et à la facilité de ses mouvemens, rendent chez ces animaux le sens du goût plus obtus, et bien moins propre à ressentir l'impression des corps sapides qu'il ne l'est chez l'homme et les autres mammifères.

---

(1) Principalement la partie antérieure de la membrane palatine. Le nerf *naso-palatin*, découvert par Scarpa, après s'être détaché du ganglion de Mekel, et avoir parcouru un assez long trajet dans les fosses nasales, vient se terminer dans cette portion épaisse et rugueuse de la membrane palatine placée derrière les dents incisives supérieures, et souvent frappée par la pointe de la langue.

L'homme seroit peut-être, de tous les animaux, celui dont le goût auroit le plus de délicatesse, s'il n'émoussoit de bonne heure sa sensibilité par les boissons fortes, les ragoûts épicés et tous les raffinemens que le luxe des festins invente chaque jour. Les quadrupèdes, dont la langue est recouverte d'une peau plus rude, distinguent mieux que nous les substances vénéneuses ou nuisibles, par la sensation gustative. On sait que, parmi les végétaux variés qui couvrent la surface de la terre, chaque animal herbivore choisit un certain nombre de plantes plus analogues à sa nature, et rejette constamment celles qui ne lui conviennent point.

CXXVIII. La branche linguale de la cinquième paire des nerfs cérébraux est-elle seule propre à la dégustation des saveurs? La neuvième paire, qui se distribue presque tout entière dans le tissu de la langue, le glosso-pharyngien de la huitième, n'y servent-ils pas également? Depuis Galien, le plus grand nombre des anatomistes pensent que la huitième et la neuvième paire fournissent à la langue ses nerfs moteurs, tandis que la cinquième lui envoie ses nerfs sensitifs. Cependant on peut suivre quelques filets du grand hypoglosse jusque dans les papilles nerveuses de la langue. Ce nerf est plus gros que le lingual, et se distribue plus exclusivement à cet organe que la cinquième paire, à laquelle appartient l'autre nerf. Hevermann dit avoir vu le goût détruit, parce que l'on avoit coupé le nerf de la neuvième paire dans l'extirpation

d'une glande squirrheuse. Son observation, adoptée sans examen, me paroît bien suspecte. Le lingual, en pareille occurrence, pourroit encore goûter, et le sens ne seroit qu'affoibli. La section d'un seul grand hypoglosse n'auroit pu rendre insensible que la moitié de la langue, à laquelle il se distribue; l'autre moitié auroit dû continuer à jouir de toute la plénitude de sa sensibilité.

L'application des métaux aux divers cordons nerveux qui se distribuent à la langue doit instruire sur la différence de leurs usages, si, comme Humboldt le soupçonne, l'armature des nerfs moteurs produit seule des contractions. Pour vérifier cette conjecture, j'ai placé dans l'intérieur du crâne une plaque de zinc, sous le tronc du nerf de la cinquième paire d'un chien tué depuis quelques minutes, et pénétré encore de toute sa chaleur; les muscles de la langue, sous laquelle une pièce d'argent fut mise, n'offrirent qu'un léger frémissement; ceux du front et des tempes, armés du même métal, éprouvèrent des contractions bien sensibles, au moment où l'on établissoit communication avec une verge de fer. Ceci me prouvoit bien que la branche linguale de ce nerf servoit presque uniquement à la sensation des saveurs, ce qui est conforme au sentiment du plus grand nombre des physiologistes, et ce que l'on peut inférer de la connoissance anatomique de ce rameau nerveux, qui se termine presque entièrement dans les papilles de la membrane de la langue

et n'envoie que des filamens peu nombreux aux muscles de cet organe : de ce que l'irritation galvanique du grand hypoglosse agitoit convulsivement toute la langue, je ne me crus pas en droit de conclure que ce nerf étoit seulement destiné à ses mouvemens, dans l'opinion où j'étois que le même tronc nerveux pouvoit contenir, dans cette partie du corps, comme dans les autres, des filets sensitifs et des filets moteurs. Mais les travaux subséquens de M. Ch. Bell (1) ont prouvé que, cette opinion étoit erronée ; la neuvième paire naît du cordon nerveux qui, depuis les *cuisses du cerveau* jusqu'à la *queue du cheval*, fournit les racines antérieures des nerfs spinaux, lesquelles président exclusivement aux mouvemens volontaires, tandis que du rang postérieur des filamens viennent les nerfs destinés à l'exercice de la sensibilité. Il paroît donc avéré que les fonctions spéciales des nerfs de la langue sont, pour le lingual, d'être l'instrument de la dégustation, pour le grand hypoglosse celui des mouvemens, et pour le glosso-pharyngien de combiner les actions de la langue et du pharynx dans la déglutition.

La langue, quoique représentant un organe impair, est formée de parties exactement symétriques, et l'on y trouve de chaque côté quatre muscles (*stylo*, *hyo*, *génio-glosses* et *lingual*);

---

(1) Transactions philosophiques, 1822.

trois nerfs (*lingual, glosso-pharyngien, grand hypoglosse*); une artère et une veine (*les ranines*); et un paquet de vaisseaux lymphatiques parfaitement semblables. Toutes ces parties similaires forment, par leur réunion, un corps charnu, d'une texture serrée, difficile à démêler, comparable à celle des ventricules du cœur, doué d'une grande mobilité qu'il tient des vaisseaux et des nerfs qui se distribuent dans son épaisseur. Si l'on compare leur nombre et leur grosseur au petit volume de l'organe, on verra que, si aucune partie du corps n'exécute des mouvemens plus fréquens, plus étendus et plus variés, aucune ne reçoit plus de vaisseaux et plus de nerfs. Une ligne médiane sépare et marque les limites des deux moitiés de la langue, qui, anatomiquement et physiologiquement considérée, paroît formée de deux organes distincts, et comme juxta-posés.

Les phénomènes pathologiques confirment cette indépendance des deux parties de la langue; dans l'hémiplégie, celle qui correspond à la moitié du corps paralysée, perd également la puissance motrice; l'autre conserve cette faculté, et entraîne la langue de son côté. Dans les carcinomes de cet organe, souvent un de ses côtés reste étranger à l'affection qui détruit la moitié opposée. Enfin les artères et les nerfs du côté gauche s'anastomosent rarement avec ceux du côté droit, l'injection, poussée par une des artères ranines,

ne remplit que la moitié correspondante de l'organe, etc.

CXXIX. *Du toucher.* Aucune partie de la surface de notre corps n'est exposée à recevoir l'atteinte d'une cause étrangère, sans que nous en soyons promptement avertis. En effet, si les organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat et du goût, n'occupent que des espaces circonscrits, le tact réside dans toutes les autres parties, et veille efficacement à notre conservation. Distribué à toute la surface, le toucher paroît être le sens élémentaire : tous les autres sens n'en sont que des modifications accommodées à certaines propriétés des corps. Tout ce qui n'est pas lumière, son, odeur ou saveur, est apprécié par le toucher, qui nous instruit ainsi de la plupart des qualités des objets qu'il nous importe de connoître, comme de leur température, de leur consistance, de leur état de sécheresse ou d'humidité, de leur figure, de leur grosseur et de leur distance, etc. Il corrige les erreurs de la vue et des autres sens, dont il peut être, à bon droit, appelé le *régulateur;* de tous, il nous fournit les idées les plus exactes et les plus sûres.

Le toucher, dont quelques auteurs ont voulu consacrer l'excellence, en lui donnant le nom de *sens géométrique,* n'est cependant pas à l'abri de toute méprise. Tant qu'il ne s'exerce que sur les propriétés géométriques dérivées de l'étendue, et

qu'il apprécie la longueur, la largeur, l'épaisseur, la figure des corps, il transmet à l'intelligence des résultats rigoureux et mathématiques; mais il s'en faut de beaucoup que les idées que nous acquérons par son moyen, sur la température, soient aussi précises. En effet, si nous venons de toucher un morceau de glace, un corps plus froid que le nôtre nous paroîtra chaud. C'est par cette raison que les lieux souterrains nous semblent chauds pendant l'hiver. Il ont conservé leur température, tandis que tout le reste en a changé; et comme nous jugeons de la chaleur d'un objet non-seulement dans ses rapports avec celle qui nous pénètre, mais encore avec la température des autres corps et de l'air ambiant, nous trouvons chauds les mêmes lieux qui nous avoient paru froids au milieu de l'été.

Les corps les plus denses étant les meilleurs conducteurs du calorique (1), le marbre, les mé-

---

(1) Les corps laineux, cotonneux, etc., tous les feutres, dont les brins entrecroisés emprisonnent en quelque sorte une grande quantité d'air fluide, que son état gazeux rend un très-mauvais conducteur du calorique, retiennent bien la chaleur; et l'épaisseur étant égale, une étoffe de laine fine, dont les brins sont plus écartés, le tissu plus moelleux, sera plus chaude qu'une étoffe de laine grossière dont les fils trop appliqués formeront un corps dense, à travers lequel le froid comme la chaleur se propageront avec facilité. C'est en retenant ainsi une certaine masse d'air enchevêtrée que

taux nous paroissent plus froids qu'ils ne le sont réellement, parce qu'ils nous l'enlèvent avec plus de rapidité. Le marbre et les métaux polis semblent plus froids dans cet état, parce que, touchant la peau par un plus grand nombre de points à la fois, ils opèrent plus énergiquement cette soustraction. Tout le monde connoît l'expérience dans laquelle deux doigts étant croisés, on roule sous leur pulpe une petite boule qui donne la sensation de deux boules distinctes, etc.

CXXX. *Des tégumens.* L'enveloppe générale du corps est l'organe du toucher, qui réside essentiellement dans le derme, ou la peau proprement dite. Le tissu cellulaire, qui unit ensemble toutes nos parties, forme autour du corps une couche plus ou moins épaisse, qui en recouvre toutes les régions : c'est le *panicule graisseux.* A mesure qu'il s'approche de la surface, ses lames se rapprochent, s'appliquent plus immédiatement, et ne sont plus écartées par la graisse. C'est par cette juxta-position plus intime des lames du tissu cellulaire qu'est formé le cuir ou *derme,* membrane dense, très-élastique, dans l'épaisseur de laquelle

---

la neige conserve au sol qu'elle recouvre une température assez douce, et préserve les plantes de l'atteinte que leur porteroit un froid excessif : vérité physique qui se trouve exprimée en termes figurés dans ces paroles du Psalmiste : « Dieu « donna la neige à la terre pour lui servir de vêtement. *Et « dedit illi nivem tanquam vestimentum.* »

se distribuent beaucoup de vaisseaux de toute espèce, et à laquelle vient se terminer une si grande quantité de nerfs, que les anciens n'hésitoient pas à regarder la peau comme de nature purement nerveuse.

Dans certaines parties du corps, un plan musculaire très-mince sépare le derme du panicule graisseux. Cette espèce de *panicule charnu* enveloppe la presque totalité du corps de certains quadrupèdes; ses contractions froncent leur peau recouverte de poils, redressent ceux-ci, leur impriment des vibrations au moyen desquelles ils se nettoient de la poussière et des ordures qui peuvent s'y être attachées. C'est au moyen d'un muscle peaussier, dont la structure est très-composée, que le hérisson se roule en boule, et présente à son agresseur une peau hérissée de piquans aigus: on n'en retrouve sous celle de l'homme que des rudimens épars; l'occipito-frontal, le sourcilier, plusieurs autres muscles de la face, le peaussier du cou, le palmaire cutané, peuvent être considérés comme en faisant partie. On doit même y joindre le crémaster, dont les fibres épanouies et enveloppées par les dartos en ont imposé à quelques anatomistes, au point qu'ils ont admis dans ce dernier une texture musculaire. Ces fibres du crémaster impriment à la peau des bourses des mouvemens très-marqués, la froncent en travers, en même temps qu'ils remontent les testicules; le peaussier agit également sur la peau du cou;

enfin l'occipito-frontal imprime au cuir chevelu un mouvement si marqué, qu'il suffit pour faire tomber le chapeau, le bonnet, ou tout autre vêtement dont la tête est recouverte. On peut rapprocher du panicule charnu la tunique musculaire du tube digestif placée dans toute sa longueur au-dessous de la membrane muqueuse, qui n'est qu'un prolongement de la peau modifiée et ramollie.

Mais si dans l'homme le muscle sous-cutané, trop imparfait, ne remplit que des usages de peu d'importance, la couche cellulo-graisseuse étendue sous la peau donne à celle-ci sa tension, sa blancheur, son poli, sa souplesse, favorise son application aux objets tangibles, et rend ainsi le toucher plus délicat. Une peau trop dure ou ridée eût mal embrassé les corps très-petits, se fût difficilement accommodée aux plus petites inégalités de ceux dont le volume est peu considérable : aussi la pulpe des doigts, siége d'un tact plus exquis, nous présente-t-elle une sorte de matelas ou coussinet graisseux soutenu par les ongles, propre à s'appliquer aux corps les mieux polis, et à en ressentir les aspérités les plus légères. J'ai vu les phénomènes du tact bien incomplets chez des hommes consumés par le marasme, et dont la peau dure, sèche et ridée, étoit, dans certains endroits, comme collée aux parties sous-jacentes.

L'analyse chimique du tissu cutané prouve qu'il ne ressemble point exactement au tissu cellulaire

et membraneux ; il est albumino-fibreux, et tient le milieu, pour sa composition, comme par sa dose de contractilité, entre les tissus celluleux et la chair musculaire. De la surface de la peau s'élève une multitude de petites papilles mamelonnées, fongueuses, coniques, pointues, obtuses et diversement figurées dans les différentes parties du corps. Ces éminences ne sont autre chose que les extrémités pulpeuses des nerfs qui s'y terminent; autour d'elles se développent des réseaux vasculaires d'une admirable ténuité : plus marquées aux doigts et aux lèvres que partout ailleurs, les papilles de la peau se gonflent quand on les irrite, soulèvent en quelque sorte l'épiderme ; et cette espèce d'érection, utile lorsque nous voulons toucher un corps avec soin, peut être excitée par des frictions, une chaleur modérée, etc.

La surface nerveuse ou sensible de la peau est recouverte d'un enduit muqueux, incolore chez les Européens, noirci par la lumière chez les peuples des climats méridionaux, de nature albumineuse, destiné à entretenir les papilles dans cet état de mollesse et d'humectation qui favorise les phénomènes du tact. C'est dans cette couche, connue sous le nom *réseau muqueux de Malpighi*, que paroît résider le principe qui donne à la peau des différens peuples des couleurs tellement diversifiées, comme nous le dirons à l'article des variétés de l'espèce humaine. Indépendamment de cette couche mince et albumineuse, étendue à la

surface mamelonnée de la peau, les capillaires sanguins et lymphatiques qui entourent les papilles nerveuses forment, en communiquant ensemble, un réseau à mailles très-fines, adhérent à l'épiderme par une multitude de petits filamens vasculaires qui s'engagent entre les écailles de cette dernière enveloppe, et s'y terminent en pores exhalans et absorbans, suivant qu'ils appartiennent au système artériel ou bien au système des vaisseaux lymphatiques. Il suffit, en effet, de soulever légèrement les écailles de l'épiderme pour mettre à nu ces orifices, et déterminer l'absorption des virus. C'est dans le réseau de Malpighi, ou plutôt dans cet assemblage de vaisseaux capillaires entrelacés au-dessous de l'épiderme, que paroissent s'accomplir les phénomènes de la plupart des inflammations cutanées et des maladies éruptives.

La peau ne pourroit remplir ses usages, si une dernière membrane, mince, transparente, appelée *épiderme*, n'empêchoit sa dessiccation. Cette couche superficielle est parfaitement insensible : on n'y trouve ni nerfs, ni vaisseaux d'aucune espèce. Les recherches les plus minutieuses sur sa structure n'y font découvrir qu'une multitude de lamelles superposées, et se recouvrant mutuellement dans une portion de leur surface comme les tuiles d'un toit. Cette imbrication des lames épidermoïques est bien sensible sur les poissons et les reptiles, dont la peau écailleuse n'est autre

chose qu'un épiderme dont les parties sont taillées sur des proportions plus grossières.

Nous avons vu (XLII), dans l'histoire de l'absorption, comment les frictions facilitent l'inhalation des substances appliquées à la surface de la peau, en redressant les écailles imbriquées de l'épiderme, et en mettant ainsi à nu les orifices des vaisseaux absorbans, dont elles augmentent d'ailleurs l'activité.

Haller veut que l'épiderme soit produit par la dessiccation des couches les plus extérieures du réseau muqueux; d'autres pensent qu'il résulte du durcissement de la peau, par la pression considérable que l'atmosphère exerce à la surface du corps. Dans ces hypothèses, pourquoi, dès le troisième mois de la vie, le corps de l'embryon qui nage au milieu des eaux de l'amnios est-il pourvu de cette enveloppe? Mais, comme nous l'avons dit en terminant l'histoire de la nutrition, l'épiderme doit être considéré comme le résultat d'une véritable excrétion ou sécrétion *sèche*, dont la peau seroit l'organe. Les exhalans dont le tissu du derme est pourvu si abondamment laissent exsuder un suc visqueux, albumineux, qui contient une grande proportion de phosphate calcaire; ainsi se forme une enveloppe analogue à la coquille dont l'œuf est revêtu, enveloppe parfaitement inorganique, quoiqu'un physiologiste italien, M. Mojon, lui accorde des propriétés vitales et une organisation

analogue à celle des autres membranes (1). L'épiderme doit donc être regardé comme une sorte de tissu *excrémentitiel* : ainsi le résidu de la nutrition, rejeté à la surface du corps, y devient utile, et se transforme en une enveloppe protectrice de l'économie. La pression rend l'épiderme dur et calleux, en augmente considérablement l'épaisseur, comme on le voit à la paume des mains et à la plante des pieds, sur les personnes livrées à des travaux pénibles. Il se reproduit avec une incroyable facilité : détaché par écailles à la suite des érysipèles et des dartres farineuses, enlevé par grandes plaques par l'action des vésicatoires, il se répare en très-peu de jours; avec les ongles et les poils qui doivent en être regardés comme des productions, il est dans l'homme la seule partie susceptible de se régénérer. Les poils et les cornes des quadrupèdes, les plumes des oiseaux, le test calcaire de l'écrevisse et de plusieurs autres mollusques, la caparace de la tortue, les étuis solides d'un grand nombre d'insectes, etc., jouissent, comme l'épiderme, de cette propriété, qui s'exerce toujours, puisque l'excrétion des sucs albumineux et calcaires n'est jamais interrompue. Du reste, la nature chimique et la structure de ces corps sont les mêmes; tous contiennent une proportion con-

(1) Osservazioni anatomico-fisiologiche sulle epidermide. *Genova*, 1815.

sidérable de phosphate de chaux, résistent opiniâtrément à tous les moyens de décomposition, et donnent une grande quantité de carbonate d'ammoniaque par l'analyse ignée. L'épiderme a pour usage de recouvrir les papilles nerveuses dans lesquelles réside essentiellement la faculté tactile, de modérer l'impression trop vive que produiroit un contact immédiat, d'empêcher que l'air ne dessèche la peau et n'émousse sa sensibilité.

Cette dessiccation du tissu cutané est encore empêchée; sa souplesse est aussi maintenue par une huile grasse qui transsude à travers les pores, et que paroissent sécréter les exhalans cutanés; liniment onctueux, qu'il faut bien distinguer de celui que fournissent les glandes sébacées, que l'on trouve dans certains endroits, comme autour des narines, dans le creux des aisselles et aux plis des aines. Cette substance graisseuse, qui enduit la peau est abondante et fétide dans certains individus, principalement chez les sujets d'un tempérament bilieux, dont les poils sont colorés d'un blond ardent. Elle est également plus copieuse chez les nègres africains, comme si la nature eût voulu les prémunir contre la dessiccation trop prompte qu'eût opérée l'atmosphère embrasée des tropiques. Cet usage de l'huile cutanée est également rempli par le suif, la graisse et les mélanges dégoûtans dont les Cafres et les Hottentots se servent pour enduire leur corps, dans cette

pratique que tous les voyageurs (1) qui ont pénétré dans ces contrés brûlantes de l'Afrique décrivent sous le nom de *tatouage*.

Les anciens nous présentent quelque chose d'analogue, et les onctions huileuses, fréquemment usitées dans l'ancienne Rome, remplissoient les mêmes usages d'assouplir la peau, de prévenir sa dessiccation et ses gerçures (2). Les pommades qui entrent dans les apprêts de la toilette ont les mêmes avantages. C'est à la transsudation continuelle de cette huile animale qu'est dû le besoin de nettoyer quelquefois la peau par l'usage des bains ; l'eau détache la poussière et les autres impuretés qui se sont attachées à sa surface, invisquée par l'humeur qui la lubrifie. C'est cette humeur qui salit les linges, et oblige de renouveler souvent ceux qui sont immédiatement appliqués à la peau, qui fait ramasser l'eau en gouttelettes quand nous sortons du bain, etc.

Quoique les parties où se trouve la plus grande quantité de graisse sous-cutanée ne soient pas tou-

---

(1) Entre autres, Kolbe, *Description du cap de Bonne-Espérance ;* Sparmann, *Voyage au cap de Bonne-Espérance et chez les Hottentots ;* Vaillant, *Voyage dans l'intérieur de l'Afrique.*

(2) On connoît la réponse de ce vieux soldat qui, interrogé par Auguste sur les causes de sa longévité, dit qu'il la devoit à l'usage intérieur du vin, et extérieur de l'huile; *intùs vino, extùs oleo.*

jours les plus huileuses, et qu'on ne puisse point regarder cette sécrétion comme une filtration de cette humeur à travers le tissu de la peau; l'embonpoint influe manifestement sur sa quantité. Je connois plusieurs personnes surchargées de graisse, qui paroissent la suer quand elles se sont échauffées par le plus léger exercice. Toutes graissent leur linge en moins de vingt-quatre heures. La quantité trop considérable de l'huile cutanée est nuisible, en empêchant la sortie de la transpiration cutanée et sa dissolution par l'atmosphère.

On sait combien, après que l'épiderme a été détaché, le moindre contact est pénible; celui de l'air suffit pour enflammer douloureusement la peau découverte par l'application d'un vésicatoire. L'épiderme, comme nous l'avons dit également au chapitre de l'absorption, placé aux limites de l'économie vivante, en quelque sorte inorganique, sert de barrière à l'introduction trop facile des substances hétérogènes, en même temps qu'il émousse l'action trop vive des choses extérieures sur nos organes. Tous les corps organisés et vivans sont pourvus de cette enveloppe, et chez tous, sur la graine d'un végétal, sur sa tige, à la surface du corps des animaux et de l'homme, elle a la plus grande analogie de fonctions et de nature. L'incorruptibilité fait, en quelque sorte, son essence, et spécifie sa nature; et dans les tombeaux qui ne contiennent plus que la pous-

sière du squelette, il n'est point rare de trouver intact et reconnoissable l'épiderme épaissi, qui sert de semelle à la plante du pied, et surtout au talon. Au reste, il la partage, aussi-bien que la plupart de ses propriétés, avec les ongles et les poils, qu'on peut en considérer comme des appendices.

CXXXI. *Des ongles.* Les ongles ne sont, en effet, qu'une partie de l'épiderme avec lequel ils se continuent et se détachent après la mort. Plus épais et plus durs, comme lui inorganiques, lamelleux, croissant rapidement de leur racine vers leur bord libre, se reproduisant avec promptitude, ils peuvent acquérir plusieurs pouces de longueur, lorsqu'on néglige de retrancher la portion qui excède le bout des doigts et des orteils, comme le font les faquirs dans l'Inde. Dans cet état de développement, ils se replient sur eux-mêmes, dans le sens de la flexion, enveloppent la pulpe des doigts, et nuisent à la perfection du toucher, sens dont le parfait exercice est, chez l'homme civilisé, préférable aux avantages que les sauvages savent retirer de leurs ongles longs et crochus pour se défendre, et pour attaquer ou dépecer les animaux tués à la chasse. Les ongles sont absolument insensibles; et si, dans le mal appelé *ongle entré dans la chair*, les douleurs sont si vives, si l'arrachement, auquel on est quelquefois forcé d'avoir recours pour la guérison de cette maladie, cause d'atroces souffrances, c'est

qu'en même temps l'on tiraille et l'on violente plus ou moins les nerfs que l'ongle recouvre, protége, et qu'il blesse quand il croît dans une direction vicieuse. Les douleurs que cause l'ongle entré dans la chair ne prouvent donc pas plus la sensibilité de ces corps que celles qu'occasionent les cors aux pieds ne démontrent celle de l'épiderme, dont ils ne sont que des parties épaissies, durcies et devenues calleuses par la pression : lesquelles, resserrées dans des chaussures trop étroites, compriment douloureusement les nerfs placés au-dessous d'elles. L'ongle peut lui-même s'épaissir : j'en ai vu, au gros orteil, dont l'épaisseur étoit de près d'un demi-pouce. Les ongles ont pour usage de soutenir la pulpe molle des doigts, lorsqu'elle s'applique à un corps qui offre de la résistance; ils concourent au mécanisme du toucher, en le rendant plus parfait (1).

---

(1) Les ongles des orteils favorisent l'application du pied au plan de sustentation; ils servent également à perfectionner le tact de ces parties. Les pieds ne sont pas seulement destinés à supporter le poids du corps ; ils doivent encore nous guider dans la recherche du plan de sustentation, apprécier la solidité, la température, les inégalités du sol sur lequel nous marchons. Ils avoient donc besoin d'un tact assez délicat. Quant à la division de la partie antérieure du pied en plusieurs parties distinctes et séparées, elle étoit utile pour la sûreté de la station et des mouvemens progressifs. J'ai vu plusieurs soldats qui avaient eu le bout des pieds gelé dans les Hautes-Alpes qui séparent la France de l'Italie. Ceux qui

CXXXII. *Des cheveux et des poils.* Nous ne traitons ici de ces parties qu'à raison de leurs rapports avec l'épiderme; car, bien loin de servir au toucher, elles l'empêchent, ou au moins le rendent plus obtus dans les endroits où elles se trouvent.

De tous les animaux, l'homme est celui dont la peau est la plus nue, la moins recouverte de parties insensibles qui émoussent le sens du toucher. Les poils dont est couvert le corps de presque tous les mammifères ne recouvrent que certains points limités de la surface du sien : dans tout le reste, ils se trouvent disséminés en petit nombre, et trop fins pour nuire à l'exercice du toucher. Quelques hommes cependant offrent une peau velue; j'en ai vu plusieurs qui, nus, paroissoient revêtus de la peau d'un animal, tant étoient nombreux les poils qui, de tout le corps, ne laissoient à découvert qu'une petite partie du visage, la paume des mains et la plante des pieds. Ce développement extraordinaire des poils est en général un signe de vigueur et de force. Dans l'enfance, les poils ne recouvrent que la surface du crâne, un léger duvet en tient la place sur le reste du corps. Chez la femme, outre le

---

n'avoient perdu que les orteils avoient la démarche moins assurée, et faisoient des chutes fréquentes sur un sol inégal ; ceux qui avoient perdu la moitié des deux pieds étoient obligés de se servir de béquilles.

défaut de barbe, les poils des parties génitales et des aisselles sont moins abondans que chez l'homme; les membres et le tronc en sont presque toujours dépourvus; mais, comme si la matière qui devroit fournir au développement des poils se dirigeoit toute vers le cuir chevelu, on observe que les cheveux sont presque constamment et plus longs et plus abondans.

La couleur des cheveux varie depuis le blanc légèrement cendré jusqu'au noir d'ébène; et, comme nous le dirons en traitant des tempéramens et des différentes variétés de l'espèce humaine, la diversité de leur coloration est un signe à l'aide duquel on reconnoît ces variétés. La couleur des cheveux peut faire juger de leur grosseur: Withof, qui a compté avec une patience vraiment germanique combien de poils étoient compris dans l'espace d'un pouce carré, dit, dans sa *Dissertation sur les poils et les cheveux de l'homme*, qu'il s'en trouve cinq cent soixante-douze noirs, six cent huit châtains, et sept cent quatre-vingt-dix blonds; de manière que le diamètre du cheveu, qui est d'un trois cent à un sept centième de pouce, est le plus petit dans les cheveux blonds, qui sont d'autant plus fins qu'ils sont plus pâles. On observe également que les hommes à cheveux noirs, ordinairement bilieux, adultes et habitans des pays chauds, en ont davantage sur les autres parties du corps; qu'ils sont chez eux

non-seulement plus gros, mais encore plus gras et plus huileux.

Quelle que soit la partie du corps à laquelle ils appartiennent, tous les poils ont la même structure; tous naissent d'un bulbe vésiculaire placé dans le tissu graisseux sous-cutané; de ce bulbe rempli d'une lymphe gélatineuse, dont le poil paroît se nourrir, celui-ci, d'abord divisé en deux ou trois filamens qui constituent une espèce de racine, sort formant un seul cordon qui perce obliquement la peau et l'épiderme, empruntant de ce dernier une gaîne qui l'accompagne jusqu'à son sommet, où il se termine en pointe.

Le cheveu peut donc être considéré comme un tuyau épidermoïque rempli d'une moelle particulière. Cette tige spongieuse, qui forme le centre du cheveu, en est une portion plus essentielle que la gaîne fournie par l'épiderme. C'est le long de ce filament spongieux et cellulaire que se filtre l'huile animale que le cheveu fournit, et les sucs à l'aide desquels il se répare. Quoiqu'on voie dans quelques animaux des rameaux vasculaires et de très-petits filamens nerveux se diriger et se perdre vers la racine de certains poils, tels que les soies longues et roides qui forment les moustaches de plusieurs quadrupèdes, on ne peut point dire si, dans l'homme, le cheveu, ni même son bulbe, reçoivent des vaisseaux et des nerfs. Se nourrissent-ils par imbibition de la gélatine que

contient leur ognon, ou de la graisse dans laquelle celui-ci est plongé? des vaisseaux se prolongent-ils le long de leur axe, depuis leur racine jusqu'à leur sommet? On citoit en faveur de cette opinion le sang que répandoient les cheveux coupés dans la plique polonaise ; mais cette maladie, récemment observée sur les lieux où elle existe, n'a offert aux médecins français qu'une simple intrication des chéveux, résultat évident de la malpropreté et de l'habitude dans laquelle sont les Polonais d'avoir la tête habituellement couverte d'un épais bonnet de laine. Le cuir chevelu reste parfaitement sain au-dessous des cheveux entrelacés, et la section de ceux-ci est le vrai moyen de guérir la maladie. Fourcroy pense (1) que chaque cheveu est hérissé de plusieurs branches très-courtes, ce qui, comme l'a expliqué Monge, favorise l'entrecroisement des poils dont on veut former des tissus par le procédé connu sous le nom de *feutrage*.

CXXXIII. Parmi les plus remarquables propriétés des cheveux, on doit noter leur altérabilité par l'humidité de l'air, qui, relâchant leur substance, augmente leur longueur. C'est pour cela que l'on s'en sert pour construire les meilleurs hygromètres. On ne doit pas non plus omettre la facilité qu'ils ont de croître et de se reproduire, même après l'arrachement complet de leurs ognons,

(1) Système des Connoissances chimiques, tome IX, p. 263.

comme je l'ai vu nombre de fois après la guérison de la teigne par une méthode douloureuse, leur propriété isolante, par rapport au fluide électrique, dont ils sont de très-mauvais conducteurs, propriété remarquable sous le rapport de la nature soupçonnée du fluide nerveux.

Les cheveux ne jouissent d'aucun mouvement spontané, par lequel ils puissent se relever sur la tête, quand l'âme est agitée de quelque sentiment d'horreur ou d'effroi; alors cependant ils se redressent par la contraction de l'occipito-frontal qui, intimement adhérent au cuir chevelu, l'entraîne dans tous ses mouvemens.

Ils ne paroissent doués d'aucune sensibilité; néanmoins les passions jouissent sur eux d'une telle influence, qu'on a vu des jeunes gens blanchir en une seule nuit passée au milieu des angoisses qui précèdent le dernier supplice. La révolution, qui a causé des chagrins si cuisans et de si vifs regrets, a fourni plusieurs exemples authentiques de personnes qui ont blanchi dans le court intervalle de quelques jours. Dans cette blancheur anticipée, le cheveu se dessèche-t-il comme celui des vieillards, qui semble mourir par défaut de sucs et d'humidité?

L'observation suivante semble prouver que les cheveux sont l'organe excréteur d'un principe quelconque, dont la rétention peut avoir les suites les plus fâcheuses. Un chartreux qui, chaque mois, se faisoit raser la tête, pour se conformer à la

règle de son ordre, en étant sorti par suite de sa destruction, prit de l'emploi aux armées, et laissa croître ses cheveux; au bout de quelques mois, il fut tourmenté par des céphalalgies intolérables, et qu'aucun remède ne pouvoit apaiser. Enfin, quelqu'un lui conseilla de reprendre ses anciennes habitudes, et de se faire tondre à des époques rapprochées : les douleurs de tête ont disparu, et ne se sont plus fait sentir.

On sait, dit Grimaud (1), qu'il est des migraines nerveuses qui cèdent à la précaution de rafraîchir souvent les cheveux, c'est-à-dire de les couper fréquemment, et de les retenir à la longueur de deux ou trois doigts, ce qui dépend sans doute de ce que la pousse plus vive des cheveux met en mouvement des sucs qui stagnent. Un ami de Valsalva dissipa, au rapport de Morgagni (2), une affection maniaque en faisant raser la tête du malade. Casimir Médicus guérissoit les gonorrhées opiniâtres en faisant raser à plusieurs reprises le poil des parties génitales.

Les cheveux partagent l'inaltérabilité, la presque indestructibilité de l'épiderme : comme lui, ils brûlent en boursoufflant, et fournissent une huile abondante, fétide, ammoniacale. Les cendres, résidu de leur combustion, contiennent une grande

---

(1) Second Mémoire sur la Nutrition, page 49.

(2) *De Sedibus et Causis*, epist. 8, n° 7.

quantité de phosphate de chaux. Les cornes des mammifères, les plumes des oiseaux, donnent, en brûlant, la même odeur, et fournissent les mêmes produits que les cheveux et les poils; ce qui a fait dire que ces derniers étoient une espèce de substance cornée passée à la filière. Les acides, mais sur tout les alkalis, les dissolvent : aussi tous les peuples qui se coupent la barbe lui font-ils subir un ramollissement préliminaire, en la frottant avec des dissolutions alkalines et savonneuses.

Les cheveux ont-ils pour usage d'évacuer la matière nutritive surabondante? L'époque de la puberté et de la fin de l'accroissement est celle où ils se développent pour la première fois dans plusieurs régions du corps qui en étoient dépourvues. Ils sont en même temps l'émonctoire par lequel la nature se débarrasse du phosphate de chaux, résidu du travail nutritif: les poils des quadrupèdes, dont les urines sont moins riches en sels phosphoriques que celles de l'homme, paroissent surtout remplir cette destination. Les poils ont avec la graisse une analogie qui n'a point encore été déterminée; souvent on les trouve accidentellement développés dans les loupes graisseuses connues sous le nom de *stéatomes*. Enfin ils remplissent encore des usages relatifs aux parties près desquelles ils sont placés.

CXXXIV. La faculté de prendre connoissance des qualités tangibles est accordée à toutes les par-

ties de l'organe cutané; il suffit d'appliquer un objet à un point quelconque de la surface du corps pour que nous acquérions l'idée de sa température, de sa sécheresse ou de son humidité, de sa pesanteur, de sa consistance, et même de sa figure particulière (1). Mais aucune partie n'est plus propre à nous donner des notions exactes sur toutes ces propriétés que *la main*, regardée de tout temps comme l'organe spécial du toucher. Le grand nombre d'os qui entrent dans sa composition la rend susceptible de mouvemens très-variés, à l'aide desquels elle change de forme, s'accommode aux inégalités que présente la surface des objets, et les embrasse avec exactitude : cette conformation avantageuse est surtout évidente aux extrémités des doigts. Leur partie antérieure, qui jouit du sentiment le plus délicat, reçoit, des nerfs médian et cubital, des

---

(1) Dans cet article nous avons toujours employé les mots de *tact* et de *toucher*, comme des expressions synonymes. Selon quelques personnes; ce sont cependant deux choses parfaitement différentes. Il nous est impossible d'admettre ces distinctions scolastiques, si chères aux commençans; il suffit d'avoir joué une seule fois à cette espèce de *colin-maillard*, où tout usage des mains est sévèrement interdit, pour être certain que toutes les parties de la peau peuvent nous instruire, non-seulement de la température des corps, mais encore de leur forme, de leur consistance, etc. C'est la volonté qui dirige ces attouchemens exercés par d'autres parties que les mains : le toucher s'exerce alors chez l'homme comme dans plusieurs animaux.

cordons assez gros, qui se terminent en formant des houppes arrondies, serrées, et environnées d'un tissu cellulaire pelotonné. Cette partie des doigts, que l'on appelle leur pulpe, est soutenue par les ongles; des vaisseaux très-nombreux se répandent dans ce tissu névro-cellulaire, et l'arrosent d'une humeur abondante qui en conserve la souplesse. Quand la transpiration est augmentée, on la voit sortir en gouttelettes à cette extrémité des doigts, au fond des raies concentriques dont l'épiderme se trouve sillonné.

On a voulu rendre raison du plaisir que nous éprouvons à toucher des surfaces arrondies et sans aspérités, en faisant voir que la configuration réciproque de la main et du corps soumis à son application étoit telle, qu'ils se touchoient par le plus grand nombre de points possibles. La délicatesse du tact est entretenue par la finesse de l'épiderme; elle augmente par l'éducation, qui peut davantage sur ce sens que sur aucun des autres. On sait avec quel empressement l'enfant à qui l'on laisse le libre usage de ses membres porte ses petites mains sur tous les objets qui se trouvent à sa portée, et quel plaisir il paroît prendre à les toucher dans toutes leurs parties, à en parcourir toutes les surfaces. On a vu des aveugles que le toucher instruisoit des variétés des couleurs, et même de leurs diverses nuances. Comme la différence de coloration tient à la disposition, à l'arrangement et au nombre des pe-

tites inégalités qu'offre la surface des corps qui semblent les mieux polis, et les rendent propres à réfléchir tel ou tel rayon lumineux en absorbant tous les autres, on ne répugne point à croire aux faits de cette nature, rapportés par Boyle et par d'autres physiciens.

Quelques parties paroissent douées d'un toucher particulier : telles sont les lèvres, dont le tissu se gonfle et s'épanouit sous un contact voluptueux ; turgescence vitale qui s'explique sans admettre un tissu spongieux dans leur structure; tels encore ces organes que Buffon regarde comme un *sixième sens*. Dans le plus grand nombre des animaux, les lèvres, et surtout l'inférieure, dépourvues de plumes, d'écailles ou de poils, sont l'organe d'un toucher toujours imparfait. Lorsque les quadrupèdes domestiques, tels que le cheval, le chien, le bœuf, etc., veulent apprécier les qualités tactiles des corps, on les voit en approcher le bout de leur museau, seul endroit où l'enveloppe extérieure soit dépourvue des poils qui, partout ailleurs, en recouvrent la surface. Les appendices charnues de certains oiseaux et de plusieurs poissons, les antennes des papillons, toujours placées au voisinage de l'ouverture de la bouche, remplissent le même usage. La queue du castor, la trompe de l'éléphant, sont également les parties de leur corps où le toucher a le plus de délicatesse. Remarquez que la perfection de l'organe du toucher assure à ces derniers animaux

un degré d'intelligence qui n'est départi à nul autre quadrupède, et devient peut-être le principe de leur sociabilité. Les livres des voyageurs, ceux des naturalistes, fourmillent de faits qui attestent la rare sagacité de l'éléphant; quelques philosophes indiens ont été jusqu'à lui accorder une âme immortelle. Si les oiseaux, malgré la prodigieuse activité de leur vie nutritive, ont néanmoins une intelligence si bornée, sont si peu susceptibles d'un attachement durable, et se montrent si rebelles à l'éducation, n'en trouve-t-on pas la cause dans l'imperfection de leur toucher? En vain le cœur pousse vers tous leurs organes, avec plus de force et de vélocité que dans nul autre animal, un sang plus chaud et doué, à un degré plus éminent, de toutes les qualités qui caractérisent celui des artères; inutilement leur digestion est-elle rapide, leur force musculaire vive, capable de mouvemens forts et long-temps continués, certains de leurs sens, tels que ceux de la vue et de l'ouïe, avantageusement disposés; le toucher étant presque nul, et le plus grand nombre des impressions affectant ce sens, qui nous instruit du plus grand nombre des propriétés dont les corps jouissent, le cercle de leurs idées doit être extrêmement étroit, et leurs habitudes, leurs mœurs, bien plus éloignées que celles des quadrupèdes, des habitudes et des mœurs de l'homme.

CXXXV. De tous les sens, le toucher est le plus généralement répandu parmi les animaux;

tous en jouissent, depuis l'homme, qui par la perfection de ce sens l'emporte sur tous les animaux vertébrés, jusqu'au polype, qui, réduit au seul toucher, l'a tellement délicat, qu'il semble, pour me servir d'une expression heureuse de M. Duméril, palper jusqu'à la lumière. La peau de l'homme est plus fine et plus nerveuse que celle des autres mammifères; sa surface n'est recouverte que par l'épiderme (partie insensible à la vérité), mais si mince qu'elle n'intercepte pas la sensation, tandis que les poils dont est abondamment couvert le corps des quadrupèdes, les plumes dont est revêtu celui des oiseaux, en éteignent toute la vivacité. La main de l'homme, cet instrument admirable de son intelligence, dont la structure a paru à quelques philosophes (1) expliquer suffisamment la supériorité dont il jouit sur toutes les espèces vivantes; la main de l'homme, nue et divisée en un grand nombre de parties mobiles, susceptibles de changer à chaque instant de figure, d'embrasser exactement la surface des corps, est bien plus propre à apprécier leurs qualités tactiles que le pied du quadrupède, enveloppé d'une substance cornée, et que la patte de l'oiseau, revêtue d'écailles trop épaisses pour ne pas émousser la sensation.

Nous ne saurions trop insister sur l'importance

---

(1) *Voyez* l'ouvrage de Galien, *de Usu partium*, cap. 4, 5 et 7; Buffon, *Histoire naturelle*, t. IV et V, in-12.

du toucher, et sur la prééminence dont jouit cet instrument de nos sensations. Comme nous l'avons vu en commençant son histoire, les autres sens nous fournissent les élémens d'un assez petit nombre d'idées. Un homme aveugle et sourd, en même temps privé de l'odorat et du goût, pourroit encore avoir, à l'aide du toucher, une existence morale fort étendue; l'exercice de ce sens suppléant à celui des autres, inhabiles à le remplacer : les impressions qu'il transmet l'emportent tellement par leur netteté, par leur précision comme par leur nombre et leur variété, sur celles qui nous viennent par la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, qu'une intelligence supérieure s'en composeroit uniquement. Les idées que le sens du toucher excite dans le cerveau ne sont point d'un *ordre* plus *relevé* que celles qui y naissent par l'action des autres sens. L'idée de la figure d'un corps transmise par le sens du toucher n'est ni plus relevée ni plus basse que celle de sa couleur transmise par la vue : la saveur et l'odeur d'une substance sont des qualités tout aussi nobles que sa température et sa densité. Condillac, Buffon et les *physiologistes modernes* n'ont point établi l'excellence du toucher d'après l'élévation ou l'abjection des idées qu'il fournit à l'intelligence, mais d'après leur nombre infiniment varié et leur précision admirable; aucun d'eux n'a commis une erreur aussi grossière, et c'est donc bien gratuitement que M. Magendie les en accuse, en nous

assurant que le toucher n'a réellement aucune prérogative sur les autres sans, sans appuyer cette assertion d'aucune preuve.

CXXXVI. *Des nerfs.* Ces cordons blanchâtres qui se rendent à la base du cerveau, à la moelle allongée et à celle de l'épine, existent dans toutes les parties du corps, et leur donnent à la fois la puissance de sentir et celle de se mouvoir. Dans cette analyse des fonctions du système nerveux, l'ordre naturel exige que nous ne les considérions ici que comme conducteurs du sentiment; nous verrons ensuite de quelle manière ils transmettent le principe des mouvemens aux organes qui les exécutent. Les nerfs naissent (1) de toutes les parties sensibles, par des extrémités

---

(1) Quand on considère les nerfs comme conducteurs des sensations, il est juste de dire qu'ils prennent naissance des parties sensibles, puisque c'est l'extrémité la plus éloignée du cerveau qui éprouve l'*impression sensitive*, laquelle se propage jusqu'à cet organe lui-même, en suivant le trajet du nerf. Lorsqu'on étudie, au contraire, les phénomènes des mouvemens, on doit faire naître les nerfs du cerveau; car c'est du centre à la circonférence que le principe du mouvement se transmet aux muscles appelés, par Cullen, *extrémités mouvantes des nerfs.* Long-temps les anatomistes ont agité la question de savoir si les nerfs venoient du cerveau et de la moelle de l'épine, ou si ces parties étoient produites par la réunion des nerfs; question que seule pouvoit résoudre l'observation du mode de développement de ces organes. Or si l'on étudie les jeunes embryons des animaux, on trouve que les nerfs latéraux du

en général molles et pulpeuses, mais d'une consistance et d'une figure qui ne sont pas les mêmes dans toutes; et c'est à ces variétés de disposition et de structure que doivent être rapportées les modifications de la sensibilité dans les divers organes.

On peut dire qu'il existe dans les organes des sens une certaine relation entre la mollesse de l'extrémité nerveuse et la nature des corps qui portent leur impression sur elle. C'est ainsi que l'état presque fluide de la rétine est dans un rapport évident avec l'indéfinie subtilité de la lumière. Le toucher que ce fluide exerce ne pouvoit produire une impression suffisante qu'autant que la partie qui le ressent seroit susceptible d'être ébranlée par le moindre contact. La portion molle de la septième paire, dépouillée de toute enveloppe solide, et réduite à sa pulpe médullaire, partage avec facilité les ébranlemens sonores qui lui sont transmis par la liqueur au milieu de laquelle ses filets sont plongés. Les nerfs de l'odo-

---

tronc, de la tête et du bassin, existent et ont acquis tout leur développement avant que l'axe cérébro-spinal, c'est-à-dire la moelle de l'épine et l'encéphale encore liquides aient revêtu leurs formes primitives. Sans communication avec eux, les nerfs finissent par les rejoindre et s'y implanter lorsque s'achève leur développement, qui se fait toujours de la circonférence au centre, et non du centre à la circonférence, comme on l'avoit professé jusqu'ici. (*Voyez* Serres, *Anatomie comparée du cerveau, etc., discours préliminaire.*

rat, du goût, sont plus à découvert, se présentent mieux à nu que les papilles nerveuses de la peau, chargées d'éprouver les impressions que produisent les propriétés les plus grossières des corps, etc.

Du lieu de leur naissance, les nerfs se portent vers le cerveau, la moelle allongée ou celle de l'épine, en ligne presque droite, rarement tortueux, comme le sont la plupart des vaisseaux. Arrivés dans ces parties, ils s'y terminent en se confondant avec leur substance, comme nous le dirons après avoir étudié la structure de ces cordes nerveuses.

CXXXVII. Chaque nerf est formé d'un grand nombre de filamens extrêmement déliés, et qui tous ont deux extrémités, l'une au cerveau, et l'autre à la partie de laquelle ils naissent, ou dans laquelle ils se terminent. Chacune de ces fibres nerveuses, quelle que soit sa ténuité, est composée d'un tuyau membraneux qui émane de la pie-mère. Dans les parois de ce tuyau se ramifie une multitude de vaisseaux d'une finesse extrême: son intérieur est rempli d'une moelle blanchâtre, espèce de bouillie que Reil dit avoir isolée du petit canal qui la renferme, en la concrétant par le moyen de l'acide nitrique, qui dissout la gaîne membraneuse, et laisse à découvert la pulpe médullaire, laquelle forme la partie essentielle ou la base du filet nerveux. Le même physiologiste a dévoilé d'une autre manière la structure intérieure

de chaque fibrille nerveuse ; il a dissous la partie blanchâtre ou pultacée par l'immersion prolongée dans une lessive alkaline ; et il est ainsi parvenu à la séparer du tuyau membraneux qui la renfermoit, et qui reste vide. La gaîne membraneuse, de nature cellulaire, n'a rien de remarquable que sa consistance et le nombre vraiment prodigieux de vaisseaux de toute espèce qui se distribuent dans l'épaisseur de ses parois : elle abandonne le nerf à ses deux extrémités, et ne le couvre que dans son trajet.

Chaque fibre nerveuse, ainsi formée de deux parties bien distinctes, se réunit à d'autres fibres de structure parfaitement semblable, pour former un filet nerveux qu'enveloppe une gaîne commune fournie par le tissu cellulaire. Ces filets rassemblés forment des ramifications, celle-ci des rameaux, les rameaux des branches, et les branches des troncs, autour desquels se trouve une enveloppe cellulaire commune; puis d'autres enveloppes pour chaque faisceau de filets, et enfin une gaîne particulière pour chacun des filets eux-mêmes. Lorsque les cordons nerveux ont une certaine grosseur, on voit des artères et des veines d'un calibre assez considérable s'engager entre les paquets de fibres qui les forment par leur assemblage, se diviser après s'être introduites dans leur épaisseur, et fournir les ramifications capillaires qui se répandent dans les parois de la gaîne propre à chaque filament. Ce sont ces petits vaisseaux

qui, selon Reil, laissent exhaler la substance nerveuse dans l'intérieur de chaque tuyau membraneux : celui-ci devient ainsi l'organe sécréteur de la moelle qui le remplit.

CXXXVIII. Les filets nerveux se réunissent ou se séparent souvent sans se confondre. Alors les divisions des nerfs ne ressemblent pas à celles des artères ; leurs réunions ne peuvent être comparées à celles des veines : ce n'est, dans le premier cas, qu'une simple séparation ; dans le second, qu'un rapprochement de filamens qui marchoient séparés, et qui, pour se rassembler sous des enveloppes communes, n'en conservent pas moins chacun leur gaîne particulière, ne sont que juxta-posés, et restent parfaitement distincts. Cependant, dans plusieurs faisceaux, les communications entre les filets sont évidentes : ces anastomoses nerveuses incontestables paroissoient rendre difficile à concevoir comment les impressions que plusieurs extrémités sensitives reçoivent à la fois arrivent au cerveau sans se confondre, et de quelle manière le principe du mouvement est dirigé vers un seul muscle, qui reçoit ses nerfs du même tronc que les autres muscles du membre. Mais depuis que les travaux de Ch. Bell ont appris que les nerfs pouvoient être rangés en plusieurs grandes classes, à l'une desquelles les anatomistes anglais donnent le nom de *nerfs surajoutés*, et que les uns et les autres ont des caractères et des fonctions parfaitement distinctes, les anastomoses des filets nerveux ne pa-

roissent plus devoir compliquer l'exercice de leurs fonctions.

On doit admettre quatre espèces de nerfs : 1° ceux à double racine, comme les nerfs spinaux, le sous-occipital et le trijumeau ou la cinquième paire des nerfs crâniens, servant par l'une de ces racines aux mouvemens volontaires, tandis que l'autre est le conducteur de la sensibilité, les racines antérieures et postérieures des nerfs spinaux, par exemple; 2° les nerfs à une seule racine, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, le nerf auditif ou portion molle de la septième paire, et enfin la neuvième ou grand hypoglosse, nerfs qui servent exclusivement les uns au sentiment, comme les nerfs olfactifs, optiques et auditifs; tandis que la troisième, la quatrième, la sixième et la neuvième paire servent seulement à mouvoir les muscles de l'œil et de la langue ; 3° les nerfs respiratoires, vocaux ou expressifs, nerfs que M. Ch. Bell regarde comme surajoutés, et dont il forme un ordre distinct auquel se rapporte la portion dure de la septième paire ou nerf facial. La huitième paire ou nerf pneumogastrique, lequel peut être considéré comme le centre de ce système particulier de nerfs, le glossopharingien, le spinal ou accessoire de Willis, et enfin le diaphragmatique et le thoracique externe. Tous ces nerfs procèdent du faisceau latéral de la partie supérieure de la moelle, et sont surtout destinés à

présider aux fonctions des organes plus ou moins liés avec la respiration.

4° Enfin on doit admettre une classe de nerfs circulatoires qui tiennent à tous les nerfs spinaux; ce sont les grands sympathiques.

C'est en partageant ainsi le système nerveux en quatre grandes classes, que l'on parvient à concevoir les fonctions spéciales de chacune des parties de cet appareil si compliqué de l'organisation animale, et à comprendre que la sensibilité et le mouvement ont dans les nerfs des deux premières classes des agens particuliers et distincts; les nerfs des deux autres classes servent à lier ensemble, par des connexions plus ou moins intimes, les plus importantes fonctions de notre économie. Les anciens anatomistes paroissent avoir soupçonné cette distinction importante, lorsqu'ils ont appelé des noms de moyen et de petit sympathiques la paire vague et la portion dure de la septième paire. Ainsi que le remarque parfaitement M. J. Shaw (1823), l'établissement de cette connexité est l'usage le plus important de la huitième paire. La section de ce nerf trouble et suspend, comme nous l'avons vu, la digestion stomacale, moins en empêchant la sécrétion du suc gastrique, laquelle, ainsi que plusieurs autres sécrétions, s'accomplit dans les animaux d'un ordre inférieur, et qui n'ont ni nerfs ni cerveau, qu'en rompant ce lien nécessaire qui unit et la digestion et la respiration, soit entre elles, soit aux autres fonctions les

plus importantes. La digestion, la respiration, la circulation sont moins des fonctions séparées que des degrés différens du grand acte de la nutrition, opération fondamentale, et tellement indispensable à la vie, que les organes qui les exécutent ne sauroient être trop étroitement enchaînés par des liens qui établissent entre eux une harmonie nécessaire ainsi qu'une mutuelle dépendance.

En général les nerfs s'écartent et se réunissent sous un angle plus ou moins aigu, également favorable au cours d'un fluide, de la circonférence au centre, et du centre à la circonférence.

La structure des nerfs se modifie dans certaines portions de leur système. Ainsi les fibres médullaires du nerf optique sont dépourvues d'enveloppes membraneuses; la pie-mère, fournissant une seule gaîne au cordon formé par leur assemblage, la dure-mère y joint une seconde tunique à la sortie du crâne. Cette tunique, qui est également commune à la totalité du nerf, l'abandonne à son entrée dans le globe de l'œil, et se confond avec la sclérotique. Une artériole marche au centre du nerf optique, et, se divisant ensuite, forme un réseau merveilleux qui soutient la pulpe médullaire de la rétine. Les cordons qui parcourent des conduits osseux, tels que le nerf vidien de la cinquième paire, sont dépourvus d'enveloppe celluleuse, et leur consistance est toujours moins grande que celle des nerfs qui sont environnés de parties molles.

Arrivé au cerveau, à la moelle allongée ou à celle de l'épine, chaque filet nerveux, comme nous l'avons déjà dit, se dépouille de sa gaîne membraneuse, qui se confond avec la pie-mère, enveloppe immédiate de ces parties centrales du système sensitif. La partie médullaire ou blanche se prolonge dans l'épaisseur de leur substance, qui peut être regardée comme principalement formée par l'assemblage de ces extrémités nerveuses qu'il est difficile de distinguer dans son tissu, à cause de son peu de consistance. On sait depuis long-temps que l'origine des nerfs n'est point l'endroit où ils se détachent du cerveau, qu'ils s'enfoncent dans la substance de ce viscère, que leurs fibres s'y entrecroisent de manière que celles du côté droit passent à gauche, et *vice versâ.* Sœmmering pensoit que les racines des nerfs, et surtout celles des nerfs de l'odorat et de la vue, de l'ouïe et du goût, alloient se rendre aux éminences qui font saillie dans les parois des ventricules du cerveau, et que leur dernière extrémité se trouvoit humectée par la sérosité qui entretient la contiguité de ces surfaces intérieures. On a cru long-temps aussi que les extrémités cérébrales des nerfs se réunissoient toutes en un point déterminé de l'organe encéphalique, et qu'à ce point central se rapportoient toutes les sensations, tandis qu'il en partoit toutes les déterminations d'où naissent les mouvemens volontaires. Mais les travaux de M. Gall sur l'organisation du système ner-

veux et du cerveau ont entièrement renversé ces diverses hypothèses.

Considérés dans les divers animaux qui en sont pourvus, la moelle de l'épine et les nerfs sont d'autant plus gros, relativement au cerveau, que l'animal est plus éloigné de l'homme. Dans les espèces carnivores, le prodigieux développement des masses musculaires exigeoit des nerfs moteurs d'un volume proportionné; aussi, chez elles, la masse cérébrale, comparée aux nerfs et à la moelle de l'épine, est-elle très-peu considérable. On observe que le même rapport existe dans certains hommes doués d'un tempérament athlétique : toute la force nerveuse semble employée à mouvoir ces masses énormes; et les nerfs, quoique très-petits proportionnellement au reste du corps, sont cependant très-gros si on les compare à l'organe cérébral. Dans les enfans, dans la femme, et chez les individus doués d'une grande sensibilité, les nerfs sont très-gros relativement aux autres parties; ils se rapetissent et se dessèchent en quelque sorte chez les personnes avancées en âge : le tissu cellulaire qui les environne acquiert plus de consistance, contracte avec eux des adhérences plus intimes, et il existe une certaine analogie entre les nerfs des vieillards, enveloppés de ce tissu jaunâtre qui rend leur dissection extrêmement laborieuse, et les rameaux d'un vieil arbre recouverts par une mousse destructive.

Les usages des nerfs ne pouvant être exposés

séparément de ceux de la moelle de l'épine et du cerveau, nous passons de suite à l'histoire de ces deux parties importantes de l'appareil des sensations.

CXXXIX. *De la moelle de l'épine et de ses fonctions.* Nous continuerons à nommer ainsi la masse nerveuse que renferme le canal vertébral, bien qu'il n'y ait aucune ressemblance entre elle et la substance médullaire des os, mais les termes de *prolongement rachidien de l'encéphale*, sous lesquels on a voulu la désigner, n'expriment pas une idée moins fausse que l'expression de la moelle de l'épine. On ne peut point en effet la considérer comme un prolongement du cerveau; il n'est point vrai qu'elle en naisse ainsi qu'on voit l'artère aorte naître et se détacher du ventricule gauche du cœur: elle est indépendante de l'organe encéphalique : partie centrale de l'appareil nerveux, on la trouve chez plusieurs animaux qui manquent de cerveau; son volume n'est pas proportionné à celui de cet organe. Le bœuf, le cheval, le mouton, par exemple, dont le cerveau est plus petit que celui de l'homme, ont une moelle épinière plus considérable : on la trouve chez les fœtus acéphales, chez ceux même dans lesquels le cerveau n'a jamais existé. Ce dernier organe paroît lui être comme surajouté, et cela seulement dans les animaux les plus composés et les plus parfaits, son volume proportionnel étant toujours en raison inverse de la

moelle de l'épine. On ne peut donc point la faire dériver du cerveau, et la considérer comme or mée par un faisceau de nerfs qui s'en détachent successivement. Son volume ne décroît point par degrés et en raison des branches qu'elle fournit; et loin d'offrir un cordon qui va s'amincissant à mesure qu'on s'éloigne du cerveau, elle consiste en une suite de nœuds ou de renflemens séparés par autant de rétrécissemens qu'il y a de paires de nerfs qui en prennent naissance. Enfin la moelle épinière préexiste au cervelet ainsi qu'au cerveau; ces organes en proviennent, et n'en sont, si l'on peut ainsi parler, qu'une efflorescence. Vers la fin du second mois de la vie du fœtus, première époque à laquelle le cerveau puisse être rendu apparent par l'action de l'alcohol, cet organe, très-petit par rapport à la moelle épinière, résulte évidemment du prolongement des éminences ou cordons pyramidaux et olivaires. Les diverses parties de la masse encéphalique se forment ainsi graduellement par le développement successif des cordons pyramidaux, et c'est seulement vers la fin de la gestation que l'on peut apercevoir des circonvolutions bien prononcées. (Tiedeman, *Anatomie du cerveau, etc. Nuremberg*, 1816.)

Huit cordons ou faisceaux distincts forment originairement la moelle épinière, chaque paire de faisceaux correspondant à l'un des côtés de la moelle dont la forme est quadrangulaire. Tels sont

les rudimens primitifs et comme fondamentaux du système nerveux, puisqu'ils préexistent à la masse encéphalique et aux nerfs eux-mêmes, dont la formation est plus tardive. (Bailly. 1823.)

Des fonctions spéciales, différentes de celles que remplit le cerveau, paroissent assignées à la moelle de l'épine. En elle réside la source de tous les mouvemens, soit volontaires, soit involontaires, qui s'exécutent dans l'économie animale; elle préside à ceux du cœur et de tous les muscles de la vie intérieure comme à ceux de l'appareil locomoteur; et tandis que le cerveau, réservé à des fonctions plus nobles et plus importantes, semble exclusivement chargé des fonctions de l'intelligence et de la pensée, la moelle de l'épine tient dans sa dépendance toutes les puissances contractiles, et c'est sous son influence que toutes leurs contractions s'exécutent.

Thomas Bartholin avoit déjà reconnu que le cerveau étoit plus particulièrement l'organe des sensations, et la moelle de l'épine celui des mouvemens (1). Il avoit également fait sentir que la meilleure manière de procéder à la dissection du cerveau étoit de procéder de bas en haut, et non

(1) « *Et id quidem manifestius fit inspicientibus anatomen* « *piscium ; ibi enim medullæ caput et cauda insignis est* « *magnitudinis ; processus verò medullæ ad cerebrum ad-* « *modùm exiguum ; cujus rei causa est, quòd pisces motu*

point du sommet à la base, comme on a continué de le faire depuis lui jusqu'à nos jours.

Qu'on jette un coup d'œil sur l'échelle graduée des êtres sensibles, dit le docteur Gall, dans ses *Recherches sur le système nerveux en général, et sur le cerveau en particulier* (1), la substance sensible, encore pulpeuse dans les polypes, se rassemble peu à peu en filamens nerveux et en troncs communs dans les êtres un peu plus relevés. Pour établir un commerce plus étendu avec le monde extérieur, la nature a ajouté des appareils d'autant plus multipliés que les rapports de l'espèce devoient être plus nombreux : c'est ainsi que, par l'addition successive de nouveaux organes, elle s'élève jusqu'à l'être le plus composé, jusqu'à l'homme, par des productions cérébrales superposées.

Le cerveau, simple tubercule ajouté à l'extrémité antérieure de la moelle, dont il semble n'être qu'une partie accessoire, un appendice dans les insectes, puisque chez eux il n'est guère plus gros que chacun de ses nombreux renflemens, devient plus composé à mesure que l'on s'élève dans l'échelle animale. Cependant, dans les poissons, il ne

---

« *magis quàm sensu utantur, ac sic ad sensum plus con-* « *ferat cerebrum vel cortex, ad motum plus medulla ipsa.* » Anatomia.

(1) Un vol. in-4°. Paris, 1809, page 28.

passe guère en volume la moelle épinière. Enfin, chez les mammifères, il contient les mêmes parties que dans l'homme; elles y sont disposées à peu près selon le même ordre; mais, chez aucun animal, le double appareil des fibres divergentes et convergentes n'est mieux développé; chez aucun, le cerveau proprement dit, c'est-à-dire la partie supérieure de l'encéphale, ou les hémisphères, ne présentent un volume proportionnel plus considérable : là paroissent siéger les organes des plus nobles fonctions de l'intelligence, tandis que, dans le cervelet, la moelle allongée et celle de l'épine, réside plus particulièrement le principe des facultés qui nous sont communes avec les autres espèces animales.

Le système nerveux ne doit donc point être comparé à un arbre, dont le tronc, représenté par la moelle de l'épine, auroit ses racines dans le cerveau, et répandroit ses branches dans toutes les parties du corps; on doit plutôt le considérer comme un réseau dont les fils communiquent ensemble, se séparent, se réunissent et rencontrent plusieurs masses ou renflemens plus ou moins volumineux; ces masses ou ganglions peuvent être envisagés comme autant de centres de communication.

Le cerveau ne peut point être regardé comme un ganglion, ou même comme un amas de ganglions, comme le ganglion commun des nerfs du crâne, ainsi que l'ont fait quelques physiologistes:

les nerfs qui se détachent de sa base ou de la moelle allongée ont leur origine distincte de sa substance. Leur volume n'est point en rapport avec sa masse, mais proportionné à la perfection des divers sens dans les différentes espèces animales; ainsi le nerf olfactif, fort volumineux dans la taupe, est très-petit dans l'aigle, dont le nerf optique est au contraire extrêmement développé.

La moelle de l'épine doit être considérée comme une suite de ganglions, communiquant tous, soit entre eux, soit avec le cerveau. Ces ganglions sont d'une grosseur proportionnée à celle des nerfs qui en émanent. C'est pourquoi la moelle de l'épine a plus de volume vers la partie inférieure des régions cervicale et dorsale que dans les autres points de sa longueur. La colonne vertébrale peut-elle être comparée à une pile galvanique, dont la moelle de l'épine seroit le conducteur, et dont le cerveau et les parties génitales formeroient les deux extrémités occupant et comme constituant les deux pôles de cette sorte d'appareil électro-moteur? L'observation établit, il est vrai, une sorte d'antagonisme entre ces deux organes. Une opposition analogue existe-t-elle entre le système nerveux cérébral et celui qui constitue les nerfs grands sympathiques? Nous avons déjà remarqué plusieurs fois combien cette prétention d'assimiler complétement les phénomènes vitaux à ceux de l'électricité nous paroissoit peu fondée. La communication de la moelle de l'épine avec le cerveau

est établie au moyen d'un double faisceau de fibres qui s'entrecroisent, forment les pyramides, et se portent vers le cerveau, où nous les retrouverons lorsque nous étudierons la structure de ce viscère. Accordons quelques instans à l'examen de ses enveloppes.

CXL. *Des enveloppes du cerveau.* S'il est vrai qu'on puisse estimer l'importance d'un organe par les soins qu'a pris la nature pour le mettre à l'abri des lésions extérieures, nul ne paroîtra plus essentiel que le cerveau; car il n'en est point qui paroisse avoir été l'objet d'une prévoyance plus attentive. La substance de ce viscère a si peu de consistance, que la moindre injure eût altéré sa structure et dérangé son action; aussi se trouve-t-il puissamment protégé par plusieurs enveloppes, dont la plus solide est la boîte osseuse qui le renferme.

Rien ne semble mieux connu que les os nombreux dont l'assemblage régulier forme les diverses parties de la tête humaine. Tout ce qui est relatif à la place qu'ils occupent, à leur grandeur respective, aux éminences qui s'élèvent de leurs surfaces, aux enfoncemens dont ils sont creusés, aux cavités dont ils servent à former les parois; tout ce qui a trait à leur structure intime, à la proportion différente des substances dont ils sont composés, à l'agrégation de quelques-unes de ces substances dans certains points de leur étendue, a été décrit par quelques anatomistes modernes avec une exac-

titude qu'il seroit difficile de surpasser. Plusieurs n'ont cependant point apprécié l'influence directe de leur mode d'union sur les usages qu'ils sont destinés à remplir ; aucun n'a assez fait sentir la manière dont tous concourent à un but principal, la conservation des organes que renferment les cavités du crâne et de la face.

Hunauld, dans un mémoire inséré parmi ceux de l'Académie des sciences, pour l'année 1730, est le premier qui ait tenté de rendre raison de la disposition des surfaces par lesquelles s'articulent les os du crâne. Après avoir rappelé quelques idées relatives à la théorie des voûtes, et établi que la différence d'étendue entre leurs surfaces convexe et concave nécessitoit la coupe oblique des pièces dont elles sont formées, il explique les utilités de l'articulation écailleuse entre les temporaux et les pariétaux.

Lorsque la voûte du crâne est chargée d'un poids très-lourd, les premiers empêchent les pariétaux, sur lesquels l'effort porte immédiatement, de s'enfoncer en dedans, ou de s'écarter en dehors. Hunauld les compare avec raison à de véritables arcs-boutans, qui sont aux pariétaux ce que les murs sont par rapport aux voûtes qu'ils soutiennent.

Bordeu (1) essaya de faire pour les os de la face

---

(1) Académie des sciences, mémoires présentés par les savans étrangers, tome III.

ce que Hunauld avoit exécuté relativement à ceux du crâne. Selon lui, la plupart des os de la mâchoire supérieure, mais principalement les maxillaires supérieurs, résistent à l'effort de la mâchoire inférieure, qui, en agissant sur l'arcade dentaire supérieure, tend sans cesse à pousser en haut, ou à écarter en dehors les os dans lesquels sont implantées les dents de cette arcade. Comme la plus grande partie de l'effort les détermine en haut, c'est aussi de ce côté que les os de la mâchoire supérieure s'appuient plus fortement sur ceux du crâne. L'auteur termine ce mémoire, rempli de vues ingénieuses, en proposant aux physiologistes la solution du problème suivant : *Un homme supportant un grand poids sur sa tête, et serrant fortement quelque chose entre les dents, quel est l'os de la tête qui fait le plus d'effort ? quel est celui qui soutient toute la machine ?*

Le corps du sphénoïde, et principalement sa moitié postérieure, me paroît être ce point central auquel vont aboutir les efforts réunis des os du crâne et de la face, dans la circonstance supposée par Bordeu.

Le sphénoïde s'articule avec tous les autres os du crâne. Il a des connexions immédiates avec plusieurs de ceux de la face, comme les os de la pommette, du palais, le vomer, quelquefois même les maxillaires supérieurs. Ces os de la face sont les seuls qui, dans le cas dont il s'agit, supportent l'effort de la mâchoire inférieure contre la supé-

rieure. L'ethmoïde, les os unguis et les cornets inférieurs, minces et fragiles, n'ont que des usages relatifs aux fosses nasales, dont ils augmentent les anfractuosités, et ne méritent de notre part aucune attention. Le vomer peut, à la vérité, transmettre à l'ethmoïde une petite portion de l'effort; car la partie antérieure de son bord supérieur est articulée avec la lame perpendiculaire de cet os : mais cette quantité est d'autant moindre que le vomer, peu épais, n'en supporte qu'une très-petite partie, et le transmet presqu'en totalité au corps du sphénoïde, avec la face inférieure duquel il s'articule.

L'effort exercé sur les os de la mâchoire supérieure est transmis, au moyen des apophyses montantes des maxillaires supérieurs, par les éminences orbitaires et zygomatiques des os de la pommette, et par le bord supérieur de ceux du palais et du vomer, au coronal, aux temporaux et au sphénoïde.

Si nous voulons déterminer ce que devient la plus grande partie de l'effort transmis au coronal par les os maxillaires et de la pommette, observons d'abord qu'il s'articule avec le sphénoïde par toute l'étendue de son bord inférieur, taillé en biseau aux dépens de la table interne, en sorte qu'il se trouve recouvert par le bord antérieur des petites ailes du sphénoïde, dont la coupe oblique est aux dépens de la table externe de l'os. Le coronal s'articule encore avec le sphénoïde par les

parties latérales inférieures de son bord supérieur. Le reste de ce bord supérieur est uni à l'antérieur des pariétaux, qui, au moyen d'une coupe oblique en sens contraire, appuient sur la partie moyenne de ce bord, tandis que le coronal s'appuie latéralement sur eux.

Cet os, que l'effort tend à pousser en haut et en arrière, ne peut obéir à cette double impulsion; car, d'un côté, son mode d'articulation avec le bord antérieur des petites ailes du sphénoïde, et la partie interne du bord antérieur des pariétaux, s'oppose au mouvement d'élévation, tandis que la résistance des derniers l'empêche d'être poussé en arrière. La portion de l'effort que soutiennent les pariétaux suit la ligne courbe que ces os décrivent, se propage le long de celle que forme l'occipital, et arrive ainsi à la face postérieure du corps du sphénoïde.

La partie immédiatement transmise aux faces antérieure et inférieure de cet os, par ceux du palais et le vomer, est peu considérable et proportionnée à leur peu d'épaisseur. La moitié antérieure du corps du sphénoïde, creusée par le sinus sphénoïdal, n'en eût pu supporter une plus grande quantité; enfin la position du corps placé entre les arcades dentaires, au-devant de la place qu'occupent les os du palais, explique pourquoi c'est pricipalement par les maxillaires supérieurs que la transmission s'opère.

Voilà de quelle manière est porté sur les faces

antérieure, postérieure et inférieure du corps du sphénoïde, l'effort exercé de bas en haut par la mâchoire inférieure sur la supérieure.

Les temporaux, qui n'en reçoivent qu'une très-petite portion par l'angle postérieur des os de la pommette, supportent la plus grande partie de celui qui s'exerce de haut en bas, ou de la voûte vers la base du crâne. Le poids dont est chargé le sommet de la tête tend à enfoncer en bas ou à écarter en dehors les pariétaux, qui résistent en vertu du point d'appui que les temporaux leur fournissent. Ceux-ci transmettent l'effort sur les parties latérales postérieures du corps du sphénoïde. Pour cela, les grandes ailes de cet os s'articulent, par toute l'étendue de leur bord externe, et par le quart postérieur environ du bord interne, avec les temporaux. En outre, l'extrémité supérieure des grandes ailes est taillée en biseau, aux dépens de la table interne de l'os, pour s'articuler avec l'angle antérieur et inférieur des pariétaux, et remplir, à l'égard de ces os, le même usage que la portion écailleuse des temporaux.

Les parties latérales et postérieures du corps du sphénoïde supportent donc la presque totalité de l'effort résultant de la pression exercée sur les pariétaux. Elle leur est transmise par les grandes ailes, qui la reçoivent elles-mêmes, soit immédiatement par l'angle antérieur et inférieur de ces os, soit médiatement par les temporaux. La petite portion que ces derniers transmettent à l'occipital

va, en suivant la ligne courbe qu'il décrit, se faire ressentir sur la face postérieure du corps du sphénoïde.

L'on doit ajouter à l'effort résultant de la pression qu'exerce le corps placé sur le sommet de la tête celui qui dépend de la contraction des muscles élévateurs de la mâchoire inférieure. Ceux-ci tendent à abaisser les temporaux, les os de la pommette et le sphénoïde, et ils y emploient une force égale à celle par laquelle ils élèvent l'os maxillaire inférieur, et le serrent fortement contre la mâchoire supérieure.

L'effort exercé de la voûte à la base du crâne dépend donc de deux causes bien différentes. La portion qui résulte de l'action des élévateurs de la mâchoire inférieure est égale à l'effort qu'exerce de bas en haut cette mâchoire. Il seroit inutile, d'après ce qui a été dit, de revenir sur son mode de transmission. Observons seulement que l'un de ces muscles, le moins puissant à la vérité (le ptérygoïdien interne), tend à tirer en bas le sphénoïde, et empêche que cet os, engagé à la manière d'un coin dont la base seroit tournée en haut, ne se dégage par l'effort qu'exercent sur lui les os entre lesquels il est placé.

Les faces postérieure, antérieure, inférieure et latérales du corps du sphénoïde, supportent donc la totalité de l'effort qu'exercent les uns sur les autres les divers os du crâne et de la face, lorsque, le sommet de la tête étant chargé d'un poids très-

lourd, on serre en même temps un corps avec force entre les arcades dentaires.

La partie antérieure du corps de l'os, creusée par le sinus sphénoïdal, est mince et très-fragile. La portion postérieure, correspondante à la selle turcique, est seule capable de résister aux efforts que nous le croyons destiné à soutenir (1) : aussi est-ce par elle que l'ossification commence ; ce qui confirme l'observation de *Kerkringius*, qui remarque que l'endroit où les os commencent à se durcir est précisément celui sur lequel ils doivent supporter les plus grands efforts ; aussi les grandes ailes par lesquelles s'opère la transmission de la plus grande partie de ceux que soutient le corps du sphénoïde naissent-elles des parties latérales de sa moitié postérieure, par un pédicule dont l'épaisseur considérable est encore augmentée par la base des apophyses ptérygoïdes qui se détachent de sa partie inférieure.

---

(1) Le sinus sphénoïdal se prolonge à la vérité dans cette partie postérieure du corps de l'os, chez les sujets très-avancés en âge, mais cette portion de sa cavité a des parois fort épaisses. La partie antérieure de l'apophyse basilaire de l'occipital, alors exactement soudée au sphénoïde, peut d'ailleurs être considérée comme faisant partie de cet os dont on ne peut la détacher. Le crâne du vieillard ressemble en cela à celui de plusieurs quadrupèdes, chez lesquels l'union du sphénoïde à l'occipital s'effectue de si bonne heure, qu'on pourroit considérer ces deux os comme n'en formant réellement qu'un seul.

Les efforts qui s'exercent sur le crâne se font donc principalement ressentir vers sa base, endroit où les parois, plus épaisses, leur offrent plus de résistance. Cette transmission explique pourquoi dans les plaies de tête on trouve assez souvent des fractures vers la base du crâne, le reste de la boîte osseuse conservant son intégrité.

Le nom que les anciens ont donné à l'os dont j'ai déterminé le principal usage, nom composé de *sphénos*, qui veut dire *coin*, et de *eidos* qui entraîne l'idée de la similitude, doit faire penser qu'ils n'ont point ignoré sa destination. Placé à la partie moyenne et inférieure du crâne, ayant des rapports plus ou moins étendus avec tous les os qui concourent à la formation de cette boîte osseuse il remplit, à leur égard le même usage que la clef des voûtes relativement aux diverses pièces dont elles sont composées. Les nombreux rapports que nécessitoit cet usage expliquent sa figure irrégulière et bizarre, les coupes diverses de ses surfaces articulaires, la multitude d'éminences dont il est hérissé, et qui rendent sa démonstration si compliquée et son étude si difficile.

Il est plus avantageux, par rapport au cerveau, que le crâne soit formé de plusieurs os que s'il étoit d'une seule pièce; il résiste mieux aux coups qui lui sont portés, parce que leur effet s'affoiblit en se transmettant d'un os à l'autre, et se perd

dans les mouvemens obscurs qu'ils peuvent éprouver aux endroits de leurs sutures ; sa forme arrondie augmente encore sa force de résistance. Cette force seroit égale dans tous les points des parois du crâne, si la figure de cette boîte étoit exactement sphérique, et que l'épaisseur de ses parois fût partout la même. Alors il ne pourroit s'effectuer des fractures *par contre-coup*, espèce de lésion que décide l'inégale résistance qu'opposent les os de la tête aux puissances qui sont appliquées à leur surface. Le péricrâne, le cuir chevelu, les muscles qui le doublent, et les poils abondans qui s'implantent dans son épaisseur, servent encore à défendre la masse cérébrale, et sont très-propres à amortir la violence des coups qui sont portés sur le crâne.

Outre cette enceinte résistante et dure, la masse cérébrale est encore recouverte d'une triple enveloppe membraneuse, formée par la *dure-mère*, qui doit son nom à l'opinion erronée qui lui attribuoit la production de toutes les autres membranes du corps ; l'*arachnoïde*, qui tient celui qu'elle porte de l'extrême ténuité de son tissu, et la *pie-mère*, qui adhère immédiatement à la substance cérébrale.

La dure-mère tapisse non-seulement l'intérieur du crâne et du canal vertébral, qui doit en être considéré comme une prolongation ; elle s'interpose entre les diverses parties de la masse céré-

brale, les soutient dans les différentes positions de la tête, et prévient leur compression mutuelle. C'est ainsi que le plus grand de ses replis, la faux du cerveau, tendue entre l'apophyse *crista galli* de l'ethmoïde et la protubérance occipitale interne, empêche que les deux hémisphères du cerveau entre lesquels elle est placée ne pèsent l'un sur l'autre quand nous sommes couchés latéralement, et maintient d'autre part la tente du cervelet dans l'état de tension nécessaire pour qu'elle supporte le poids des lobes postérieurs du viscère. Ce second repli, de forme demi-circulaire, sépare la portion du crâne qui contient le cerveau, des fosses occipitales inférieures dans lesquelles le cervelet se trouve logé. Tendu par la faux du cerveau qu'il tend à son tour, il n'offre point un plan horizontal à la portion de ce dernier viscère qui pèse sur lui; mais, incliné de toutes parts vers les parois du crâne, il leur transmet la plus grande partie du poids qu'il supporte. La tente du cervelet, qui partage ainsi l'intérieur de la cavité du crâne en deux parties d'inégale capacité, est osseuse chez certains animaux dont la progression s'opère par bonds et par mouvemens précipités; dans le chat, par exemple, qui peut, sans en être étourdi, faire des sauts effrayans par leur hauteur. Par cette séparation exacte, les deux portions de la masse cérébrale ne peuvent point agir l'une sur l'autre dans la violente commotion qu'elles doivent ressentir.

La membrane arachnoïde est, selon Bonn (1), qui en a parfaitement connu la disposition, et donné une très-belle gravure, l'organe sécréteur de la sérosité qui mouille la surface interne de la dure-mère, membrane fibreuse qui sert de périoste aux os dont elle tapisse la surface intérieure. Analogue aux membranes séreuses dont sont tapissées les cavités du corps, l'arachnoïde représente un sac sans ouverture, dont la surface interne est partout contiguë à elle-même, tandis que sa face externe est partout adhérente aux deux autres méninges. La sérosité que l'arachnoïde laisse exsuder par sa face interne diffère notablement de celle que secrètent les autres membranes séreuses; car elle ne contient presque pas d'albumine, et n'est point coagulable par la chaleur. Ce fait singulier, d'abord indiqué par John Hunter (*a Treatise on the blood*), a été vérifié depuis; en sorte que l'assertion de ceux qui regardoient l'exhalation cérébrale comme la source d'humeurs plus *ténues* que celles qui mouillent l'intérieur des autres cavités se trouve prouvée par l'expérience.

CXLI. *Du volume du cerveau.* De tous les animaux, l'homme est celui dont le crâne est le plus grand, relativement à la face; et comme le volume

---

(1) *Dissertatio de continuationibus membranarum*, in-4°. Lugd. Bat. 1763.

du cerveau est toujours proportionné à la grandeur de la boîte osseuse qui le contient, l'homme est aussi celui dont le cerveau est le plus considérable; il est aussi celui chez lequel cet organe présente les circonvolutions les plus nombreuses, et surtout les anfractuosités les plus profondes. Or, comme ces circonvolutions et ces anfractuosités résultent de la plicature de la substance cérébrale, il suit que la surface du cerveau de l'homme l'emporte de beaucoup, pour l'étendue, sur celle que présente le cerveau également plissé sur lui-même des animaux les plus intelligens; ensorte qu'autant il étoit inexact de juger de la capacité intellectuelle des espèces par la masse de leur cerveau, par la proportion de la masse cérébrale au reste du corps, etc., données fautives, suivant lesquelles le cerveau du moineau surpasseroit celui de l'homme par son volume proportionnel, etc., etc.; autant il est vrai que l'instrument des opérations intellectuelles présente, dans les espèces animales diverses, une surface dont l'étendue est relative à la puissance de leur intellect.

La différence de grandeur entre le crâne et la face donne assez bien la mesure de l'intelligence des hommes et de l'instinct des animaux; la stupidité de ces derniers et leur férocité sont d'autant plus marquées, que les proportions des deux parties de leur tête s'écartent davantage des proportions de la tête humaine.

Pour exprimer cette différence de grandeur,

Camper a imaginé une ligne verticale descendant du front au menton, et tombant perpendiculairement sur une autre ligne horizontale tirée dans la direction de la base du crâne. Il a nommé la première de ces lignes *faciale*, la seconde *palatine* ou *mentonnière*. On conçoit aisément que, la saillie du front étant déterminée par la grandeur du crâne, plus celui-ci a d'étendue, plus l'angle sous lequel la ligne faciale rencontre celle de la base du crâne doit être ouvert. Dans une tête d'Européen bien conformée, la ligne faciale rencontre cette dernière sous un angle presque droit (de 80 à 90 degrés). Lorsque l'angle est absolument droit, et la ligne qui mesure la hauteur de la face parfaitement verticale, la tête a la plus belle forme possible ; elle est la plus voisine de ce degré conventionnel de perfection que l'on nomme le beau idéal. La ligne faciale s'incline-t-elle en arrière, elle forme alors avec la palatine un angle plus ou moins aigu, et saillant en avant... L'inclinaison augmente, le sinus de l'angle diminue ; et si l'on passe de la race caucasienne à la race calmouque, puis aux nègres, aux singes, aux quadrupèdes, aux oiseaux, aux reptiles et aux poissons, on voit cette ligne faciale s'incliner de plus en plus, et enfin devenir presque parallèle à la ligne mentonnière, comme dans les reptiles et les poissons à tête aplatie. Si, au contraire, on remonte de l'homme aux dieux, dont les anciens nous ont transmis les images, on voit la ligne faciale s'in-

cliner en sens inverse, l'angle droit s'agrandir et devenir plus ou moins obtus. De cette inclinaison de la ligne faciale en avant résulte, pour la tête, un air de grandeur et de majesté, un front saillant, indiquant un cerveau volumineux et une intelligence divine.

Pour que ce moyen indique avec précision les dimensions respectives du crâne et de la face, il faut non-seulement mesurer l'extérieur, mais encore mener les tangentes sur les surfaces internes, après avoir fait une coupe verticale de la tête. Il est en effet certains animaux dont les sinus de l'os frontal sont tellement amples, qu'une grande partie des parois du crâne est gonflée par les cellules qui en dépendent. C'est ainsi que, dans le chien, l'éléphant, la chouette, etc., la grosseur apparente du crâne est bien supérieure à sa capacité réelle. Avec cette précaution, l'angle facial de Camper me paroît un moyen d'estimation de la capacité cérébrale et intellectuelle supérieur et préférable à l'angle occipital de Daubenton, au parallèle des aires de la face et du crâne par Cuvier, et aux autres méthodes d'appréciation encore plus compliquées, proposées par Oken, Spix, et autres savans d'Allemagne.

La grosseur relative de la tête, et par conséquent le volume proportionnel du cerveau est peu considérable dans les sujets d'une haute stature, et bien musclés : cette observation est facile à vérifier par l'examen des statues antiques. Toutes

celles qui représentent des athlètes ou des héros que la fable avoit dotés de forces prodigieuses offrent des têtes de très-petit volume relativement à la masse totale du corps. Dans les statues d'Hercule, elle égale à peine celui du moignon de l'épaule. Les seules images du maître des dieux présentent le bizarre assemblage d'une tête énorme reposant sur un corps dont les membres lui sont proportionnés ; mais les artistes grecs n'ont transgressé les lois de la nature qu'en faveur du dieu qui la régit, comme s'il eût fallu un vaste cerveau à celui dont l'intelligence embrasse d'un coup d'œil le plan de l'univers. Cette petitesse relative de la tête chez les athlètes vient de ce que, dans les individus doués de cette constitution, le développement excessif des organes des mouvemens donne au corps, et surtout aux membres, un volume énorme, tandis que la tête, peu chargée de muscles, reste très-petite. Sœmmering à dit que la tête des femmes étoit plus grande que celle des hommes, et leur cerveau plus pesant ; mais cet habile anatomiste a pris, pour cette évaluation, deux cadavres mâle et femelle de même longueur. Or la grandeur absolue étant égale, la grandeur proportionnelle n'étoit point la même, et il s'est trompé en comparant la tête, le crâne, le cerveau d'une femme très-grande à celui d'un homme d'une petite stature.

On a long-temps pensé qu'il existoit un rapport nécessaire entre le volume de la masse cérébrale

et l'énergie des facultés intellectuelles. On avoit cru remarquer qu'en général les hommes dont le génie est capable des conceptions les plus hardies, et des combinaisons les plus vastes et les plus fécondes, avoient une tête volumineuse, supportée par un cou de peu de longueur. Les exceptions que cette règle a présentées sont si nombreuses, que plusieurs ont douté de sa réalité. Doit-elle donc être absolument rejetée ? et ne lui accordera-t-on pas quelque fondement, si l'on fait attention que l'homme, seul raisonnable parmi tant d'êtres, dont quelques-uns ont avec lui une si grande ressemblance d'organisation et de structure, est aussi celui dont le cerveau, proprement dit, est le plus gros, proportionnellement au cervelet, à la moelle de l'épine, aux nerfs et aux autres parties du corps ? Pourquoi n'en seroit-il pas du cerveau comme de tous les autres organes, qui remplissent d'autant mieux leurs fonctions, que leur développement est plus complet ? On doit se rappeler, dans cette comparaison du cerveau et des forces intellectuelles, que plusieurs causes peuvent donner à ce viscère une grosseur spécieuse; qu'ainsi, dans les sujets d'un tempérament lymphatique, la tardive ossification des os du crâne fait que le cerveau, gorgé des sucs aqueux, acquiert un volume considérable, sans contenir pour cela une plus grande proportion de substance vraiment médullaire. Aussi remarque-t-on que les hommes de ce tempérament sont, le plus sou-

vent, ineptes aux travaux de l'esprit, et réussissent rarement dans ceux qui exigent l'activité jointe à la constance (1).

CXLII. *Structure de la masse cérébrale.* Ce que nous connoissons du cerveau ne sert qu'à nous prouver que nous en ignorons bien davantage : tout ce que nous en savons se réduit à des notions assez exactes sur sa conformation extérieure, sa couleur, sa densité, et sur l'arrangement des substances différentes qui entrent dans sa composition ; mais la connoissance de sa structure intime est encore un mystère qui ne nous sera pas de sitôt dévoilé. Le cerveau, proprement dit, est partagé par un sillon longitudinal en deux lobes d'un égal volume. Gunzius a cependant cru voir que le lobe, ou l'hémisphère droit, est un peu plus volumineux que le gauche; mais, lors même que ce fait seroit aussi certain qu'il est douteux, on ne pourroit expliquer par-là la force prédominante du côté droit du corps, puisque les nerfs qui se distribuent à ce côté viennent de l'hémisphère gauche du cerveau, dans la substance duquel toutes les racines de ces cordons s'entrecroisent. Ce fait de l'entrecroisement des nerfs à leur origine est prouvé par une multitude d'observa-

---

(1) *Voyez,* pour l'influence de l'organisation physique sur les dispositions morales et sur les facultés intellectuelles, l'article des Tempéramens.

tions pathologiques, dans lesquelles on voit toujours la lésion d'un lobe cérébral entraîner la paralysie, la convulsion, ou toute autre affection symptomatique du côté opposé du corps; à moins qu'on n'aime mieux expliquer ce phénomène en admettant un équilibre nécessaire dans l'action des deux lobes, équilibre dont la rupture fait que celui qui reste sain, agissant avec plus de force, comprime la naissance des nerfs de son côté, et décide la paralysie. Le défaut de jugement, les inégalités d'humeur et de caractère, tiendroient-elles au défaut d'harmonie entre les deux moitiés correspondantes de la masse cérébrale?

Pour mieux démêler la structure du cerveau qu'on ne l'a fait jusqu'ici, M. Gall en commence la dissection par sa partie inférieure. Examinant d'abord la partie antérieure du prolongement, connu sous le nom de *queue de la moelle allongée*, il y trouve les deux éminences pyramidales. Si l'on écarte les deux bords de la ligne médiane, au-dessous du sillon qui sépare les deux pyramides, on voit manifestement l'entrecroisement de trois ou quatre cordons ou tresses nerveuses qui, formées de plusieurs filamens, se portent obliquement de droite à gauche, et *vice versâ*. Cet entrecroisement des fibres nerveuses, que l'on n'aperçoit nulle part ailleurs dans le cerveau, avoit été vu par plusieurs anatomistes. On ne sait pourquoi il avoit été oublié, et par quelle raison les plus exacts et les plus modernes d'entre eux,

M. Boyer, par exemple, disent que l'entrecroisement des nerfs ne peut être prouvé par l'anatomie. Ces cordons, suivis de bas en haut, s'élargissent, se renforcent, et, formant les éminences pyramidales, montent vers la protubérance annulaire. Arrivés à ce ganglion, les fibres y pénètrent et se prolongent dans un amas de substance pulpeuse ou grisâtre, de même nature que celle qui, sous le nom de *substance corticale*, recouvre les deux hémisphères du cerveau. Cette pulpe grisâtre, répandue en divers lieux, est considérée, à tort, par M. Gall, qui la nomme la *matrice des nerfs*, comme le fonds d'où toutes les fibres médullaires tirent leur origine. Ces fibres ascendantes s'entrecroisent avec d'autres plans de fibres transverses, qui, de chaque côté, procèdent des pédoncules du cervelet: grossies et multipliées au moyen de leur passage à travers la substance grise, qui se trouve dans la protubérance annulaire, elles en sortent par sa partie supérieure, rassemblées en deux faisceaux, qui constituent la presque totalité des pédoncules du cerveau, ou bras de la moelle allongée, comme on les nommoit jadis. L'intérieur de ces pédoncules renferme une certaine quantité de substance grise, matière alimentaire de la fibre nerveuse. Arrivés aux ventricules, ces pédoncules, ou mieux les deux faisceaux de fibres qui les forment, rencontrent de gros ganglions pleins de substance grise; on les a long-temps nommés *couches optiques*, quoiqu'ils ne donnent point naissance aux nerfs de

la vue. Là, les fibres acquièrent un accroissement sensible; elles passent des couches optiques dans de nouveaux ganglions : ce sont les corps striés : et les stries que l'on aperçoit quand on coupe ces amas piriformes de substance grise ne sont que les mêmes fibres qui, grossies, multipliées et rayonnantes, s'écartent à la manière d'un éventail pour gagner les hémisphères du cerveau, où, après avoir formé, en s'élargissant, une substance blanchâtre et fibreuse, elles vont se terminer à l'extérieur du viscère formant ses circonvolutions, toutes recouvertes par la substance grise, à laquelle vont ainsi se terminer les extrémités des fibres divergentes. De cette substance grise viennent des fibres convergentes, qui de la périphérie se portent de tous côtés vers le centre du cerveau, où elles se réunissent pour former les diverses commissures, le corps calleux, et autres productions visiblement destinées à faire communiquer les deux hémisphères.

L'exterieur du cerveau peut donc être considéré comme une vaste membrane nerveuse, formée par la substance grise. Pour se faire une idée juste de son étendue, il faut savoir que les circonvolutions cérébrales sont des espèces de duplicatures susceptibles de s'étendre par l'écartement de deux lames médullaires contiguës, qui en forment la base. La surface extérieure du cerveau, au moyen de ce déplissement, offre alors quelque

rapport avec la peau, vaste expansion nerveuse, partout couverte d'une sorte de substance pulpeuse, connue sous le nom de *réseau muqueux de Malpighi.* M. Gall compare cette pulpe cutanée à la substance grisâtre qui revêt l'extérieur du cerveau; et je suis forcé d'avouer que tout le monde n'admettra point cette analogie. Toujours est-il vrai que le cerveau est principalement formé par un amas de ganglions, qu'il ne produit point la moelle allongée, ni celle de l'épine; que l'on peut considérer cette dernière comme une suite de ganglions unis entre eux; que les nerfs vertébraux naissent de la pulpe grisâtre dont la moelle de l'épine est remplie, comme on le voit mieux dans les animaux qui manquent de cerveau, et qui n'en ont pas moins une moelle épinière, ou une suite de ganglions d'où les nerfs émanent. Les ganglions, ou plutôt la substance grise qu'ils offrent toujours, produisent les fibres nerveuses, et grossissent les cordons nerveux, qui les traversent.

C'est là le seul usage que l'on puisse attribuer à ces parties du système nerveux; car, s'ils étoient destinés à soustraire à l'empire de la volonté les parties qu'ils animent, pourquoi les ganglions des nerfs vertébraux ne rempliroient-ils point cette fonction? Tous ces nerfs communiquent entre eux et se tiennent par des anastomoses réciproques. Ces communications équivalent, chez l'homme, à

une véritable continuité. En effet, le cerveau influe sur les nerfs qui procèdent de la moelle épinière, comme si celle-ci étoit une de ses productions, et que toutes les fibres nerveuses répandues dans les divers organes eussent une extrémité qui allât aboutir à ce viscère.

Tels sont les principaux résultats des travaux du docteur Gall sur le cerveau et le système nerveux, travaux importans, auxquels on doit rapporter l'origine des recherches et des découvertes qui de toutes parts se multiplient sur cette partie de l'organisation. Le docteur Gall se seroit couvert d'une gloire aussi pure qu'immortelle, si, se bornant à rechercher les suffrages des savans, il n'eût aspiré à la vaine gloire d'un renom populaire, et travaillé à l'obtenir en employant ses découvertes anatomiques à l'établissement et au soutien d'une absurde cranoscopie. En montrant le premier que l'organe de la pensée est une véritable surface, plus ou moins étendue, sur laquelle se dessinent en quelque manière les actes de l'intelligence, ce médecin a ouvert une carrière dans laquelle nous entrons à peine, et dont il est nécessairement permis de préjuger l'immensité. Déjà l'on entrevoit que, semblable à l'électricité, l'action nerveuse s'exerce sur les surfaces sans pénétrer la masse des corps; qu'aussi diverse que les appareils nerveux dans les différentes espèces, elle doit produire des résultats aussi variés que l'est elle-même l'organisation

d'un système de parties où des observateurs superficiels n'ont vu long-temps qu'une masse pulpeuse ou médullaire semblable par l'organisation, et tout au plus différente par le volume.

Étudié avec plus de soin, et surtout soumis à des méthodes d'investigation plus judicieuses, l'encéphale de l'homme, des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des poissons, s'est montré aux anatomistes de nos jours composé de parties analogues, mais inégales dans leur volume, dans leurs proportions respectives et dans les diverses conditions de leur développement; en outre, certaines de ces parties manquent aux animaux des classes inférieures. C'est ainsi que les corps striés, le corps calleux et le pont de Varole appartiennent exclusivement à l'encéphale des mammifères, et ne sont, chez aucun, plus développés que chez l'homme. Le petit pied d'hippocampe n'existe dans aucune famille des mammifères; l'homme en est quelquefois dépourvu. Dans les poissons, les reptiles et les oiseaux, les lobes cérébraux sont solides et sans ventricules; les tubercules quadrijumeaux sont creux au contraire, mais le ventricule dont ils sont creusés est bien loin d'offrir l'ampleur que présentent ces surfaces dans le crâne des mammifères, et de l'homme qu'elles distinguent exclusivement. Cette courte indication de quelques-uns des faits les plus importans de l'anatomie comparée du cerveau, étudié dans les quatre classes des animaux vertébrés, est tirée du bel ou-

vrage que vient de publier M. Serres (1), traité fondamental dont nous ne saurions trop vivement recommander la lecture. Sans prétendre y suppléer, continuons à en extraire les résultats les plus importans.

Examiné seulement dans les quatre classes d'animaux vertébrés (poissons, reptiles, oiseaux et mammifères), le cerveau est aussi différent de lui-même que le sont les habitudes, les mœurs, l'instinct et l'intelligence de ces diverses sortes d'animaux. La masse encéphalique des êtres qui vivent dans l'air (mammifères, oiseaux et reptiles), est par cela même différente de celle qui remplit le crâne des poissons, animaux vivant dans un milieu différent de celui que respirent les animaux des classes supérieures. Aussi, à la vue de cette suite de tubercules ou ganglions qui le composent, les anatomistes, habitués à descendre de l'homme aux espèces inférieures, se trouvent arrêtés dans leur étude et fort embarrassés pour établir quelque comparaison. Les lobes optiques sont la partie principale, l'élément dominateur du cerveau; tandis que chez les reptiles leur prédominance diminue, les hémisphères cérébraux se développant beaucoup, et le cervelet restant presque nul. Chez les oiseaux, le cervelet devient la partie do-

(1) Anatomie comparée du cerveau, etc., Paris, 1824, 2 vol. in 8°, avec un atlas de planches gravées.

minante; enfin, chez les mammifères, les hémisphères cérébraux acquièrent à leur tour la supériorité, les tubercules quadrijumeaux étant réduits à leur *minimum* d'existence.

En remontant dans l'échelle animale des poissons aux singes, on voit l'encéphale se compliquer graduellement; il en est de même si l'on remonte, pour les mammifères adultes, à la formation embryonaire : on voit alors l'encéphale, simple d'abord, imiter celui des poissons, puis revêtir les formes du reptile, s'élever par degrés à la condition de l'oiseau, et arriver enfin à cet ensemble et à cette proportion de parties qui caractérisent l'encéphale des mammifères. Dans ce développement gradué et successif, on voit toujours l'organisation s'effectuer de la circonférence au centre, c'est-à-dire les parties excentriques ou latérales paroître les premières, les nerfs naître dans les organes auxquels on suppose ordinairement qu'ils vont se rendre, se terminer enfin en s'insérant sur l'axe cérébro - spinal, les parties de celui-ci s'assembler par une véritable conjugaison en vertu de laquelle le côté droit et le côté gauche s'unissent enfin et adhèrent, tantôt par une simple union, et d'autres fois par des commissures.

Il résulte des expériences récentes de M. Flourens et autres physiologisies que le cervelet préside particulièrement aux phénomènes locomoteurs, tandis que le cerveau, proprement dit,

exerce les fonctions les plus élevées de l'entendement, et sert d'organe à la volonté. Parmi les faits les plus concluans, d'où ces résultats sont déduits, nous nous contenterons de citer l'observation bien vérifiée de la poule à laquelle on enleve le cerveau, et qui, après cette perte, continue à vivre d'une vie en quelque sorte végétative, incapable de vouloir, à ce point qu'un grain mis dans son bec n'est point avalé, et qu'il faut le pousser dans le pharynx et jusque dans les organes dont l'action est indépendante de l'empire de la volonté, pour que la déglutition s'effectue. Une poule a été conservée vivante pendant plusieurs mois; la plaie résultante de l'ablation du cerveau étoit complétement cicatrisée; l'animal, incapable de se passer du secours d'autrui pour soutenir son existence, restoit passif dans le coin où on l'avoit relégué, vivant des alimens que chaque jour on introduisoit jusque dans son gosier.

Poussoit-on la mutilation jusqu'à la priver du cervelet, les mouvemens locomoteurs ne s'effectuoient plus que d'une manière désordonnée et incomplète; enfin la mort arrivoit, si, par la destruction de la moelle de l'épine, on achevoit l'anéantissement de la puissance nerveuse. Chacune des parties de cet appareil compliqué, que l'on appelle *système nerveux*, a donc des fonctions spéciales et distinctes, quoique toutes se soutiennent et s'influencent réciproquement, de telle sorte que le cerveau, le cervelet, la moelle de l'épine

et les nerfs, doués d'une action propre, jouissent encore d'une action auxiliaire par rapport aux autres parties du système résultant de leur assemblage (1).

CXLIII. *Circulation cérébrale.* Nous avons dit que le sang, dans son cours circulaire, ne parcouroit point les différentes parties du corps avec une vitesse uniforme; qu'il existoit des circulations partielles au milieu de la circulation générale. Dans aucun organe, les lois auxquelles cette fonction est assujettie ne se trouvent modifiées d'une manière plus remarquable que dans la masse cérébrale. Il n'en est point qui, relativement à son volume, reçoive des vaisseaux artériels plus gros et plus nombreux que ceux qui se rendent au cerveau. Les artères carotides internes et vertébrales, comme on peut s'en assurer par les calculs de Haller, y portent une grande partie de la masse totale du sang qui coule dans l'aorte (environ du tiers à la moitié).

Ce sang, qui se porte au cerveau, disoit Boerhaave, est plus *aéré* que celui qui se distribue aux autres parties: cette observation est loin d'être dépourvue de tout fondement. Quoique le sang que les contractions du ventricule gauche poussent dans les vaisseaux qui s'élèvent de la crosse de l'aorte ne subisse point dans l'endroit de cette

(1) Rolando, Flourens.

courbure un départ mécanique qui porte vers la tête ses parties les plus légères, il n'en est pas moins vrai de dire que ce sang, qui vient d'être soumis au contact de l'air dans les poumons, jouit au plus haut degré de toutes les qualités propres au sang artériel. Une si grande quantité d'un sang léger, rouge, écumeux, imprégné de calorique et d'oxigène, arrivant au cerveau avec toute la force que lui a imprimée l'action du cœur, eût inévitablement dérangé la structure molle et délicate du premier de ces viscères, si la nature n'avoit multiplié ses précautions pour affoiblir cette force impulsive.

Le liquide, obligé de remonter contre sa propre pesanteur, consume par-là même une partie de son mouvement. La colonne verticale va heurter la courbure anguleuse que décrit la carotide interne, en parcourant le canal osseux de la portion pierreuse du temporal; et comme cette courbure, soutenue par les parties dures, ne peut être redressée, la colonne du sang est brisée avec énergie, et détournée de sa direction primitive avec une perte considérable de vitesse.

L'artère plongée dans le sang du sinus caverneux, à sa sortie du canal carotidien, est très dilatable; enfin les branches en lesquelles elle se partage, lorsqu'elle est arrivée à la base du cerveau, ont des parois très-minces, et si foibles, qu'elles s'affoissent, lorsqu'elles sont vides, comme celles des conduits veineux. Cette foiblesse des artères céré-

brales explique leurs fréquentes ruptures, lorsque le cœur y pousse le sang avec trop de violence; et c'est ainsi que s'effectuent la plupart des apoplexies sanguines, dont plusieurs néanmoins arrivent sans déchirement, et par la simple transsudation du sang à travers les parois des artères. Ces vaisseaux, ainsi que les branches qui résultent de leurs divisions, sont logés dans les enfoncemens dont la base du cerveau se trouve sillonnée, et ne pénètrent sa substance que réduits à un état de ténuité extrême par les divisions ultérieures qu'ils éprouvent dans le tissu de la pie-mère.

Malgré la proximité du cœur et du cerveau, le sang arrive donc dans ce dernier organe par un mouvement très-ralenti : il en revient, au contraire, par un mouvement progressivement accéléré. La position des veines à la partie supérieure du cerveau, entre sa surface convexe et la voûte du crâne, fait que ces vaisseaux, doucement comprimés dans les mouvemens alternatifs d'abaissement et d'élévation de la masse cérébrale, se dégorgent avec facilité dans les réservoirs membraneux de la dure-mère, connus sous le nom de *sinus*. Ceux-ci, communiquant tous ensemble, présentent au liquide un réceptacle assez vaste, d'où il passe dans la grande veine jugulaire, chargée de le reporter dans le torrent de la circulation. Non-seulement cette veine présente un calibre considérable, mais encore ses parois peu épaisses sont très-extensibles, et sa dilatabilité est si grande, qu'elle

acquiert par l'injection un calibre supérieur à celui des veines-caves. L'écoulement du sang est favorisé par sa propre pesanteur, qui rend sa retrogradation très-difficile (1). Ainsi, pour résumer tout ce qui est relatif au mode particulier de la circulation cérébrale, le cerveau reçoit en grande quantité un sang très-riche en oxigène ; ce liquide rencontre en son chemin beaucoup d'obstacles qui ralentissent son cours en brisant sa force impulsive; tout, au contraire, favorise son retour et prévient l'engorgement veineux (2). Observons, en terminant cet article sur la circulation cérébrale, que celle de l'œil y est intimement liée, puisque l'artère ophthalmique est fournie par la carotide interne, et que la veine du même nom se dégorge dans les sinus caverneux de la dure-mère. Aussi la rougeur de la conjonctive, la saillie, le brillant, l'état humide des yeux, indiquent-ils une détermination plus vive et plus abondante du sang vers le cer-

---

(1) Les valvules dont l'intérieur de la jugulaire est entièrement dépourvu ne s'opposent cependant pas à ce reflux ; mais il suffit, pour le prévenir, et de la direction dans laquelle le sang y coule, et de la grande extensibilité de ses parois. Ce grand calibre que la veine est susceptible d'acquérir eût rendu inutiles les replis valvulaires, qui n'eussent pu suffire à boucher le canal, lorsque ses dimensions sont prodigieusement augmentées.

(2) Les anastomoses transverses des artères placées à la base du cerveau sont bien propres à distribuer le sang en égale quantité dans toutes les parties de ce viscère.

veau. Les yeux sont ainsi *animés* aux approches d'une attaque d'apoplexie, dans le transport d'une fièvre ardente, pendant le délire, symptôme dangereux des fièvres malignes ou ataxiques. De cette liaison entre les vaisseaux de l'œil et ceux du cerveau dépend la lividité de la conjonctive, dont les veines injectées d'un sang noir indiquent la plénitude de celles du cerveau, dans le plus grand nombre des asphyxies.

CXLIV. *Liaison entre l'action du cerveau et celle du cœur.* On peut, comme l'avoit expérimenté Galien, lier les deux carotides sur un animal vivant, sans qu'il en paroisse sensiblement affecté; mais si, comme personne ne l'a fait encore, on lie en même temps les artères vertébrales, l'animal tombe à l'instant, et meurt au bout de quelques secondes. Pour faire cette expérience, il faut, après avoir lié les carotides sur un chien, enlever les parties molles qui couvrent les parties latérales du cou, puis avec des aiguilles courbes demi-circulaires, enfoncées sur les côtés de l'articulation des vertèbres cervicales, embrasser les artères qui montent le long de leurs apophyses transverses. La ligature du tronc même de l'aorte ascendante, sur un quadrupède herbivore, produit le même effet, c'est-à-dire la mort prompte de l'animal.

Ces expériences, plusieurs fois répétées, prouvent d'une manière décisive la nécessité de l'action du cœur sur le cerveau pour la conservation de la

vie. Mais quel est le mode de cette action ? seroit-elle purement mécanique ? consisteroit-elle seulement dans la pression légère que les artères du cerveau exercent sur la substance de ce viscère ? ou bien est-ce plutôt à l'interception du sang artériel, poussé vers le cerveau par les contractions du cœur, que la mort doit être attribuée ? Cette dernière opinion me paroît la plus probable ; car si, à l'instant où l'on vient de lier les vertébrales, on ouvre les carotides, et qu'adaptant le tube d'une seringue, on y pousse un liquide quelconque, avec une force modérée et à des intervalles à peu près semblables à ceux de la circulation, l'animal ne revient pas à la vie.

Le cœur et le cerveau sont donc unis l'un à l'autre par les liens d'une étroite dépendance. L'abord continuel du sang qui coule dans les artères céphaliques est donc absolument nécessaire à l'entretien de la vie ; son interception momentanée entraîne sûrement la mort de l'animal.

L'énergie du cerveau paroît assez généralement en rapport avec la quantité de sang artériel qu'il reçoit. Je connois un littérateur qui, dans la chaleur de la composition, présente les symptômes évidens d'une sorte de fièvre cérébrale. La face est rouge et animée, les yeux sont étincelans ; les carotides battent avec force ; les veines jugulaires sont gonflées : tout indique que le sang se porte au cerveau avec une abondance et une rapidité proportion-

nées à son degré d'excitement. Ce n'est même que dans cette espèce d'érection de l'organe cérébral que ses idées faciles coulent sans effort, et que son imagination féconde trace à son gré les plus rians tableaux. Rien ne favorise autant cet état que le coucher prolongé. Dans cette position horizontale, la détermination des humeurs vers la tête est d'autant plus facile, que les organes extérieurs, dans un parfait repos, n'en détournent point le cours : il suffit, pour l'établir, de fixer fortement son attention sur un objet. Le cerveau, qui est le siége de ce travail intellectuel, ne doit-il pas alors être considéré comme un centre de fluxion ? et le stimulant mental ne peut-il pas être comparé, quant à ses effets, à tout autre stimulant chimique ou mécanique ?

Un jeune homme, d'un tempérament sanguin, sujet aux fièvres inflammatoires qui toujours se terminent par un saignement de nez abondant, éprouve durant les paroxysmes une augmentation remarquable dans les forces de son intelligence et dans l'activité de son imagination. Plusieurs auteurs avoient déjà observé que, dans certaines affections fébriles, les malades d'un esprit fort ordinaire s'élevoient à des idées qui, dans l'état de santé, eussent dépassé les bornes de leur conception. Ne peut-on pas opposer ces faits à la théorie de Cullen, qui regarde la diminution de l'énergie du cerveau comme le caractère essentiel de la fièvre ?

On sait que la longueur différente du cou, et par conséquent la proximité plus ou moins grande du cœur et du cerveau, donnent assez bien la mesure de l'intelligence des hommes et de l'instinct des animaux. La longueur démesurée du cou a été de tout temps regardée comme l'emblème de la stupidité.

Dans l'état actuel de nos connoissances, peut-on déterminer de quelle manière le sang artériel agit sur le cerveau ? L'oxigène ou le calorique, dont il est le véhicule, élaborés par ce viscère, deviennent-ils le principe du sentiment et du mouvement? ou bien ne font-ils qu'entretenir l'organe dans le degré de consistance nécessaire à l'exercice de ses fonctions? Que doit-on penser de l'opinion de quelques chimistes qui ne voient dans le cerveau qu'une masse albumineuse, concrétée par l'oxigène, et dont la consistance varie suivant l'âge, l'individu, le sexe, l'état de santé ou de maladie, masse albumineuse électroscopique, ou, pour mieux dire, plus capable de modifier et de produire le principe électromoteur qu'aucune autre substance organisée? Toute réponse à ces questions prématurées ne pourroit être qu'une simple conjecture à laquelle il seroit difficile de donner un certain degré de probabilité.

CXLV. *Théorie de la syncope.* Si l'on réfléchit à l'importance de l'action que le cœur exerce sur le cerveau, on est naturellement conduit à en admettre la nécessité pour l'entretien de la vie, et à

déduire de sa suspension momentanée la théorie des affections syncopales. Déjà plusieurs auteurs ont essayé d'expliquer la manière d'agir de leur cause prochaine; mais aucun n'étant parti de faits démontrés par l'expérience, leurs explications ne sont nullement d'accord avec ce qu'apprend l'observation sur les phénomènes de ces maladies.

Pour se convaincre que la cessation instantanée de l'action du cœur sur l'organe cérébral doit être regardée comme la cause immédiate des syncopes, il suffit de lire avec attention le chapitre que Cullen, dans sa Nosologie, a consacré à ce genre d'affections; on verra bientôt que leurs causes occasionnelles, dont les différences en déterminent les nombreuses espèces, sont ou inhérentes au cœur et aux gros vaisseaux, ou bien exercent leur action sur le centre épigastrique, et n'affectent jamais le cerveau que d'une manière consécutive. Ainsi les syncopes produites par les dilatations anévrismales du cœur et des gros vaisseaux, par des concrétions polypeuses formées dans ces conduits, par l'ossification de leurs parois ou de leurs valvules; celles qu'occasione l'hydropisie du péricarde ou l'adhérence du cœur à l'intérieur de ce sac membraneux, dépendent bien évidemment de l'affoiblissement extrême ou de la cessation entière de l'action du cœur et des artères. Leurs parois, ossifiées, dilatées, adhérentes aux parties voisines, ou comprimées par un liquide quelconque, n'agissent plus sur le sang avec une force

suffisante, ou bien ce fluide est arrêté dans sa progression par un obstacle qui remplit l'intérieur de ses canaux, comme une concrétion polypeuse, une valvule ossifiée et immobile dans l'abaissement. Cullen nomme, avec raison, ces syncopes *idiopathiques* ou *cardiaques*.

On peut en rapprocher la syncope pléthorique, qui dépend d'une congestion sanguine dans les cavités du cœur : les contractions de cet organe deviennent plus fréquentes; il redouble d'efforts pour se débarrasser de cette surcharge nuisible à l'exercice de ses fonctions; mais bientôt à cet excitement inaccoutumé, par lequel la contractilité de ses fibres se trouve épuisée, succède une sorte de paralysie, dont la syncope est la suite nécessaire.

On doit y joindre encore les défaillances qu'occasione une saignée copieuse : la prompte soustraction d'une certaine quantité de fluide vivifiant prive le cœur du stimulant nécessaire à l'entretien de son action. Le même effet résulte de l'évacuation des eaux qui remplissent l'abdomen dans une hydropisie ascite; de nombreux vaisseaux cessent d'être comprimés; le sang, qu'auparavant ils refusoient d'admettre, s'y porte avec abondance; la quantité que le cœur envoie au cerveau, proportionnellement diminuée, ne suffit plus à son excitement. Il faut encore rapporter aux syncopes idiopathiques celles qui signalent les derniers temps du scorbut, dont le principal caractère est,

comme on sait, une débilité excessive des muscles destinés aux fonctions vitales et aux mouvemens volontaires; enfin, les asphyxies par strangulation, par submersion, par les gaz non respirables, affections dans lesquelles, le sang étant privé du principe qui le rend propre à déterminer les contractions du cœur, la circulation se trouve interrompue. On conçoit que, si le sang ne perd que peu à peu ses qualités stimulantes, l'action du cœur, graduellement affoiblie, pousse vers le cerveau un sang qui, par ses qualités, se rapproche du sang veineux, et, comme ce dernier liquide, ne peut entretenir la masse cérébrale dans son économie naturelle. On pensoit que l'injection de quelques bulles d'air dans la jugulaire d'un chien faisoit tomber subitement l'animal en syncope, et même suffisait pour lui ôter la vie; mais les expériences de Nysten ont prouvé que l'air atmosphérique produit ces fâcheux effets seulement lorsqu'il est injecté en quantité assez grande pour distendre à l'excès les cavités du cœur, ou qu'injecté par les artères, il va comprimer la masse cérébrale. Lorsqu'on en injecte seulement une certaine quantité, on voit le gaz dissous dans le sang veineux se porter avec lui aux poumons, puis être exhalé par cette voie.

Un second ordre de causes occasionelles se compose de celles qui, portant leur action sur le centre épigastrique, déterminent sympathiquement la cessation des battemens du cœur, et la

syncope qui résulte inévitablement de cette cessation; telles que les affections vives de l'âme, comme une terreur profonde, une joie excessive, une aversion bien décidée pour certains alimens, l'effroi qui saisit à la vue inopinée d'un objet, l'impression désagréable que produisent certaines odeurs, etc. Dans tous ces cas, on éprouve, vers la région du diaphragme, le sentiment intérieur d'une commotion plus ou moins vive. Du plexus solaire du grand sympathique, qui, suivant l'opinion assez généralement reçue, est regardé comme le siége de cette sensation, ses effets se propagent aux autres plexus abdominaux et thorachiques. Le cœur, dont presque tous les nerfs viennent du grand sympathique, en est spécialement affecté. Tantôt son action en est seulement troublée, et d'autres fois entièrement suspendue. Le pouls devient insensible, le visage pâle, les extrémités froides, et la syncope se déclare. Les choses se passent de la même manière lorsqu'une substance narcotique ou vénéneuse a été introduite dans l'estomac, lorsque ce viscère est extrêmement affoibli, à la suite d'une longue abstinence, ou qu'il se trouve surchargé de sucs mal élaborés, dans les douleurs intestinales que l'on nomme *coliques*, dans les accès hystériques, etc.

Ce dernier ordre de causes occasionelles n'agit que consécutivement sur le cœur, et ne produit la syncope que d'une manière éloignée; mais le résultat est toujours le même. Il arrive, dans

tous les cas, que, les artères céphaliques ne recevant plus la quantité de sang qui s'y portoit dans l'état naturel, la masse cérébrale tombe dans une espèce de collapsus qui entraîne la cessation momentanée des facultés de l'entendement, des fonctions vitales et des mouvemens volontaires.

Morgagni, en traitant des maladies suivant l'ordre anatomique, range les lipothymies au nombre des affections de la poitrine, parce que les viscères renfermés dans cette cavité offrent les traces de lésion plus ou moins graves chez les individus qui, pendant leur vie, étoient sujets à des lipothymies fréquentes. La compression de la masse cérébrale par un fluide épanché sur la dure-mère, à la suite des plaies de la tête, produit moins une syncope véritable qu'un assoupissement profond. Toutes les causes qui agissent de cette manière sur l'organe cérébral sont une source féconde d'affections comateuses, carotiques, et même apoplectiques. Un homme gravement offensé entre tout d'un coup en fureur; son visage se colore; il éprouve un vertige, et tombe sans connoissance : il n'y a point décoloration, absence de pouls (presque toujours celui-ci bat avec plus de force). Cet état n'est point la syncope; c'est un premier degré de l'apoplexie, occasioné par la pression mécanique du cerveau, vers lequel le sang s'est porté tout à coup avec trop d'abondance.

Je pourrois étayer cette théorie des affections

syncopales, de nouvelles preuves tirées des circonstances que favorisent l'action des causes qui les produisent. Ainsi c'est presque toujours dans l'état de station que les syncopes se déclarent; et le coucher sur un plan horizontal est une précaution utile dans leur traitement. Les malades affoiblis par de longues maladies tombent en défaillance au moment où ils veulent se lever : on les rappelle à la vie en leur donnant la position qu'ils avaient abandonnée. Or, comment expliquer cet effet de la station chez les sujets dont la masse des humeurs est appauvrie, et l'action organique extrêmement languissante? N'est-ce pas par le retour plus difficile du sang porté aux parties inférieures, par l'ascension moins facile de celui que les contractions du cœur lancent vers les organes céphaliques? Alors les phénomènes de la circulation sont plus hydrauliques que dans l'état de santé; le solide vivant cède plus aisément à l'empire des lois physiques et mécaniques, et, suivant la sublime idée du père de la médecine, notre nature particulière se rapproche davantage de la nature universelle.

CXLVI. *Mouvemens du cerveau.* Les mouvemens alternatifs d'élévation et d'abaissement que présente le cerveau mis à découvert sont-ils exclusivement isochrones aux battemens du cœur et des artères? ou bien ces mouvemens correspondent-ils en même temps à ceux de la respiration? Tel

est le problème physiologique dont la solution va nous occuper.

Les auteurs qui ont reconnu l'existence des mouvemens de la dure-mère n'ont point été d'accord sur la cause qui les produit. Les uns ont cru y apercevoir des fibres motrices, et ont fait dépendre ces mouvemens de leur action (Willis, Baglivi); les autres les ont attribués aux battemens des artères qui s'y distribuent (Fallope, Bauhin): mais la dure-mère ne jouit d'aucune force contractile; son adhérence intime à l'intérieur du crâne s'opposeroit d'ailleurs à l'exercice de cette propriété. Cette membrane n'emprunte point de ses vaisseaux les mouvemens dont elle paroît agitée; car, comme l'observe Lorry, les artères de l'estomac, des intestins, de la vessie, n'en impriment aucun aux parois de ces viscères creux, et cependant elles égalent au moins en nombre et en grosseur les artères méningées.

Les mouvemens dont jouit la dure-mère lui viennent de la masse cérébrale que cette membrane recouvre; et cette opinion de Galien, adoptée par le plus grand nombre des anatomistes, a été mise hors de doute par les expériences de de Schlitting, Lamure, Haller et Vicq-d'Azir. Tous ont vu que, la dure-mère étant enlevée, le cerveau n'en offroit pas moins des mouvemens alternatifs d'élévation et d'abaissement, tous, à l'exception de Schlitting, ont même reconnu que le

cerveau, absolument passif, tenoit de ses vaisseaux les mouvemens auxquels participe la dure-mère; mais lui sont-ils communiqués par les artères ou par les veines cérébrales, et les sinus auxquels elles vont aboutir? ou, en d'autres termes, sont-ils isochrones aux battemens du pouls, ou bien au resserrement et à la dilatation successive de la poitrine pendant la respiration?

Galien, dans son livre sur l'usage de cette fonction, dit que l'air admis dans l'organe pulmonaire gonfle le diaphragme, et se porte dans le crâne par le canal vertébral, etc. Selon lui, le cerveau s'élève pendant le gonflement du thorax; il s'abaisse, au contraire, lorsque les parois de cette cavité se rapprochent de son axe. Schlitting, dans un mémoire présenté à l'Académie des Sciences, vers le milieu du siècle dernier, établit l'existence de ces mouvemens, mais dans un autre rapport, l'élévation correspondant à l'expiration, l'abaissement à l'inspiration. Croyant avoir constaté le fait qu'il annonce, par un assez grand nombre d'expériences, il ne hasarde aucune explication, et termine ses recherches en demandant si c'est l'air ou le sang qui, portés vers le cerveau, en déterminent les mouvemens.

Haller et Lamure s'empressèrent de donner la solution du problème. Tous deux firent un grand nombre d'expériences sur les animaux vivans, reconnurent la vérité du fait annoncé par Schlitting, et l'expliquèrent de la manière suivante.

Comme ce dernier anatomiste, Lamure admit un espace vide entre la dure-mère et la pie-mère, à la faveur duquel les mouvemens du cerveau pouvoient toujours s'exécuter. L'existence de ce vide est démentie par la simple observation de la contiguité des membranes entre lesquelles on le suppose.

Pendant l'expiration, dit ensuite Lamure, les parois de la poitrine reviennent sur elles-mêmes et diminuent l'étendue de cette cavité. Les poumons, pressés de toutes parts, s'affaisent; les courbures de leurs vaisseaux augmentent, et le sang les traverse avec difficulté. Le cœur et les gros vaisseaux se trouvant aussi comprimés, le sang qu'apporte dans l'oreillette droite la veine-cave supérieure ne peut être librement versé dans cette cavité, qui elle-même se vide difficilement dans le ventricule droit, dont le sang ne peut traverser le tissu pulmonaire. D'un autre côté, les poumons comprimant la veine-cave, il en résulte un véritable refoulement de celui qu'elle rapportoit au cœur : repoussé dans les jugulaires et les vertébrales, il gonfle ces vaisseaux, les sinus de la dure-mère qui s'y déchargent, et les veines du cerveau, qui viennent aboutir à ces sinus. Leur distension explique le soulèvement de la masse cérébrale, élévation bientôt suivie par l'abaissement, lorsque, l'inspiration succédant à l'expiration, et les poumons venant à se dilater, le sang qui remplit les cavités droites du cœur peut traverser

librement leur substance, et faire place à celui que la veine-cave rapporte des parties supérieures.

Haller regarda ce reflux comme très-difficile, le sang étant obligé de lutter contre sa propre pesanteur, et n'admit l'explication de Lamure que pour les grands efforts et la respiration, tels que la toux, le rire, l'éternument, etc. Il établit que dans l'état ordinaire, on ne voyoit, durant l'expiration, qu'une simple stagnation du sang dans les vaisseaux qui le rapportent de l'intérieur du crâne. D'après le témoignage d'un grand nombre d'auteurs, il admet encore dans le cerveau un autre ordre de mouvemens dépendant des battemens de ses artères; en sorte que, selon Haller, la masse cérébrale est sans cesse agitée de mouvemens dont les uns dépendent de la respiration, tandis que les autres en sont entièrement indépendans.

Enfin, suivant Vicq-d'Azir, le cerveau, mis à découvert, présente un double mouvement, ou plutôt deux espèces de mouvemens qui tous deux lui sont étrangers : l'un lui est imprimé par ses artères, et c'est le moins considérable, l'autre lui vient des mouvemens alternatifs de la respiration.

CXLVII. Cette opposition entre des auteurs également recommandables dont les théories se partagent aujourd'hui l'adoption universelle, m'a engagé à répéter les expériences que chacun d'eux invoque à son appui, et à soumettre le fait encore douteux à de nouvelles recherches. Cet examen n'a pas tardé à me convaincre que ces au-

teurs avoient plutôt exprimé leur sentiment que le fait lui-même. En effet, les mouvemens alternatifs d'élévation ou d'abaissement qu'offre le cerveau sont isochrones à la systole et à la diastole des artères placées à sa base : l'élévation correspond à la dilatation, l'abaissement au resserrement de ces vaisseaux ; la respiration n'est pour rien dans ce phénomène; et même, en admettant la stagnation ou le refoulement du sang dans les veines jugulaires, la disposition des conduits veineux de l'intérieur du crâne est telle que cette stagnation, ou ce refoulement, ne pourroit produire les mouvemens alternatifs de la masse cérébrale.

Les artères du cerveau lui sont fournies par les carotides internes et les vertébrales entrées dans la cavité qu'il occupe, les premières par les canaux carotidiens, les secondes par le grand trou occipital. Il seroit inutile de décrire leurs nombreuses divisions, leurs fréquentes anastomoses, le cercle ou plutôt le polygone artériel qui résulte de ces anastomoses, et au moyen duquel les carotides et les vertébrales communiquent ensemble sur les côtés de la selle turcique. Haller en a donné un dessin très-correct et une excellente description (1). L'histoire de la carotide interne publiée par cet anatomiste est, selon Vicq-d'Azir, un chef-d'œuvre d'érudition et d'exactitude ; on pourroit donner les

(1) *Fasciculi anatomici.* F. 7, tab. 1.

mêmes éloges à ce dernier, qui en a fait graver une superbe figure (1). Nous observerons seulement que les principaux troncs artériels qui se portent au cerveau sont placés à la base de ce viscère; que les branches en lesquelles ces troncs se partagent, et les rameaux que ces branches fournissent, sont aussi logés à sa base dans les nombreux enfoncemens dont elle est sillonnée, et qu'enfin les artères du cerveau ne pénètrent sa substance qu'après avoir subi dans le tissu de la pie-mère, qui en paroît uniquement composée, des divisions extrêmement multipliées.

Les vaisseaux qui rapportent la portion du sang qui n'a point été employée à sa nourriture et à son accroissement sont, au contraire, placés vers sa partie supérieure, entre sa surface convexe et la voûte du crâne. Là, chaque anfractuosité est parcourue par une grosse veine qui va se rendre au sinus longitudinal supérieur. Les veines de Galien, qui, de l'intérieur des ventricules, rapportent au sinus droit le sang distribué aux plexus choroïdes; quelques veinules qui se dégorgent dans les sinus caverneux et communicans; quelques autres aussi très-petites qui, passant par les trous dont sont percées les grandes ailes du sphénoïde, vont concourir à la formation du plexus veineux de la fosse

(1) Planches anatomiques : Cerveau de l'homme, troisième cahier.

zygomatique, forment seules exception à cette règle générale.

Ceci posé sur la disposition des vaisseaux artériels et veineux qui se distribuent au cerveau, examinons quels doivent être les effets de leur action relativement à ce viscère.

Les contractions du cœur chassent le sang dans les tubes artériels, qui éprouvent, surtout aux endroits de leurs courbures, un déplacement marqué, en même temps qu'ils se dilatent. Toutes les artères placées à la base du cerveau éprouvent ces deux effets à la fois. Leurs efforts réunis lui impriment un mouvement d'élévation auquel l'abaissement succède, quand, revenant sur elles-mêmes, elles réagissent sur le sang qui les remplit.

Ces mouvemens n'ont point lieu tant que le crâne conserve son intégrité. Cette cavité est trop exactement remplie; il ne se trouve aucun espace vide entre les membranes du cerveau. Lorry, qui en a nié avec raison l'existence, a commis une erreur anatomique non moins grave lorsqu'il a prétendu que la tendance au mouvement ne pouvant avoir aucun effet, à cause de l'exacte plénitude du crâne, étoit satisfaite du côté des ventricules, qu'il regarde comme des cavités réelles, mais qui, comme Haller l'a démontré, ne sont, dans l'état naturel, que des surfaces contiguës, de simples parois de cavité en contact. Cette tendance au mouvement ne se convertit en mouvement réel

que dans le cas où il y a perte de substance aux parois du crâne.

On conçoit néanmoins que le cerveau, mou et peu consistant, cède à la légère pression qu'exercent sur lui ses vaisseaux artériels. Cette action continuelle du cœur sur le cerveau n'explique-t-elle pas d'une manière satisfaisante la sympathie remarquable entre ces deux organes, liés par de si étroits rapports? Elle a en outre une utilité bien évidente, et relative au retour du sang distribué à la masse cérébrale et à ses enveloppes. Les veines qui le rapportent, alternativement comprimées contre la voûte du crâne, se dégorgent avec plus de facilité dans les sinus de la dure-mère, auxquels elles se rendent sous un angle rétrogade et défavorable au cours du sang qu'elles y versent.

Lorsqu'une cause quelconque empêche le libre passage du sang à travers les poumons, le fluide stagne dans les cavités droites du cœur; la veine-cave supérieure, les jugulaires internes, et par suite les sinus de la dure-mère et les veines du cerveau qui y aboutissent, sont graduellement distendus, et, si cette dilatation étoit portée à un certain degré, les veines du cerveau, placées entre lui et la voûte du crâne, tendroient à le déprimer vers la base de cette cavité. Si cette dilatation, d'abord légère, étoit portée au delà de l'extensibilité de ces vaisseaux, leur rupture donneroit lieu à des épanchemens mortels. C'est ainsi que quelques auteurs ont expliqué l'apoplexie sanguine.

On objectera peut-être que plusieurs des sinus de la dure-mère se trouvent à la base du crâne, et que, par conséquent, leur dilatation doit tendre à soulever la masse cérébrale.

Mais la plupart de ces sinus n'ont de rapports qu'avec le cervelet et la moelle allongée, dont on n'a pu jusqu'ici reconnoître les mouvemens. Ces sinus sont presque tous logés dans les bords de la faux et de la tente du cervelet. Les sinus caverneux dans lesquels se dégorge la veine ophthalmique, les communicans, qui permettent au sang de l'un de ces sinus de passer dans l'autre, sont trop peu considérables pour produire l'élévation de la masse cérébrale. Enfin, la résistance de leurs parois, principalement formées par la dure-mère, doit mettre des bornes étroites à leur dilatation : le tissu spongieux qui remplit l'intérieur des sinus caverneux rend encore cette dilatation et le reflux du sang plus difficiles.

CXLVIII. Il ne suffit pas de prouver, par des raisons tirées de la disposition des parties, que les mouvemens du cerveau lui sont communiqués par l'ensemble des artères placées à sa base ; il faut encore établir ce fait sur l'observation, et le rendre incontestable par des expériences positives. Voici celles que j'ai tentées pour arriver à ce but :

A. J'ai d'abord répété l'observation de quelques auteurs, et reconnu, comme eux, que les pulsations senties en plaçant le doigt sur les fontanelles du crâne des enfans nouveau-nés corres-

pondent parfaitement aux battemens du cœur et des artères.

B. Un malade trépané pour une fracture avec épanchement sur la dure-mère m'a offert le cerveau s'élevant et s'abaissant alternativement. L'élévation correspondoit à la diastole ; l'abaissement à la systole des artères.

C. Deux chiens trépanés ont présenté le même phénomène dans le même rapport avec la dilatation et le resserrement de ces vaisseaux.

D. J'ai enlevé avec précaution la voûte du crâne sur le cadavre d'un adulte. La dure-mère, dégagée de ses adhérences avec les os qu'elle tapisse, fut conservée parfaitement intacte. Je mis ensuite à découvert les carotides primitives, et j'injectai de l'eau dans les conduits. A chaque coup de piston, le cerveau offroit un mouvement d'élévation bien sensible, surtout lorsque l'injection étoit poussée en même temps par les deux carotides.

E. J'ai injecté les veines jugulaires internes, la masse cérébrale est restée immobile. Seulement les veines du cerveau, les sinus de la dure-mère, se sont dilatés. L'injection ayant été soutenue pendant quelque temps, il en est résulté un léger gonflement du cerveau; poussée avec plus de force, quelques veines se sont rompues, et la liqueur s'est écoulée. La même injection ayant été faite avec de l'eau fortement rougie, la surface du cerveau s'est colorée d'un rouge intense. Pour bien apercevoir cet effet, on doit, après avoir enlevé

la voûte du crâne, inciser de chaque côté la dure-mère, au niveau de la coupe circulaire de la boîte osseuse, puis relever les lambeaux vers le sinus longitudinal supérieur.

F. Les veines jugulaires internes étant ouvertes pendant l'injection des artères carotides primitives, chaque coup de piston fait jaillir le sang veineux avec la plus grande force; preuve bien évidente de l'influence qu'exercent les mouvemens du cerveau sur le cours du sang dans ses veines et dans les sinus de la dure-mère. Cette expérience a déjà été faite par d'autres anatomistes, et entre autres par Ruisch, dans la vue de prouver la communication directe entre les artères et les veines. Cette communication, aujourd'hui généralement admise, se démontre par d'autres faits. On sent que celui-ci n'est rien moins que concluant.

G. Sur un chien trépané, j'ai lié successivement les deux carotides. Les mouvemens du cerveau ont diminué, mais n'ont pas cessé entièrement. Les anastomoses des vertébrales avec les branches des carotides rendent raison de ce phénomène.

H. J'ai pris un lapin, animal doux, facile à contenir, et très-propre aux expériences difficiles : après avoir mis le cerveau à découvert, et reconnu que ses mouvemens étoient bien évidemment isochrones aux battemens du cœur, j'ai lié le tronc de l'aorte ascendante : au moment où le sang a

cessé de se porter vers la tête, le cerveau a cessé tout à coup de se mouvoir, et l'animal a perdu la vie.

I. La ligature des veines jugulaires internes n'a point entraîné la perte des mouvemens du cerveau; mais ses veines se sont dilatées, et sa surface, mise à découvert par l'ablation d'un lambeau de la dure-mère, a paru sensiblement plus rouge que dans l'état naturel. Le chien s'est assoupi, et a expiré au milieu des mouvemens convulsifs.

L'ouverture de ces veines n'a point empêché les mouvemens de continuer; ils ne s'affoiblirent que lorsque l'animal fut débilité par la perte de son sang.

K. L'ouverture du sinus longitudinal supérieur, la seule qu'il soit facile d'effectuer, n'affoiblit point les mouvemens du cerveau. On observe que le sang en sort plus abondamment durant l'élévation.

L. La compression du thorax sur des cadavres humains ne produit qu'un reflux peu marqué dans les veines jugulaires, surtout si, pendant cette compression, le tronc est tenu soulevé. Le reflux est plus apparent lorsque le cadavre est couché sur un plan horizontal.

On pourroit varier ces expériences et les multiplier davantage; pousser, par exemple, l'injection en même temps par les artères vertébrales et les carotides internes; mais celles dont je viens de rendre compte suffisent à l'objet que je me suis proposé.

Depuis l'époque de la première publication de ce travail, dans le Recueil des Mémoires de la Société médicale (1), j'ai eu plusieurs occasions de répéter les observations et les expériences qui servent de fondement à la théorie qui s'y trouve exposée. Parmi ces faits confirmatifs, il en est un qui me paroît digne d'être rapporté; il suffiroit seul, s'il étoit possible d'établir une théorie sur l'observation d'un seul phénomème. Une femme, âgée d'environ cinquante ans, avoit au crâne une carie énorme : le pariétal gauche étoit détruit dans la plus grande partie de son étendue, et laissoit à découvert une portion assez considérable de la dure-mère. Rien n'étoit plus facile que de constater une parfaite correspondance entre les mouvemens du cerveau et les battemens du pouls. Je recommandai à la malade de tousser, de suspendre instantanément sa respiration; les mouvemens persistèrent dans les mêmes rapports : dans l'effort de la toux, la tête étoit agitée; et la secousse générale, à laquelle participoit le cerveau, eût pu en imposer à un observateur prévenu, pour des mouvemens propres à cet organe, et dépendans du reflux du sang dans ses vaisseaux veineux.

Dans les expériences sur les chiens, le même mouvement a lieu quand l'animal aboie; mais il

---

(1) Mémoires de la Société médicale de Paris, an VII (1799), troisième année, page 197 et suiv.

est facile de voir que la secousse éprouvée par le cerveau est ressentie par tout le corps, que l'effort expiratoire nécessaire à l'aboiement ébranle d'une manière plus ou moins violente.

La malade qui fait le sujet de l'observation précédente est morte un mois environ après mon entrée à l'hôpital Saint-Louis, où elle étoit depuis long-temps. A l'ouverture du cadavre, on a trouvé le lobe gauche du cerveau malade, ramolli et tombé dans une sorte de fonte putride; l'ichor qu'il fournissoit abondamment s'écouloit au dehors par une ouverture fistuleuse qu'offroit la dure-mère, dont le tissu s'étoit un peu épaissi.

CLXIX. Le peu de consistance du cerveau, que Lorry regarde comme favorable à la communication du mouvement que lui impriment ses artères, me semble contraire à cette transmission. En effet les vaisseaux dilatés, ne pouvant déprimer la base du crâne sur laquelle ils reposent, exercent leur effort contre la masse cérébrale, et la soulèvent d'autant plus facilement (la voûte du crâne étant enlevée) qu'elle offre une certaine résistance. Si le cerveau étoit trop mou, l'artère s'enfonceroit dans sa substance, et ne pourroit en mouvoir la totalité. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de faire attention à ce qui arrive lorsque la partie postérieure du genou repose sur un oreiller, ou sur un autre corps de cette espèce: alors les mouvemens que l'artère poplitée imprime au membre sont très-peu sensibles; ils devien-

nent au contraire très-apparens lorsque le jarret appuie sur un plan qui offre une certaine résistance : le genou du côté opposé, par exemple. Alors l'artère, qui ne peut le déprimer, emploie toute son action à soulever l'extrémité inférieure; ce qu'elle fait d'autant plus aisément qu'elle agit contre une partie osseuse, résistante et dure. Cette expérience infirme complétement l'opinion de Lorry. On n'objectera point le défaut d'analogie; on ne dira pas que le cerveau est d'un poids plus considérable que l'extrémité inférieure, ni que la somme réunie des calibres des artères carotides internes et vertébrales ne l'emporte pas sur celui de l'artère poplitée.

Cette tendance continuelle qu'a le cerveau pour s'élever produit à la longue, sur les os du crâne qui s'opposent à ce mouvement, des effets très-marqués. Ainsi la surface intérieure de ces os, presque lisse dans les premiers temps de la vie, se creuse d'enfoncemens d'autant plus profonds que l'on est plus avancé en âge. Les impressions digitales et les éminences mamillaires, correspondantes aux circonvolutions et aux anfractuosités du cerveau, sont en partie le produit de son action sur les parois de la cavité qui le renferme. Quelquefois il arrive que, dans un âge très-avancé, les os du crâne se trouvent tellement amincis, par cette sorte d'usure intérieure, que les pulsations du cerveau deviennent sensibles à travers le cuir chevelu.

Nul doute que la même cause n'accélère la destruction du crâne par les tumeurs fongueuses de la dure-mère. L'effort expansif de la tumeur qui se développe s'y joint encore, et rend l'usure des os plus rapide. Au bout de quelques mois, la tumeur se prononce au dehors, et présente alors des pulsations bien évidemment isochrones aux battemens du pouls, comme l'observe Louis dans un Mémoire inséré parmi ceux de l'Académie de chirurgie.

J'ai fait voir (CXLVII) que la disposition des veines du cerveau et des sinus de la dure-mère s'opposoit à l'action qu'on leur attribuoit sur ce viscère. L'expérience (*E. L.*) prouve que la stagnation du sang, ou même le refoulement de ce liquide, ne pourroit produire que la distension plus ou moins grande des sinus de la dure-mère, des veines qui viennent y aboutir, et une légère turgescence de la masse cérébrale, si la cause qui produit la stase du sang ou son reflux prolongeoit son action, et que l'intégrité du crâne fût détruite.

Enfin les mouvemens alternatifs du cerveau, que l'on dit correspondre à ceux de la respiration, devroient être, aux battemens du pouls, dans le rapport ordinaire de 1 à 5. Il est au contraire facile de s'assurer que ces mouvemens sont dans un rapport inverse, et parfaitement isochrones aux battemens du cœur et des artères.

Les résultats des expériences dont j'ai rendu

compte dans cet article, comparés à ceux qu'ont obtenus des auteurs justement célèbres, présentoient des différences trop frappantes pour que je n'aie pas essayé de remonter à leur cause. Pour cela j'ai cru devoir en examiner scrupuleusement toutes les circonstances.

L'ouvrage de Lamure renferme des erreurs anatomiques qui inspirent de justes défiances sur son exactitude. Haller n'a point fait lui-même les expériences dont il parle en traitant de l'influence de la respiration sur la circulation du sang veineux. Cet article est tiré d'une thèse soutenue à Gottingue par l'un de ses disciples. Enfin, Vicq-d'Azir n'a tenté aucune expérience confirmative, et semble n'avoir eu en vue que de concilier toutes les opinions.

Aucun de ces anatomistes n'a distingué les mouvemens d'élévation imprimés à la masse cérébrale par l'influence de ses artères, du gonflement des sinus de la dure-mère, des veines qui s'y rendent, et de la tuméfaction du cerveau, qui peut résulter de l'influence de la respiration. Cette méprise aura été d'autant plus facile que les animaux tourmentés par le couteau de l'anatomiste ont une respiration inégale, convulsive, et dont les temps se succèdent à des intervalles moins longs que dans l'état naturel. Schlitting, le premier auteur de ces expériences, paroît surtout avoir confondu le mouvement d'élévation, le véritable déplacement qu'éprouve le cerveau, avec la turgescence de ce

viscère. Dans chaque expiration, dit-il, j'ai vu le cerveau s'élever, c'est-à-dire se tuméfier, et, à chaque inspiration, je l'ai vu s'abaisser, c'est-à-dire se détuméfier. « *Toties animadverti perspicuè...* « *in omni exspiratione cerebrum universum ascen-* « *dere, id est intumescere; atque in quâvis inspira-* « *tione illud descendere, id est detumescere.* »

L'on peut donc regarder comme une vérité rigoureusement démontrée par l'observation, l'expérience et le raisonnement, la proposition suivante : *Les mouvemens que présente le cerveau mis à découvert lui sont exclusivement communiqués par les pulsations des artères placées à sa base, et sont parfaitement isochrones aux battemens de ces vaisseaux : en outre, le reflux et la stagnation du sang veineux gonflent sa substance, et produisent une turgescence qui correspond aux efforts expiratoires.*

CL. *Action des nerfs et du cerveau.* C'est sans doute, comme l'a dit Vicq-d'Azir, par un mouvement, quel qu'il soit, que les nerfs agissent. En partant de cette idée simple, on peut distinguer plusieurs sortes de mouvemens nerveux, l'un qui se porte de la circonférence au centre : c'est le mouvement de sensation que nous allons plus particulièrement étudier dans ce paragraphe; l'autre du centre à la circonférence, et ce mouvement, produit par la volonté, détermine l'action des organes musculaires, etc.

Par quel moyen les impressions produites sur

les sens par les corps qui nous environnent sont-elles transmises le long des nerfs jusqu'à l'organe encéphalique? Est-ce par l'intermède d'un fluide subtil, ou bien les nerfs peuvent-ils, ainsi que l'ont enseigné plusieurs physiologistes, être regardés comme des cordes vibrantes? Cette dernière hypothèse est tellement absurde qu'on a lieu de s'étonner de la longue faveur dont elle a joui. Pour qu'une corde oscille ou exécute des vibrations, elle doit être tendue dans toute sa longueur, isolée et assujettie par ses deux bouts. Les nerfs ne sont point tendus; leurs extrémités, nullement affermies, s'approchent et s'éloignent suivant la position différente, la tension, le gonflement, la réplétion ou l'affaissement des parties, et varient continuellement de distance. D'ailleurs les cordons nerveux, placés entre deux pulpes, celle de leur origine et celle de leur terminaison, ne peuvent être tendus entre ces deux points. La fibre nerveuse est la plus molle, la moins élastique de toutes les fibres animales; quand on coupe un nerf, ses deux bouts, bien loin de s'écarter en se rétractant, s'allongent au contraire et se dépassent mutuellement; le point de section présente plusieurs petits boutons médullaires, formés par la substance nerveuse et blanche qui s'écoule de ces canalicules membraneux. Environnés de parties auxquelles ils sont unis d'une manière plus ou moins intime, les nerfs ne pourroient d'ailleurs exécuter des vibrations; enfin, en admettant leur possibilité, la vi-

bration d'un seul filet devroit entraîner celle de tous les autres, et porter le trouble, la confusion et le désordre dans les mouvemens et dans les sensations.

Il est bien plus raisonnable de croire que les nerfs agissent au moyen d'un fluide subtil, invisible, impalpable, auquel les anciens donnèrent le nom d'*esprits animaux*. Ce fluide, inconnu dans sa nature, appréciable seulement par ses effets, doit être d'une ténuité extrême, puisqu'il échappe à tous nos moyens de recherche. Vient-il entièrement du cerveau? ou bien est-il également sécrété par les enveloppes membraneuses de chaque filament nerveux? (*Neurilèmes*, Reil.) L'on ne pourroit, à vrai dire, apporter d'autres preuves en faveur de l'existence d'un fluide nerveux, que la facilité avec laquelle on explique par son moyen les divers phénomènes du sentiment et le besoin que l'on en a pour expliquer ces phénomènes. Ces preuves pourroient bien ne pas satisfaire complétement les esprits sévères, qui ne regardent pas comme prouvées les choses seulement probables.

Parmi les principes constituans de l'atmosphère sont quelques fluides généralement répandus, tels que celui de l'électricité. Ces fluides, entrés avec l'air dans les poumons, ne peuvent-ils point se combiner avec le sang artériel, et être portés, par son moyen, soit au cerveau, soit dans les autres organes? l'action vitale ne leur imprime-t-elle point de nouvelles propriétés, en leur

faisant éprouver des combinaisons inconnues? Le calorique et l'oxigène entrent-ils comme matériaux dans ces combinaisons qui dénaturent le fluide, le vitalisent, lui impriment des différences essentielles et incalculables (1)? Ces conjectures n'ont-elles pas acquis un certain degré de probabilité, depuis que l'analogie du galvanisme avec l'électricité, d'abord présumée par l'auteur de cette découverte, a été confirmée par les expériences si curieuses de Volta, répétées, expliquées dans ce moment (1801) par tous les physiciens de l'Europe (2)?

L'action du fluide nerveux se passe de l'extrémité des nerfs vers le cerveau, pour la production des phénomènes du sentiment puisque la ligature des nerfs éteint la sensibilité des parties placées au-dessous de cette ligature, tandis que, comme nous le verrons en son lieu, cette action se propage du cerveau vers les extrémités nerveuses, et du centre à la circonférence, pour produire les mouvemens de toute espèce. Ce double

---

(1) Sans ces changemens, il suffiroit de l'électricité pour redonner la vie à un animal qui vient de la perdre.

(2) Jusqu'ici le galvanisme n'a point réalisé les espérances que les physiologistes en avoient conçues. La chimie en a retiré de plus grands avantages; il est aujourd'hui entre les mains de MM. Davy, Thenard et Gay-Lussac, le moyen le plus énergique qu'elle possède pour l'analyse de certains corps.

courant, en sens contraire, ne s'effectue point le long des mêmes nerfs; car comme nous l'avons vu, on peut les partager en deux classes, et les distinguer en *sensitifs* et en *moteurs*.

Toutes les impressions ressenties par les organes des sens, par les extrémités sentantes des nerfs, sont transmises à la masse cérébrale. Le cerveau est donc le centre de la vie extérieure; c'est à lui qu'aboutissent toutes les sensations; c'est de lui qu'émane la cause productrice de tous les mouvemens volontaires; il en est de ce centre pour les fonctions de relation, comme du cœur par rapport aux fonctions de nutrition. On peut dire de lui comme de ce dernier organe : *Omnibus dat, et ab omnibus accipit.* Il reçoit de tous, et donne à tous.

La masse médullaire, renfermée dans l'intérieur du crâne, paroît formée de deux appareils d'une nature différente. Dans les parties logées à la base, et dont l'ensemble a reçu des anatomistes le nom de *moelle allongée*, réside plus spécialement la puissance nerveuse qui préside aux mouvemens. D'après des expériences récentes, le principe des mouvemens inspiratoires auroit son siége dans cette partie de la moelle allongée, d'où naissent les nerfs de la huitième paire : tout porte à croire que le principe des efforts du vomissement est très-voisin de celui des mouvemens de la respiration, s'il ne se confond pas avec lui. Les parties supérieures paroissent plus spécialement destinées

à l'exercice de l'intelligence; nulle part ces organes superposés et comme surajoutés, ne sont plus nombreux et plus développés que chez l'homme. Nul animal n'a, comme lui, des hémisphères cérébraux assez volumineux, non-seulement pour recouvrir et dominer tout le reste de la masse encéphalique, mais encore soulever en quelque manière et pousser au-devant d'eux la partie antérieure du crâne qui surmonte la face, et, sous le nom de région frontale, en constitue une partie. Ce développement antérieur de la masse encéphalique a paru tellement propre à l'espèce humaine, que certains philosophes n'ont pas hésité à y placer le sens par lequel l'homme s'élève à la notion abstraite de la divinité. C'est là que, suivant M. Gall, est logé l'organe de la théosophie. Quoi qu'il en soit, par quel moyen la volonté agit-elle pour déterminer les mouvemens? Quels liens unissent les forces sensitives aux puissances motrices? Ces questions sont insolubles dans l'état actuel de la science, dont un des plus grands besoins est maintenant de déterminer, d'une manière précise, les fonctions propres des différentes portions du cerveau et des appareils centraux, siége de la puissance nerveuse. Cette puissance, soit que les nerfs la possèdent par eux-mêmes, et qu'inhérente à leur tissu, elle résulte de leur action, ou que, simples conducteurs, ils n'en soient que les dépositaires, cette puissance nerveuse est la cause première de la vie.

L'existence d'un lieu central, auquel se rapportent toutes les sensations, duquel partent tous les mouvemens, est nécessaire à l'unité de l'être pensant, à l'harmonie des fonctions intellectuelles. Mais ce siége du principe du sentiment et des mouvemens est-il circonscrit dans les étroites limites du point mathématique, ou plutôt ne doit-on point le regarder comme étendu à la presque totalité du cerveau? Cette dernière opinion nous paroît la plus raisonnable; sans cela, de quelle utilité pourroient être ces divisions de l'intérieur de l'organe en plusieurs cavités, cette multitude d'éminences, toutes différentes par leur forme et par l'arrangement des deux substances qui entrent dans leur structure? On doit conjecturer, avec beaucoup de vraisemblance, que chaque perception, chaque classe d'idées, chaque faculté de l'entendement, est attribuée à telle ou telle partie du cerveau. Il nous est, à la vérité, impossible d'assigner les fonctions spéciales de chacune des parties de l'organe, de dire à quoi sont destinés les ventricules, quel usage remplissent les commissures, ce qui se passe dans les pédoncules; mais il est impossible d'étudier un arrangement aussi combiné, et de penser qu'aucun dessein n'y est attaché, et que cette division de la masse cérébrale en tant de parties si distinctes et si diversement configurées n'est pas relative à la part différente que chacune doit remplir dans l'artifice de la pensée. Toutefois c'est bien au cerveau que

s'applique cette comparaison ingénieuse rapportée dans l'éloge de Méry, par Fontenelle. Nous autres anatomistes, m'a-t-il dit une fois, nous sommes comme les crocheteurs de Paris, qui en connoissent toutes les rues, jusqu'aux plus petites et aux plus écartées, mais qui ne savent pas ce qui se passe dans les maisons.

Que penser alors du système de Gall et de sa division de l'extérieur du crâne en plusieurs compartimens, qui, selon la dépression ou la saillie de la boîte osseuse, indiquent l'absence ou l'existence de diverses facultés, soit morales, soit intellectuelles? Que cette doctrine physiologique des fonctions du cerveau, établie sur un trop petit nombre de faits bien observés, est aussi frivole que ses découvertes anatomiques sur cet organe, et le système nerveux en général, offrent d'avantages et de solidité.

CLI. *Analyse de l'entendement.* En vain les organes des sens seroient ouverts à toutes les impressions qu'exercent sur eux les objets qui nous environnent; en vain les nerfs seroient disposés à les transmettre : ces impressions deviendroient inutiles; elles seroient pour nous comme n'existant pas; en un mot, nous n'en aurions pas la connoissance, si le cerveau n'existoit pour les ressentir. Cet organe est, à proprement parler, le siége de toute sensation; celles que produisent la lumière, le bruit, les odeurs, les saveurs, etc., n'existent pas dans les organes qui en reçoivent

l'impression ; c'est le centre sensitif, qui voit les couleurs, entend les sons, flaire les odeurs, goûte les saveurs ; il suffit, en effet, d'intercepter la communication entre ces organes et le cerveau par la compression ou la ligature des nerfs, pour que nous n'ayons aucune conscience, aucune sensation des impressions que ces organes éprouvent.

Les douleurs atroces qu'un panaris occasione, cessent quand on place sur le bras une ligature fortement serrée, qui, en comprimant les nerfs, intercepte toute communication entre le cerveau et la partie malade. Un animal vivant, soumis à l'expérience, supporte sans souffrir les dilacérations les plus cruelles, lorsqu'on a préliminairement coupé tous les nerfs qui se rendent à la partie sur laquelle on opère. Enfin les organes des sens, et les nerfs qui établissent la communication entre eux et le cerveau, n'ont souffert aucune lésion, sont très-aptes à ressentir et à transmettre l'impression sensitive, et cependant les phénomènes des sensations ne peuvent s'accomplir quand le cerveau est malade : lorsqu'il est, par exemple, comprimé par un amas de fluide, par une esquille détachée du crâne dans une plaie de tête. Cet organe est donc l'instrument immédiat des sensations, dont les impressions exercées sur tous les autres ne sont que les causes occasionelles. Cette modification de la sensibilité, au moyen de laquelle sont établies les relations de l'être vivant

avec les objets du dehors, seroit à bon droit nommée *sensibilité cérébrale*, si les animaux chez lesquels il n'existe ni cerveau ni système nerveux distinct n'en offroient des signes évidens. La sensibilité, en vertu de laquelle le polype dilate sa cavité pour admettre sa proie, puis se contracte pour la retenir, est en effet bien distincte de cette *sensibilité nutritive* à l'aide de laquelle sa substance s'approprie les sucs nourriciers.

Le cerveau, comme l'a dit très-bien Cabanis, agit sur les impressions que les nerfs lui transmettent, comme l'estomac sur les alimens que l'œsophage y verse; il les digère à sa manière : ébranlé par le mouvement qui lui est communiqué, il réagit, et de cette réaction naît la *sensation perceptive* ou la perception. Dès ce moment, l'impression devient une idée; elle entre comme élément dans la pensée, et peut se prêter aux diverses combinaisons que les phénomènes de l'entendement exigent (1).

CLII. Nos sensations ne sont que des modifications de notre être; elles ne sont pas les qualités même des objets : il n'est pas de corps coloré pour un aveugle de naissance; la plus belle rose perd sa plus précieuse qualité auprès d'un homme chez

---

(1) Nous croyons devoir avertir que les termes de *pensée* et d'*entendement* doivent être regardés comme synonymes; tous deux expriment, d'une manière abrégée, toutes les opérations du centre sensitif.

lequel l'odorat est aboli ; il ne la distingue d'une anémone que par sa couleur, sa figure, etc. Nous n'apercevons donc rien qu'en nous-mêmes ; ce n'est qu'à la faveur de l'habitude, ce n'est qu'en appliquant successivement plusieurs de nos sens à la recherche des différentes qualités du même objet, que nous parvenons à le séparer de notre propre existence, à le concevoir distinct de nous-mêmes et des autres corps que nous connoissons, en un mot, à rapporter aux objets du dehors les sensations qui se passent en nous-mêmes. Nos idées ne nous viennent que par les sens ; il n'en est pas d'*innées*, comme on l'a pensé jusqu'à Locke, qui a consacré à la réfutation de cette erreur une grande partie de son bel ouvrage sur l'entendement humain : l'enfant qui naît à la lumière est disposé à en acquérir, par cela même qu'il est pourvu d'un appareil organique susceptible de recevoir l'impression des objets environnans.

Le cerveau préexiste aux idées, comme l'œil à la vue : partout l'existence de l'organe précède l'exercice de la fonction ; et il est aussi impossible de concevoir la pensée sans le cerveau que la vision sans l'organe destiné à recevoir les impressions de la lumière (1).

---

(1) La pensée et non point l'âme, choses distinctes que confondent à dessein les sophistes de notre époque, admirables peut-être s'ils deviennent jamais intelligibles, et que

On ne peut point rigoureusement comparer, comme l'ont fait quelques philosophes, le cerveau de l'enfant nouveau-né à une table rase, sur laquelle doivent se dessiner tous les actes de son intelligence. Si les sensations ne venoient que du dehors, si les sens extérieurs étoient les seuls organes qui pussent transmettre des impressions au centre cérébral, l'entendement eût été nul au moment de la naissance, et la comparaison de son organe à une feuille de papier blanc, ou bien à un plateau de marbre de Paros, sur lequel on n'auroit tracé aucun caractère, seroit parfaitement exacte. Mais il faut nécessairement reconnoître, avec Cabanis, que nos idées nous viennent de deux sources bien distinctes; savoir, les sens extérieurs et les organes intérieurs; ces sensations intérieures, résultat des fonctions qui s'exercent en nous-mêmes, sont la cause de ces déterminations instinctives en vertu desquelles l'enfant nouveau-né saisit le mamelon de sa mère, et suce son lait, par une action dont le mécanisme est singulièrement compliqué, ou qui portent les petits des animaux à saisir la mamelle aussitôt après

---

jusque-là nous laisserons abymés dans la contemplation du *moi* et de sa *cause causale*. Quant aux médecins, suivant lesquels le corps non-seulement n'est pas nécessaire à la vie, mais la rend moins active et moins parfaite qu'elle ne le serait débarrassée de cette enveloppe incommode, nous nous garderons bien de contester l'évidence de leur doctrine!!!

leur naissance, et quelquefois même avant que l'accouchement soit terminé, et lorsque leurs extrémités sont encore engagées dans le vagin de leur mère. Comme l'a très-bien vu le philosophe que nous venons de citer, l'instinct naît des impressions reçues par les organes intérieurs, tandis que le raisonnement est le produit des sensations extérieures; et l'étymologie du mot *instinct*, formé de deux racines grecques, dont l'une signifie *piquer*, et l'autre *dedans*, s'accorde avec la signification qu'on y attache.

Ces deux parties de l'entendement, le raisonnement et l'instinct, se réunissent, se mêlent et se confondent pour produire le système intellectuel et les diverses déterminations dont nous sommes susceptibles. Mais la part qu'a chacune d'elles dans la formation des idées est bien différente dans les animaux, où les sens extérieurs, plus grossiers, laissent prédominer l'instinct; et dans l'homme, chez qui la perfection de ces sens, et l'art des signes qui fixent la pensée fugitive, donnent au raisonnement une prépondérance marquée, en même temps qu'elles affoiblissent l'instinct. On sent aisément que le cerveau, assiégé par une foule d'impressions qui lui viennent du dehors, porte moins d'attention, laisse par conséquent échapper la plupart de celles qui résultent des excitations intérieures. L'instinct vaut mieux dans l'homme sauvage, et sa perfection relative compense pour lui les avantages qu'une raison supé-

rieure assure à l'homme civilisé. Le système moral et intellectuel d'un individu, étudié à diverses époques de son existence, doit d'autant plus aux sensations intérieures, qu'elle est moins avancée; car l'instinct se dégrade à mesure que la raison s'étend et s'épure.

Ainsi, quoique tous les phénomènes de l'entendement dérivent de la sensibilité physique, cette sensibilité étant mise en jeu par deux sortes d'impressions, le cerveau d'un enfant qui vient au monde a déjà la conscience de celles qui résultent de l'action intérieure, et c'est en vertu de ces impressions qu'il exécute certains mouvemens spontanés dont l'explication étoit embarrassante pour Locke et pour ses disciples; aussi les partisans des idées innées les regardoient-ils comme des argumens les plus décisifs en faveur de leur système; mais ces idées, antérieures à toute action des objets extérieurs sur les sens, sont simples, peu nombreuses, et ne se rapportent qu'à un petit nombre de besoins: l'individu à peine a vécu quelques heures, qu'il exprime déjà une foule de sensations qui l'assiégent dès l'instant de sa naissance; sensations qui se sont propagées, combinées, ont déterminé des mouvemens avec une rapidité qui égale, si elle ne surpasse, celle de la lumière.

Ce n'est qu'après avoir posé, entre les sources de nos connoissances, une ligne de démarcation bien précise; ce n'est qu'après avoir scrupuleusement distingué les déterminations rationnelles des

déterminations instinctives, et reconnu que l'âge, le sexe, le tempérament, la santé, la maladie, le climat, l'habitude, qui modifient l'organisation physique, doivent, par un effet secondaire, modifier ces dernières, qu'il est possible de concevoir la diversité des humeurs, des sentimens, des caractères, et la différente portée des esprits. Celui qui a justement apprécié l'altération du jugement et du raisonnement, par les sensations qui naissent de l'état habituel des organes intérieurs, voit sans peine d'où proviennent les éternelles disputes sur les distinctions entre l'âme sensitive et l'âme rationnelle; pourquoi quelques philosophes ont cru l'homme tourmenté sans cesse par un bon et par un mauvais génie; génies qu'ils ont personnifiés sous les noms d'*Oromaze* et d'*Arimane*, entre lesquels ils ont supposé une guerre éternelle, ces combats de l'âme et des sens, de la raison et de la chair, du principe concupiscible et irascible avec le principe intellectuel; cette contradiction qu'éprouvoit saint Paul lorsqu'il s'écrie, dans son Épître aux Romains (1), que ses membres sont en révolte déclarée contre sa raison. Ces phénomènes, qui feroient croire à la duplicité de l'être intellectuel (*homo duplex*, Buffon), ne sont autre chose qu'une lutte établie entre les déterminations instinctives et les déterminations ration-

(1) *Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ.* Epist. ad Rom.

nelles, entre les besoins souvent impérieux de l'organisme et le jugement qui les réprime, ou délibère sur les moyens d'y obtempérer sans choquer les idées reçues de convenance, de devoir ou de religion, etc.

Les premières déterminations de l'instinct ne supposent point l'existence d'*idées innées*. Il n'existe chez l'individu qui vient à la lumière que des *dispositions innées*. Ces dispositions, relatives à son organisation, et variables comme elle, sont la véritable cause de ces actions, en apparence raisonnées, en vertu desquelles le nouveau-né de l'espèce humaine et des animaux mammifères saisit le mamelon de la nourrice et suce un lait réparateur. Les mouvemens qu'il se donne ne sont point le résultat d'un calcul réfléchi; il les exécute par une sorte de nécessité. Un enfant mâle, fort et vigoureux, abreuvé d'eau sucrée, en attendant l'arrivée de sa nourrice, s'efforçoit visiblement d'atteindre au sein de sa mère, à côté de laquelle on l'avoit placé. Cette tendance n'étoit ni plus raisonnée ni mieux réfléchie, ne supposoit pas davantage l'existence des idées et d'une intelligence que celle qui porte les plantes renfermées dans un caveau obscur à diriger leur tige vers le soupirail par lequel arrive la lumière. Les partisans des idées innées se sont long-temps appuyés d'une observation de Galien, évidemment embellie par l'imagination de son auteur, qui ayant, dit-il, tiré un chevreau du sein de sa mère, lui offrit des

herbages, et vit qu'entre plusieurs végétaux il préféroit le cytise. Un chevreau, couvert de mucosités, incapable de mouvemens un peu étendus, ne pourroit brouter le cytise qui lui seroit offert au moment même où il vient de naître. Mais lors même que le fait rapporté par Galien auroit quelque chose de vrai, ce ne seroit point en vertu d'une connoissance anticipée que le chevreau choisiroit le cytise; mais par cet instinct commun à tous les animaux, qui, au milieu d'une prairie dans laquelle croissent, à côté des végétaux salutaires qui leur servent de pâture, plusieurs plantes vénéneuses, ne touchent point à celles-ci; et cela, la première fois qu'on les mène aux champs, et sans qu'ils aient pu acquérir à ce sujet aucune sorte d'expérience.

Les masses prodigieuses qui composent notre système planétaire se maintiennent avec le soleil, autour duquel toutes se meuvent, dans des rapports admirables que le calcul a soumis à ses lois. Un acide minéral, tel que le sulfurique, versé sur une dissolution saline, le carbonate de chaux, par exemple, fera toujours dégager l'acide carbonique, et, s'emparant de sa base, formera du sulfate de chaux. Ce phénomène chimique tient à la nature différente des corps, ainsi qu'aux affinités qui en dérivent. Dira-t-on que c'est par un calcul raisonné que les planètes décrivent autour du soleil leurs constantes ellipses; qu'il y a de l'intelligence dans les molécules des sels, qui cèdent à

la puissance des affinités, ou cristallisent sous une forme régulière, presque toujours la même pour chaque espèce de sel? Sans doute, comme l'a très-bien observé Bichat, si les hommes eussent perfectionné les sciences physiologiques avant de cultiver la physique, ils auroient transporté dans cette dernière une foule d'explications semblables. Les mouvemens que détermine l'instinct dépendent, comme l'instinct lui-même, de la nature de l'être organisé chez lequel on les observe; à la naissance de l'animal, l'instinct commande en maître, il règne et veille seul à sa conservation; à mesure que le nouvel être, par l'exercice continuel des sens, acquiert des idées et fortifie sa raison, les déterminations rationnelles se mêlent aux déterminations instinctives, et prévalent enfin sur elles, chez l'homme qu'une bonne éducation fait jouir de l'entier développement de ses facultés.

Dans les diverses classes d'animaux, aux divers âges de l'homme, chez les hommes organisés de telle ou telle manière, c'est-à-dire doués de divers tempéramens, l'instinct et la raison existent dans des rapports qui varient à l'infini, depuis les zoophytes, qui, semblables aux végétaux, paroissent obéir aux sensations que produisent le sol et l'air dont ils tirent leur nourriture, jusqu'à l'homme, auquel un long exercice de sa raison a donné sur ses passions un empire plus assuré.

C'est dans cet empire exercé par la raison sur nos penchans primitifs que consiste le plus bel attribut de notre espèce ; c'est à l'étendre et à l'affermir que concourent tous les préceptes de l'éducation et de la morale. Privé de leur utile secours, entièrement asservi à ses passions brutales, l'homme se porte à la vengeance, à l'amour, avec la même impétuosité que les animaux, et descend complétement à leur niveau ; aussi maîtriser ses penchans, se vaincre soi-même, a-t-il toujours paru le plus rare effort comme le plus noble attribut de l'humanité. C'est par-là que, s'élevant au-dessus des animaux et du vulgaire, les hommes seront éternellement assurés de ravir nos hommages. Qui n'a senti plus d'une fois les larmes de l'admiration humecter ses paupières en voyant Auguste triompher du courroux le plus légitime (1), dans ces magnifiques tableaux où le

---

(1) Je suis maître de moi, comme de l'univers,
Je le suis, je veux l'être.

Cinna, acte II, scène première.

Sans les secours de la religion, tous les avantages d'un beau naturel, tous les préceptes de la philosophie peuvent-ils nous conduire à la pratique de ces hautes vertus ? Le divin auteur du christianisme, en faisant du renoncement à soi-même le fondement principal de la morale, a laissé bien loin de lui tous les philosophes de l'antiquité et des temps modernes. *Voyez* le sermon sur la montagne, cet admirable résumé de la morale évangélique.

génie du grand Corneille prête ses sublimes inspirations à ce maître de l'univers ?

Plusieurs philosophes se sont émerveillés de la prodigieuse intelligence que déploient les plus petits insectes : l'abeille, la fourmi, leur ont offert le modèle de la sagacité la plus rare et de la science la plus profonde. Pourquoi ceux dont le bonheur est d'admirer ne se récrient-ils point également sur l'intelligence avec laquelle, dans un vase où plusieurs sels sont en dissolution, un réactif, mettant en jeu une multitude d'affinités électives, au moment même où il est versé sur le mélange, décompose certaines substances pour en créer de nouvelles ? La figuration des cristaux est aussi inconcevable que la construction des alvéoles d'une ruche, dont la forme est toujours la même. Le cristal obéit à une sorte de nécessité lorsqu'il revêt la forme d'un prisme, d'un rhombe ou d'un hexaèdre ; il en est de même de l'insecte lorsqu'il construit sa loge dans des proportions qui lui paroîssent enseignées par la géométrie la plus transcendante.

Quel instinct porte le bœuf paisible à se nourrir de végétaux, et pousse au carnage le tigre sanguinaire ? Tous deux obéissent à leur organisation ; maîtresse impérieuse, elle détermine leurs goûts, leurs appétits, leurs penchans ; l'estomac débile du carnivore se rempliroit vainement d'herbages, ils ne sauroient lui fournir des élémens réparateurs.

CLIII. Un être absolument privé d'organes sensitifs n'auroit qu'une existence purement végétative; s'il acquéroit un sens, il ne jouiroit point encore de l'entendement, puisque, comme l'a prouvé Condillac, les impressions produites sur ce sens unique ne pourroient être comparées; tout se borneroit à un sentiment intérieur qui l'avertiroit de son existence, et il croiroit que toutes les choses qui l'affectent font partie de son être. Cette vérité fondamentale, si complétement développée par les métaphysiciens modernes, se trouve formellement exprimée dans les écrits d'Aristote (1) : on a lieu d'être surpris que ce père de la philosophie ne l'ait donnée que comme un simple aperçu, qu'il n'y ait pas conformé sa doctrine; mais surtout qu'elle ait été négligée par ses successeurs pendant un si grand nombre de siècles. Il est si vrai que les sensations doivent être considérées comme nous fournissant les matériaux de toutes nos connoissances, que l'entendement se mesure par le nombre et la perfection des organes des sens; et qu'en en dépouillant successivement l'être qui en est pourvu, on rabaisseroit par degrés sa nature intellectuelle; tandis que l'addition d'un

(1) *Nil est in intellectu quod non priùs fuerit in sensu : — Nisi intellectus ipse*, ajouta Leibnitz, par une restriction que certaines personnes trouvent sublime, sans faire attention que le philosophe allemand, comme tous les *idéalistes*, depuis Platon jusqu'à Kant et aux métaphysiciens de l'école d'Édimbourg, prend et donne ses abstractions pour des réalités.

nouveau sens à ceux que déjà nous possédons pourroit nous conduire à une foule d'idées et de sensations qui nous sont inconnues, nous feroit découvrir dans les objets que nous avons intérêt de connoître une multitude de nouveaux rapports, et agrandiroit de beaucoup la sphère de notre intelligence.

L'impression produite sur un organe quelconque par l'action d'un corps extérieur ne constitue pas la *sensation;* il faut, pour la compléter, que cette impression soit transmise par les nerfs au cerveau, qu'elle soit *perçue*, c'est-à-dire, ressentie par cet organe : la sensation devient alors *perception*, et cette première modification suppose, comme on le voit, l'existence d'un organe central, auquel les impressions produites sur les sens se rapportent. Les fibres cérébrales sont ébranlées avec plus ou moins de force par les sensations que renvoient tous les organes des sens frappés à la fois; et nous ne pourrions acquérir sur tous les corps qui les produisent que des notions confuses, si une perception plus forte ne faisoit taire en quelque sorte celles qui l'accompagnent, et ne fixoit l'*attention*. Dans ce recueillement de l'âme sur le même objet, le cerveau est foiblement ébranlé par plusieurs sensations qui ne laissent aucune trace : c'est pour cette raison qu'après la lecture attentive d'un livre, nous avons oublié les sensations produites par la couleur différente du papier et des caractères.

Lorsqu'une sensation est de peu de durée, la connoissance que nous en avons est si foible, que bientôt il ne nous reste aucun souvenir de l'avoir éprouvée. C'est ainsi que nous ne nous apercevons point qu'à chaque instant et chaque fois que nous clignons les paupières, nous passons des ténèbres à la lumière, et de la lumière aux ténèbres. Si nous fixons notre *attention* sur cette sensation, elle nous frappe d'une manière durable. Lorsque, pendant un temps donné, on s'est occupé de beaucoup de choses, à chacune desquelles on n'a accordé qu'une attention médiocre; lorsque, par exemple, on a lu un roman rempli d'un grand nombre d'anecdotes, dont chacune à son tour nous a intéressés, nous l'achevons sans ennui, et nous sommes étonnés du temps employé à sa lecture. C'est que les impressions successives et peu durables se sont pour la plupart effacées, que nous avons tout oublié, excepté quelques actions principales. Le temps nous doit paroître alors s'être écoulé avec rapidité; car, comme l'a très-bien dit Locke dans son Essai sur l'entendement humain, *nous ne concevons la succession des temps que par celle de nos pensées.*

Cette faculté de s'occuper long-temps et exclusivement de la même idée, de concentrer toutes ses facultés intellectuelles sur le même objet, d'accorder à sa contemplation isolée une *attention* vive et soutenue, existe à un degré plus ou moins élevé dans les différens individus; et quelques

philosophes me semblent avoir raisonnablement expliqué la différente portée des esprits, les degrés variés d'instruction dont nous sommes capables, par le degré d'attention que nous pouvons accorder aux choses qui font l'objet de notre étude.

Qui plus qu'un homme de génie s'arrête à l'examen d'une même idée, la médite plus profondément, la considère mieux sous toutes ses faces et dans tous ses rapports, lui accorde, en un mot, une attention plus grande ?

L'attention doit être considérée comme un acte de la volonté qui fixe l'organe sur la même sensation, ou même le prépare à cette sensation, pour qu'elle soit plus efficace. Regarder, c'est voir avec attention ; écouter, c'est entendre avec la même disposition ; flairer, c'est sentir attentivement une odeur ; savourer, c'est analyser l'impression gustative. Dans tous ces cas, la sensation peut être involontaire, tandis que l'attention qu'on y apporte suppose le *vouloir*. Cette distinction a déjà été judicieusement établie par rapport au toucher, qui n'est que l'exercice du tact dirigé par la volonté.

Suivant qu'une sensation, ou qu'une *idée*, qui n'est autre chose qu'une sensation transformée ou perçue par l'action de l'organe cérébral, a produit dans les fibres de cet organe une impression plus ou moins forte, le souvenir en est plus ou moins vif et durable. Ainsi nous pouvons en avoir une

réminiscence, c'est-à-dire, nous rappeler foiblement que nous avons déjà été affectés de la même manière, la *mémoire*, ou nous remémorer l'objet de la sensation avec quelques-uns de ses attributs caractéristiques, comme sa couleur, son volume, etc.

Les douleurs ressenties dans des membres qu'on n'a plus n'ont point leur siège dans la portion qui en reste; le cerveau ne se trompe point lorsqu'il rapporte au pied les souffrances qu'éprouvent les individus auxquels on a amputé la jambe ou la cuisse. J'ai actuellement sous les yeux l'exemple d'une femme et d'un jeune homme, auxquels j'ai coupé la cuisse et la jambe, pour des caries scrophuleuses, incurables par tout autre procédé, et qui duroient depuis plusieurs années. La plaie résultante de l'opération est complétement cicatrisée; le moignon n'a pas une plus grande dose de sensibilité que toute autre partie recouverte par les tégumens, puisqu'on le manie sans causer de la douleur; et cependant tous deux, par intervalles, et surtout lorsque l'atmosphère est surchargée d'électricité, se plaignent d'en ressentir, d'en éprouver dans les membres qu'ils ne possèdent plus depuis quelques mois. Ils les reconnoissent, à certains caractères, pour celles que leur causoit l'affection primitive. Ces douleurs, comme toutes les perceptions, sont bien évidemment confiées à la mémoire, qui les reproduit

lorsque l'organe cérébral répète les mouvemens qu'il exerçoit pendant la maladie

Enfin, si le cerveau est facilement excitable, et qu'en même temps il conserve fidèlement les impressions reçues, il jouit du pouvoir de se représenter les idées avec toutes leurs liaisons et tous les accessoires dont elles sont accompagnées; de les reproduire en quelque sorte en se rappelant un objet tout entier, tandis que la mémoire nous donne seulement l'idée de quelques-unes de ses qualités. Cette faculté créatrice se nomme *imagination :* si elle enfante des monstres, c'est que le cerveau pouvant *associer*, lier ensemble, combiner les idées, les reproduit dans un ordre de succession qui n'est pas naturel, les associe au gré du caprice, et donne lieu à bien des faux jugemens.

Lorsqu'on a rapproché deux idées, qu'on les *compare* et qu'on prononce sur leur analogie, on porte un *jugement.* Plusieurs jugemens liés ensemble forment un *raisonnement.* Raisonner n'est donc que juger des rapports qui existent entre les idées que les sens nous fournissent, ou que l'imagination reproduit.

Il en est des facultés de l'âme comme de celles du corps : si nous exerçons beaucoup l'organe intellectuel, il acquiert de la force et languit dans un trop long repos. Si nous n'employons que certaines facultés, elles acquièrent un grand déve-

loppement au préjudice des autres. C'est ainsi que par l'étude des mathématiques on se forme un jugement solide et des raisonnemens exacts, tandis que l'on éteint l'imagination, qui n'acquiert jamais un grand empire sans que le jugement et le raisonnement ne s'en ressentent. Les sciences descriptives occupent surtout la mémoire, et donnent rarement une grande étendue à l'esprit de ceux qui s'y livrent exclusivement; et quoique l'on naisse avec un jugement droit ou avec un esprit faux, on peut, jusqu'à un certain point, corriger à l'aide de l'éducation ces torts si fréquens de la nature.

CLIV. Condillac s'est acquis une gloire immortelle en découvrant le premier et en prouvant sans réplique que les signes sont aussi nécessaires à la formation qu'à l'expression des idées; qu'une langue n'est pas moins utile pour penser que pour parler; que, faute d'attacher à des signes convenus des notions acquises, nous n'aurions jamais que des notions isolées, incomplètes, puisque nous serions absolument privés de la faculté de les associer, de les comparer et de prononcer sur leurs rapports. C'est l'imperfection ou le manque absolu de signes propres à fixer les idées qui rend éternelle l'enfance des espèces animales. C'est à leur défaut qu'est due l'impossibilité dans laquelle est un animal de transmettre à ses descendans ou à ses semblables les fruits de l'expérience qu'il a acquise; expérience que la même raison rend extrê-

mement bornée, et restreint à quelques notions simples, à quelques idées liées directement à ses besoins et à ses facultés. Si chaque idée n'étoit point fixée par un signe, si ce moyen ne servoit point à les lier, la mémoire seroit nulle, toutes les impressions seroient effacées peu de temps après avoir été ressenties; toutes les collections d'idées seroient aussitôt dissoutes que formées (en admettant même la possibilité de cette formation), notre ignorance se perpétueroit indéfiniment, et nous vieillirions sans que notre raison eût fait aucun progrès vers son perfectionnement.

Quand nous réfléchissons sur un sujet, ce n'est point directement sur les idées, mais bien sur les mots qui les expriment que la méditation s'exerce; nous n'aurions jamais pu avoir l'idée des nombres, si nous n'avions attaché des noms distincts aux nombres isolés ou rassemblés. Locke parle de quelques Américains qui n'avoient point d'idée du nombre *mille*, parce que les mots de leur langue n'exprimoient rien au delà du nombre *vingt*. La Condamine apprend, dans sa relation, qu'il en est qui ne comptent que jusqu'à trois, et le terme (1) qu'ils emploient pour désigner ce nombre est si compliqué, d'une prononciation si longue et si difficile, que, comme Condillac l'observe, il n'est pas étonnant qu'ayant commencé d'une manière si peu commode, ils n'aient pu aller au

(1) *Poellarrarorincourac.*

delà. « Refusez, dit cet écrivain, à un esprit supé-
« rieur l'usage des caractères, combien de con-
« noissances lui sont interdites, auxquelles un
« esprit médiocre atteindroit facilement! Otez-lui
« encore l'usage de la parole, le sort des muets
« vous apprend dans quelles bornes étroites vous
« le renfermez. Enfin enlevez-lui l'usage de
« toutes sortes de signes, qu'il ne sache pas faire à
« propos le moindre geste pour exprimer les pen-
« sées les plus ordinaires, vous aurez en lui un
« imbécille. » (1)

Les voyageurs nous ont fait connoître certaines peuplades si peu avancées dans l'art des signes propres à exprimer leurs idées, qu'elles semblent servir d'intermédiaire entre les peuples policés et certaines espèces d'animaux dont l'instinct a été perfectionné par l'éducation; on pourroit même dire qu'il y a moins de différence, pour l'intelligence entre tel homme réduit à l'état d'abrutissement et d'idiotisme le plus complet, et un animal domestique, qu'entre le même homme et un autre homme d'un génie supérieur, tel que seroit Bacon, Newton ou Voltaire.

Dans un autre endroit du même ouvrage, après avoir démontré que les langues sont de véritables méthodes analytiques; que les sciences peuvent se réduire à des langues bien faites, il fait voir

---

(1) Essai sur l'origine des connoissances humaines, sect. 4.

combien est grande leur influence sur le développement des talens ; mais laissons-le parler lui-même avec cette clarté d'expressions qui fait le charme et le caractère de ses écrits : « Il en est « des langues comme des chiffres des géomètres ; « elles donnent de nouvelles vues, et étendent « l'esprit à proportion qu'elles sont plus parfaites. « Les succès de Newton ont été préparés par le « choix qu'on avoit fait avant lui des signes, et « par les méthodes de calcul qu'on avoit imagi- « nées. S'il fût venu plus tôt, il eût pu être un « grand homme pour son siècle, mais il ne feroit « pas l'admiration du nôtre : il en est de même « dans les autres genres. »

Les langues les plus pauvres se sont formées dans les contrées les plus stériles. Le sauvage qui parcourt les côtes désertes de la Nouvelle-Zélande n'a besoin que d'un petit nombre de signes pour distinguer le petit nombre d'objets qui frappent habituellement ses sens : le ciel, la terre, la mer, le feu, les coquillages, les poissons qui font sa principale nourriture, les quadrupèdes et les végétaux qui existent en petit nombre sous ce climat rigoureux sont tout ce qu'il doit nommer et connoître ; aussi son vocabulaire ne se compose-t-il que d'une très-petite quantité d'expressions, dont les voyageurs nous ont donné la liste en quelques pages. Une langue riche, habile à exprimer une foule d'objets, de sensations et d'idées, suppose un très-haut degré de civilisation chez le

peuple qui la parle. On se plaint du retour fréquent des mêmes expressions, des mêmes pensées, des mêmes images, dans les poésies ossianiques ; mais vivant au milieu des arides rochers de l'Écosse, les bardes ne pouvoient parler des choses dont rien, sur le sol qu'ils habitoient, n'étoit capable de leur fournir l'idée. La monotonie de leur langage tient à celle de leurs impressions, toujours produites par les rochers, les brouillards, les vents, les vagues de l'Océan courroucé, la triste bruyère et le pin silencieux, etc. La répétition des mêmes termes dans les livres sacrés de la religion chrétienne prouve que la civilisation n'avoit pas fait les mêmes progrès chez le peuple juif que chez les Grecs et les Romains. Le rapport qui existe entre le génie des langues et le caractère des nations ; l'influence du climat, du gouvernement et des mœurs sur le langage ; la raison pour laquelle les grands écrivains paroissent en même temps dans tous les genres, au moment où une langue arrive à son degré de perfection et de maturité, etc., etc. : voilà autant de problèmes qui se présentent, et dont la solution mériteroit de nous occuper, si elle ne nous entraînoit évidemment hors des limites de notre sujet.

Quoique Condillac ait dit, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, que toutes les opérations de l'âme ne sont que la sensation même qui se transforme différemment, que toutes ses facultés sont renfermées dans celle de sentir, la manière

dont il a analysé la pensée laisse encore beaucoup de doutes et d'incertitudes sur le véritable caractère et l'importance relative de chacune de ses facultés.

Le mérite de dissiper les nuages qui obscurcissoient encore cette partie de la métaphysique étoit réservé à M. de Tracy. Ses Élémens d'idéologie (1) ne laissent rien à désirer sur cet objet : je vais en extraire quelques résultats fondamentaux, en renvoyant, pour le reste, le lecteur à l'ouvrage.

Penser n'est que sentir, et sentir est pour nous la même chose qu'exister; car les sensations nous avertissent de notre existence. Les idées ou perceptions sont, ou des sensations proprement dites, ou des souvenirs, ou des rapports que nous apercevons, ou bien enfin des désirs que nous éprouvons à l'occasion de ces rapports : la faculté de penser se subdivise donc en sensibilité proprement dite, en mémoire, en jugement et en volonté. Sentir, à proprement parler, c'est avoir la conscience d'une impression; avoir de la mémoire, c'est sentir le souvenir d'une impression éprouvée; juger, c'est sentir des rapports entre nos perceptions; enfin, vouloir, c'est sentir des désirs. Par ces quatre élémens, *sensations*, *souvenirs*, *jugemens* et *désirs*, se forment toutes les idées com-

(1) Élémens d'idéologie, par M. le comte Destutt Tracy, pair de France.

posées. L'attention n'est qu'un acte de la volonté; la comparaison ne peut être séparée du jugement, puisqu'on ne peut comparer deux objets sans les juger : raisonner n'est qu'une répétition de l'action de juger; réfléchir, imaginer, c'est composer des idées décomposables en sensations, en souvenirs, en jugemens et en désirs. Cette espèce d'imagination, qui n'est qu'une mémoire sûre et fidèle, ne doit pas en être distinguée.

On peut donc reprocher à Condillac d'avoir seulement partagé l'intelligence de l'homme en entendement et en volonté, parce que le prémier terme renferme des choses trop disparates, telles que la sensation, la mémoire, le jugement, et d'être tombé dans un excès opposé, en multipliant trop les divisions secondaires. Toutefois on ne sauroit méconnoître les immenses services qu'a rendus Condillac à la science analytique de l'entendement, en naturalisant parmi nous la philosophie de Locke, ce véritable créateur de la psycologie. La médecine peut se glorifier d'avoir produit Locke et Cabanis : chose remarquable et pourtant naturelle; car, comme Diderot l'a dit éloquemment, « il n'appartient qu'à celui qui a pratiqué la médecine d'écrire de la métaphysique : lui seul a vu les phénomènes, la machine tranquille ou furieuse, foible ou vigoureuse, saine ou brisée, délirante ou réglée : successivement imbécille, éclairée, stupide, bruyante, muette, léthargique, vivante ou morte. »

CLV. *Altérations de la pensée.* Les philosophes arriveroient sans doute à une connoissance plus approfondie des facultés de l'entendement humain, s'ils joignoient à l'étude de leur exercice régulier et facile celle des nombreuses altérations qu'elles peuvent subir. Il ne suffit pas, en effet, pour s'en former une juste idée, de les observer lorsque l'âme est paisible et sans agitation; on doit encore les étudier dans les dérangemens qu'elles éprouvent; les voir tour à tour s'isoler ou se confondre, et se combiner sous de faux rapports; dans quelques cas, diminuer d'énergie, d'autres fois être portées à un degré d'exaltation qui ne permet d'en méconnoître ni l'importance, ni la véritable nature; et comme le plus grand nombre de nos idées nous vient du parallèle que nous savons établir entre les objets qui nous les fournissent, au milieu de ces troubles de la raison et des passions humaines, on en acquiert une notion plus complète que si on se fût contenté de les étudier dans leur état de calme et de tranquillité.

Les observations sur la manie ne sont encore ni assez nombreuses ni assez précises pour qu'on puisse classer les diverses espèces d'aliénation mentale d'après la faculté de l'entendement qui se trouve lésée dans chacune d'elles. Le professeur Pinel a néanmoins pris pour fondement de la distinction qu'il a établie entre les diverses sortes de manie les travaux des psycologistes modernes,

et fait voir que toutes pouvoient se rapporter *à* cinq espèces, qu'il désigne par les noms de *mélancolie*, de *manie sans délire*, de *manie avec délire*, de *démence* et d'*idiotisme* (1). Dans les quatre premières espèces, il y a perversion des facultés mentales, affoiblies ou exaltées. On ne doit pas chercher la cause de ces altérations dans les vices de conformation originelle; car la mélancolie, la manie avec ou sans délire, et la démence, ne se manifestent presque jamais avant la puberté. Les observateurs attestent que presque tous les maniaques le sont devenus de vingt à quarante ans; qu'un très-petit nombre a perdu la raison avant ou après cette époque orageuse de la vie, pendans laquelle les hommes, livrés tour à tour aux tourmens de l'amour ou de l'ambition, de la crainte ou de l'espérance, aux douces illusions du bonheur ou aux pénibles retours de l'infortune, consumés par le feu dévorant de leurs passions sans cesse renaissantes, souvent combattues et rarement satisfaites, voient les forces de leur intelligence diminuées, anéanties ou dégradées par cette sorte de tempête morale, justement comparée à celle qui s'élève quelquefois du sein des mers.

Nous sommes forcés de convenir que nos con-

---

(1) Pour de plus amples développemens, je ne puis que renvoyer à l'ouvrage. *Voyez* le *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale* ou *la manie*, par P. Pinel. *Paris*, 1800.

noissances sur la structure du cerveau et des nerfs sont trop bornées; que les ouvertures des cadavres de maniaques ont été trop peu nombreuses, et quelquefois faites par des médecins auxquels les circonstances minutieuses de l'organisation connue de l'organe sensitif étoient trop peu familières (1) pour qu'on puisse assurer ou nier que le dérangement de l'intellect dépende constamment d'une lésion organique, ce qui est assez probable; plusieurs faits, au moins recueillis par des observateurs qui, tels que Morgagni, méritent la plus grande confiance, autorisent à penser que la consistance du cerveau est augmentée chez quelques maniaques qui se distinguent par l'opiniâtreté la plus insurmontable, la plus invincible obstination, l'attachement le plus fort à leurs idées dominantes; qu'il est, au contraire, mollasse, aqueux, et dans une sorte de dissolution commençante chez quelques autres dont les idées incohérentes, ayant perdu la faculté de s'associer et de se transformer en jugemens, se succèdent avec rapidité, et paroissent ne laisser aucune trace; que certaines lésions organiques telles que le ramollissement du cerveau, le développement spontané de tubercules ou de tumeurs enkystées dans certains points de sa substance entraîne une altération nécessaire dans les fonctions intellectuelles.

---

(1) Ce reproche s'applique surtout aux recherches du docteur Greding,

Si, dans un petit nombre de maniaques, l'organe de l'entendement n'éprouve et ne présente que d'imperceptibles altérations, il en offre de bien remarquables chez les *idiots*. L'oblitération presque complète des facultés intellectuelles, qui fait le caractère de l'idiotisme, lorsqu'elle n'a pas pour cause une commotion forte et subite, une émotion inattendue et profonde qui brise tout à coup les ressorts de la pensée, lorsqu'elle est un vice originel, tient toujours à la mauvaise conformation du crâne, à la gêne des organes qui y sont renfermés. Ces défauts d'organisations se rapportent, comme M. Pinel l'observe, à la petitesse excessive de la tête, relativement à la stature entière, ou au manque de proportions entre les diverses parties du crâne. C'est ainsi que dans l'idiot, dont la tête se trouve gravée dans l'ouvrage sur la manie (*pl.* 2, *fig.* 6), elle n'a en hauteur que le dixième de la stature entière, tandis que cette hauteur devroit en être le septième, plus trois parties et demie, en prenant l'Apollon du Belvédère pour le type de la perfection idéale de l'homme. Un idiot, que j'ai actuellement sous les yeux, a l'extrémité occipitale de la tête tellement rétrécie, que la grosse extrémité de l'ovale que présente sa face supérieure, au lieu de se trouver en arrière comme dans le reste des hommes, est au contraire tournée en avant, et répond au front, qui est d'ailleurs très-incliné des orbites vers le sinciput. Le diamètre vertical du crâne est très-

peu considérable. La tête, ainsi raccourcie de haut en bas, est très-aplatie sur les côtés. Les mains et les pieds sont très-petits, et souvent froids; les parties génitales sont, au contraire, extrêmement développées.

Dans deux autres enfans, également idiots, et qui se trouvent actuellement à l'hôpital Saint-Louis, le crâne, très-large en arrière, finit par une extrémité très-rétrécie; et le front, très-court, n'a pas plus de deux pouces et demi de largeur, en mesurant du processus demi-circulaire qui borne en haut la fosse temporale d'un côté, au commencement de la même crête, saillante sous la peau du côté opposé. Le développement des parties génitales n'est pas moins remarquable: elles ont, dans ces deux individus, dont l'un a dix, l'autre douze ans, aussi-bien que chez celui dont nous avons parlé précédemment, et qui a quatorze ans, un volume plus considérable que celui qu'elles présentent ordinairement après la manifestation de la puberté. Rien n'annonce que cette époque soit arrivée pour les idiots dont il vient d'être question.

Le même développement s'observe d'une manière encore plus marquée chez les crétins du Valais, idiots (par suite d'une organisation foible et dégradée) enclins à la plus sale lubricité et aux masturbations les plus fréquentes.

Cette espèce d'opposition entre l'énergie relative de l'organe intellectuel et du système repro-

ducteur, entre le développement du cerveau et celui des parties génitales, est un phénomène qui doit piquer vivement la curiosité et appeler l'attention des physiologistes. Qui ne connoît cette énervation de l'entendement, cet affoiblissement à la fois intellectuel et physique, sorte de dégradation morale qui suit les jouissances de l'amour, pour peu qu'on ait dépassé les bornes d'une scrupuleuse modération ? La castration modifie le caractère moral des hommes et des animaux, au moins aussi puissamment que leur organisation physique, comme l'a prouvé Cabanis, en traitant de l'influence des sexes sur l'origine et le développement des facultés morales et intellectuelles (1).

CLVI. Le physique retient donc le moral sous une dépendance étroite et nécessaire ; nos vices et nos vertus, quelquefois produits et souvent modifiés par l'éducation sociale, sont fréquemment aussi des résultats de l'organisation. Aux preuves démonstratives qu'a données de l'influence du physique sur le moral de l'homme le philosophe que je viens de citer, et qui fait tant d'honneur à la médecine, je me permettrai d'ajouter une seule observation : ce n'est point, j'en suis bien sûr, la première de cette espèce ; mais personne, à ce que je crois, n'en a publié de sembla-

(1) Des Rapports du physique et du moral de l'homme 2 vol. in-8°.

bles. Le lecteur se rappelle sans doute la vieille femme dont il est parlé à l'article des mouvemens du cerveau, qu'une carie énorme des os du crâne permettoit de constater sur elle. J'abstergeois le pus sanieux qui couvroit la dure-mère, et je faisois en même temps des questions à la malade sur son état; comme elle n'éprouvoit point de douleur de la compression de la masse cérébrale, j'appuyai le tampon de charpie, je pressai légèrement dans une direction perpendiculaire, et tout à coup la malade, qui répondoit sainement à mes demandes, se tut au milieu d'une phrase; sa respiration continuoit cependant de s'effectuer, son pouls battoit encore; je retirai le tampon, la malade ne dit rien; je lui demandai si elle se rappeloit la dernière question que je lui avois adressée; elle m'affirma la négative. Voyant que cette expérience étoit sans douleur et sans danger, je la réiterai trois fois, et suspendis trois fois tout sentiment et toute intelligence.

Un homme trépané pour une fracture du crâne avec épanchement de sang et de pus sur la dure-mère sentoit ses facultés intellectuelles baisser, le sentiment de son existence s'engourdir, et menacer de s'éteindre dans l'intervalle de chaque pansement, à mesure que la collection du liquide devenoit plus considérable.

Des observations chirurgicales sur les plaies de tête renferment plusieurs faits qu'on pourroit rapprocher des observations précédentes. Il n'est

personne qui, ayant éprouvé une syncope plus ou moins prolongée, ne sache que cet état est sans malaise, sans douleur, et ne laisse après lui aucune conscience de ce qui s'est passé pendant sa durée. Il en est de même à la suite d'une apoplexie, d'un accès d'épilepsie, etc., etc.

L'histoire des tempéramens nous fournit trop d'exemples de l'étroite connexion qui existe entre l'organisation physique et les facultés intellectuelles et morales, pour que nous croyions devoir nous arrêter davantage sur cette vérité, dont on ne sauroit nier la certitude, mais qu'aucun philosophe n'a encore poussée dans toutes ses conséquences.

CLVII. Un auteur anglais (1), dans un ouvrage consacré à l'histoire de l'aliénation mentale, a tracé, mieux qu'on ne l'avoit fait jusqu'à lui, l'histoire physiologique des passions humaines, qu'il envisage comme de simples résultats de l'organisme, en les plaçant parmi les phénomènes de l'économie animale, et en faisant abstraction de toute idée morale qui peut s'y rattacher.

Toute passion a pour objet la conservation de notre individu et la reproduction de notre espèce. On peut donc, comme les fonctions elles-mêmes, les partager en deux grandes classes. A la seconde se rapporteront également l'amour paternel, la tendresse maternelle, et toutes les affections qui

(1) An Inquiry into the nature and origin of mental derangement, etc. Lond., 1798, 2 vol. in-8°.

ont pour objet la protection de notre race pendant sa trop longue enfance.

Mais Chrichton, comme le plus grand nombre des métaphysiciens et des physiologistes, nous paroît avoir mal déterminé le sens que l'on doit attacher au mot *passion*. Lorsqu'il donne ce nom à la faim, sensation intérieure et pénible, source d'un grand nombre de déterminations de toute espèce, puissant mobile de l'homme dans l'état sauvage et civilisé; à l'anxiété qui suit la respiration d'un air trop peu riche en oxigène, à l'impression qui résulte du froid ou du chaud excessifs, à la sensation incommode que fait éprouver la rétention des urines et des matières fécales accumulées, au sentiment de lassitude et de fatigue qui suit un violent exercice, etc., etc, il confond les sensations et les besoins avec les passions et les désirs dont ils sont l'origine.

Nos besoins, nos appétits, nos goûts, nos passions sont du domaine de l'instinct; ils dérivent, comme lui, de notre organisation : retranchez un organe, vous diminuez la somme des besoins, vous privez d'un appétit l'animal que vous mutilez : c'est ce que produit la castration sur l'animal ou sur l'homme qui l'ont subie de bonne heure. S'il étoit possible de rendre un carnivore capable de digérer des végétaux, vous changeriez ses goûts et ses mœurs; avec l'âge naissent et meurent en nous certains organes. En même temps et dans la même mesure se montrent, se dévelop-

pent et s'éteignent certaines passions : affoiblissez par des saignées copieuses et multipliées ce guerrier intrépide qui brava la mort dans vingt batailles, vous en faites un homme foible et pusillanime. Vainement son crâne vous offre-t-il alors la bosse sous laquelle il a plu au docteur Gall de loger la bravoure.

Une diète rigoureuse produira le même effet, pour peu qu'elle soit prolongée. L'armée prussienne, dispersée à Jéna par nos intrépides légions, étoit depuis plusieurs jours réduite au pain et à l'eau pour toute nourriture, encore le premier étoit-il de mauvaise qualité, et en si petite quantité, qu'il ne pouvoit apaiser la faim. Je tiens ce fait d'un témoin oculaire et véridique.

L'armée nombreuse qui vient d'échouer dans une entreprise importante (1813) manquoit de pain depuis six jours (1). Loin de moi l'idée de vouloir affoiblir par ces remarques la gloire du vainqueur; seulement il est bien prouvé, par plus d'un exemple fameux, que, toutes choses égales d'ailleurs, entre des troupes à jeun et des soldats bien repus, la victoire ne sauroit être long-temps indécise.

Le besoin dérive de l'organisation : il en est la conséquence immédiate ; il décide à son tour l'appétit, véritable élément de la passion. L'étymologie du mot *passion*, formé du verbe latin *pati*,

---

(1) *Voyez* le Moniteur, 9 septembre 1813.

souffrir, indique cette origine de l'état qu'il exprime.

C'est pour échapper aux besoins extrêmes dont une prévoyance attentive entrevoit de loin la possibilité; c'est pour satisfaire à tous les besoins factices, nés de l'état social et de la civilisation, que les hommes se condamnent à ces agitations dont les honneurs, la célébrité, la richesse, la puissance, sont le terme incertain. Les passions n'ont pas encore été analysées avec le même soin que les idées; on n'a point encore justement apprécié les différences qui existent, sous le rapport de leur nombre et de leur énergie, entre l'homme dans l'état sauvage et l'homme qui vit dans les pays où la civilisation et les lumières ont fait les plus grands progrès.

Comme l'état habituel de l'estomac, du poumon, du foie et des organes intérieurs, se lie à de certains ordres d'idées; comme toute affection vive, de joie ou de chagrin, de plaisir ou de douleur, fait éprouver un sentiment d'anxiété dans la région précordiale, trouble qui semble le produit d'une commotion plus ou moins vive, les anciens plaçoient dans les viscères le siége des passions de l'âme; ils mettoient le courage dans le cœur, la colère dans le foie, la joie dans la rate, etc. Bacon et Vanhelmont l'établissoient dans l'estomac; Lecat dans les plexus nerveux; d'autres physiologistes dans les ganglions du grand sympathique, etc. Mais n'a-t-on point confondu l'effet avec la cause,

l'*appétit* avec la *passion* à laquelle il dispose? Les appétits, d'où naissent les passions, résident dans les organes; ils ne supposent que des déterminations instinctives, tandis que la passion entraîne l'idée d'un travail intellectuel. Ainsi l'accumulation de la semence dans les poches qui lui servent de réservoir excite l'appétit vénérien, bien distinct de la passion de l'amour, quoique souvent il en soit la cause déterminante. Les animaux n'ont guère que l'appétit, qui diffère autant de la passion que l'instinct de l'intelligence. On ne doit cependant point considérer le cerveau comme le siége primitif des passions (1), ainsi que le fait le plus grand nombre. De tous les sentimens de l'homme, le plus durable, le plus saint, le plus passionné, le moins susceptible d'être altéré par tous les préjugés de l'état social, l'amour maternel n'est sûrement pas le résultat de quelque combinaison intellectuelle, de quelque action cérébrale; c'est dans les *entrailles* qu'il prend sa source; il vient de là, et les plus grands efforts de l'imagination ne peuvent y conduire celles qui n'ont pas joui du bonheur d'être mères.

---

(1) Si l'on analysoit avec soin les passions, il faudroit distinguer celles qui sont communes à tous les hommes, qui tiennent à nos besoins physiques, à notre nature, de certains travers de l'esprit que l'on a honorés du nom de *passions*, comme l'avarice, l'ambition, etc.; faux calculs qui devroient être rapportés aux dérangemens de l'intellect, et se classer parmi les diverses espèces de manies.

Toute passion naît du désir, et suppose l'exaltation plus ou moins grande des facultés intellectuelles. Les nuances que peuvent offrir les passions sont infinies; on pourroit les ranger toutes d'après une échelle systématique, dont le sang-froid occuperoit la partie inférieure, et la fureur maniaque le degré le plus élevé. Il est aussi impossible de concevoir un homme sans passions qu'un homme sans désirs; néanmoins on nomme passionnés ceux dont la volonté s'élève avec force vers le même objet vivement souhaité. Dans le délire des passions, nous portons à chaque instant, et sans nous en apercevoir, des jugemens faux, dont l'exagération est le caractère. Un homme vivement effrayé rit lorsqu'il est revenu de l'objet de sa terreur. Voyez cet amant chez lequel la passion est éteinte; revenu des charmes qui longtemps le captivèrent, toutes les perfections dont l'objet de son amour lui sembloit comblé se sont évanouies; le prestige enchanteur est dissipé; peu s'en faut qu'il ne croie que cet objet n'est plus le même, tandis que lui seul a changé; semblable à ces maniaques qui, revenus à la raison, s'étonnent des extravagances qu'ils ont commises pendant leur délire, et peuvent à peine ajouter foi à ce qu'on leur en raconte. L'homme ambitieux se nourrit des illusions de la richesse ou de la puissance. Celui qui hait voit des crimes dans les fautes les plus légères de l'objet de sa haine, et s'en exagère les moindres défauts.

Les *affections* de l'âme ou les passions, soit qu'elles viennent par les sens, soit qu'une disposition quelconque des organes vitaux en favorise la naissance et le développement, peuvent être rangées sous deux classes générales, relativement aux effets qu'elles produisent sur l'économie. Les unes augmentent l'activité organique : telles sont la joie, le courage, l'espérance et l'amour. D'autres, au contraire, ralentissent les mouvemens vitaux, comme la crainte, la tristesse et la haine. D'autres enfin produisent ces deux effets contraires, alternativement ou à la fois; c'est ainsi que l'ambition, la colère, le désespoir, la pitié revêtant, comme les autres passions, un nombre infini de nuances, selon l'intensité de leurs causes, la constitution individuelle de ceux qu'elles agitent, leur sexe, leur âge, etc., tantôt accroissent, d'autres fois diminuent l'action vitale, abattent ou relèvent les forces des organes.

Les exemples qui constatent la puissante influence des passions sur l'économie animale sont trop nombreux pour qu'il soit nécessaire d'en rapporter; les écrivains de tous les genres en contiennent qui prouvent que l'excès du plaisir comme l'excès de la douleur, une joie trop subite ou trop vive, comme un chagrin trop profond et trop inattendu, peuvent donner lieu aux accidens les plus funestes, et même à la mort. Sans rassembler ici toutes les observations de ce genre dont les livres fourmillent, bornons-nous à renvoyer à

ceux qui en ont recueilli le plus grand nombre sous le même point de vue, comme Haller, dans sa grande physiologie; Tissot, dans son traité des maladies des nerfs; Lecamus, dans son livre sur les maladies de l'esprit; Bonnefoy, dans un mémoire sur les passions de l'âme, inséré dans le tome v du Recueil des prix décernés par l'académie royale de chirurgie.

Les effets des passions, pour être constans, n'en sont pas moins, pour la plupart, inexplicables. Comment et pourquoi la colère donne-t-elle naissance à la rage, à des suppressions d'urine, à des morts subites? comment la frayeur détermine-t-elle la paralysie, les convulsions, l'épilepsie, etc.? pourquoi une joie excessive, un sentiment agréable porté à l'extrême, produisent-ils des accidens aussi funestes que les affections tristes et désagréables? De quelle manière un rire forcé peut-il conduire à la mort? Un excès de rire fit périr le peintre Zeuxis et le philosophe Chrysippe, au rapport de Pline. On convertissoit, sous Louis XIV, les réformés des Cévennes en les liant sur un banc, et en chatouillant la plante de leurs pieds, jusqu'à ce que, vaincus par cette torture, ils abjurassent leur croyance; un grand nombre mourut au milieu des convulsions et du rire forcé que ce chatouillement provoquoit. Cent volumes ne suffiroient point pour retracer tous les effets des passions sur l'homme physique; combien donc en faudroit-il pour les suivre dans leur influence

sur le moral, dans leur origine obscure, dans leurs caractères indéfiniment variés, dans leurs nuances fugitives, et dans tous les degrés de leur développement!

La physiologie a pour objet la connoissance des fonctions qu'exerce l'homme physique; l'étude de la plus belle partie de nous-mêmes, de ces facultés merveilleuses par lesquelles notre espèce l'emporte sur tout ce qui a mouvement et vie; en un mot, la connoissance de l'homme moral et intellectuel est du domaine de cette science, tour à tour désignée par les noms de *métaphysique*, de *psycologie*, d'*analyse de l'entendement*, mais auquel celui d'*idéologie* ou de *science des idées*, employé par les écrivains de nos jours, semble mieux convenir. On peut consulter avec avantage, sur cette science, les ouvrages philosophiques de Platon et d'Aristote, parmi les anciens; de Bacon, Hobbes, Descartes, Leibnitz, Mallebranche, Locke, Condillac, Bonnet, Smith, Reid, Dugald-Stéwart, Cabanis, Tracy et Laromiguière, parmi les modernes.

CLVIII. *Sommeil et veille.* Les causes d'excitation auxquelles nos organes sont soumis durant la veille tendent à en accroître progressivement l'action; les battemens du cœur, par exemple, sont bien plus fréquens le soir que le matin, et ce mouvement, graduellement accéléré, seroit bientôt porté à un degré d'activité incompatible avec la conservation de la vie, si le sommeil ne modéroit chaque jour cette force d'action, et ne la ra-

menoit au terme convenable. La fièvre naît des veilles prolongées; et dans toutes les maladies aiguës, l'exacerbation survient vers le soir: le sommeil de la nuit rabaisse les forces trop exaltées; mais cet état de l'économie animale, si salutaire et si désirable dans toutes les affections sthéniques, est moins utile que pernicieux dans les maladies dont un extrême affoiblissement constitue le principal caractère. L'adynamie se déclare presque toujours le matin dans les fièvres putrides, et les pétéchies, symptôme d'une grande débilité, paroissent durant le sommeil. Il favorise aussi l'établissement et les progrès des gangrènes; et c'est un fait de clinique bien observé: dans tous les cas que nous venons de citer, le sommeil n'améliore pas l'état des malades; chose facile à concevoir, puisqu'il ne fait qu'ajouter à la débilité accidentelle, caractère essentiel de la maladie, l'affoiblissement, qui fait aussi son principal caractère.

Le sommeil, cette interruption momentanée dans la communication des sens avec les objets extérieurs, peut être défini le repos des organes des sens et des mouvemens volontaires. Pendant le sommeil, les fonctions intérieures ou assimilatrices s'exécutent; la digestion, l'absorption, la circulation, la respiration, les sécrétions, la nutrition, s'opèrent, les unes, comme l'absorption et la nutrition, avec plus d'énergie que pendant la veille, tandis que les autres sont manifestement ralenties. Durant le sommeil, le pouls est plus

lent et plus foible, les inspirations sont moins fréquentes, la transpiration insensible, les urines et toutes les autres humeurs émanées du sang sont séparées en moindre quantité. L'absorption est, au contraire, fort active; de là le danger de s'endormir au milieu d'un air insalubre. On sait que les effluves marécageux qui rendent si malsaine la campagne de Rome, occasionent presque infailliblement des fièvres intermittentes lorsqu'on y passe la nuit, tandis que les voyageurs qui la traversent sans s'y arrêter n'en ressentent aucune atteinte.

Le corps humain présente assez bien l'image des forces centripètes et centrifuges de l'ancienne physique. Le mouvement de plusieurs des systèmes qui entrent dans sa structure est dirigé du centre à la circonférence; c'est une véritable exhalation qui pousse au dehors les produits de la destruction perpétuelle des organes; telle est l'action du cœur, des artères et de toutes les glandes sécrétoires. D'autres actions se dirigent, au contraire, de la circonférence vers le centre; et c'est par leur moyen que nous puisons sans cesse dans les alimens qui sont introduits dans nos voies digestives, dans l'air qui pénètre dans nos poumons et enveloppe la surface de notre corps, les élémens de son accroissement et de sa réparation. Ces deux mouvemens, à direction opposée, se balancent continuellement, dominent tour à tour, suivant l'âge, le sexe, le sommeil ou la veille. Pendant le

sommeil, les mouvemens se portent de la périphérie vers le centre (1); et si les organes qui nous mettent en rapport avec les objets du dehors se reposent, les parties intérieures travaillent avec plus d'avantage (2). Un homme âgé de quarante ans, atteint d'une sorte d'imbécillité, séjourna pendant environ dix-huit mois à l'hôpital Saint-Louis pour la curation de quelques glandes scrofuleuses. Pendant ce long espace de temps, il restoit constamment au lit, dormant les cinq sixièmes de la journée, tourmenté par une faim dévorante, et passant à manger ses courts instans de veille : ses digestions étoient toujours promptes et faciles; il conservoit de l'embonpoint, quoique l'action musculaire fût extrêmement lauguissante, le pouls très-lent et très-foible. Dans cet individu, qui, pour parler le langage de Bordeu, vivoit sous l'empire de l'estomac, les affections morales étoient bornées au désir des alimens et du repos. Dominé par une paresse insurmontable, ce n'étoit jamais sans de grandes difficultés qu'on parvenoit à lui faire prendre le plus léger exercice.

La veille peut être considérée comme un état d'effort et de dépense considérable du principe sensitif et moteur, par les organes de nos sensations et de nos mouvemens. Ce principe eût été bientôt épuisé par cette effusion non interrompue,

---

(1) *Motus in somno intrò vergunt.* Hipp.

(2) *Somnus labor visceribus.* Id.

si de longs intervalles de repos n'eussent favorisé sa réparation. Cette interruption dans l'exercice des sens et des mouvemens volontaires présente une durée relative à celle de leur exercice. Nous avons déjà dit qu'il est des fonctions tellement essentielles à la vie, que leurs organes doivent avoir des momens de repos très-courts; mais ces intervalles sont tellement rapprochés, que le temps se trouve partagé en deux moitiés presque égales, dont l'une appartient au repos, tandis que l'autre répond à l'état d'activité. Les fonctions qui entretiennent nos rapports avec les objets qui nous environnent doivent être capables de persister pendant un certain temps dans un état d'activité soutenue; car on prévoit suffisamment combien eussent été imparfaites des relations à chaque instant interrompues : leur repos, qui constitue le sommeil, est également continu et prolongé.

La durée du sommeil est généralement du quart au tiers de la journée; on ne dort guère moins de six heures et plus de huit. Les enfans dorment néanmoins davantage, et d'autant plus qu'ils sont plus près du terme de leur naissance; les vieillards, au contraire, ne jouissent que d'un sommeil court, léger interrompu; comme dit à ce sujet Grimaud, si, selon l'idée de Stahl, les enfans pressentoient que, dans la longue carrière qu'ils doivent parcourir, ils ont assez de temps pour déployer librement les actes de la vie, et que les vieillards, près de leur fin, sentissent la

nécessité de précipiter la jouissance d'un bien qui leur échappe.

Si le sommeil de l'enfant est si long, si profond et si tranquille, cela doit être attribué à la prodigieuse activité des fonctions assimilatrices, et peut-être à l'habitude qu'il a du sommeil, puisque cet état est celui dans lequel il a passé les neuf premiers mois de sa vie, ou tout le temps qui a précédé sa naissance. Dans un âge avancé, les fonctions intérieures languissent; leurs organes n'appellent point l'attention du principe de la vie : le cerveau est d'ailleurs tellement surchargé d'idées acquises, qu'il est presque toujours éveillé par elles. Les animaux carnivores dorment plus longtemps que les herbivores, parce que, dans les instans de veille, ils exercent plus de mouvemens, et peut-être encore parce que les substances animales dont ils se nourrissent contenant plus de particules nutritives sous le même volume, ils ont besoin d'un temps moins long pour dévorer leurs alimens et pourvoir à leur subsistance.

Le sommeil est un état essentiellement distinct de la mort, à laquelle quelques auteurs l'ont faussement assimilé (1) : il ne fait que suspendre cette

---

(1) Dire que le sommeil est l'image de la mort, que les végétaux dorment sans cesse, c'est se servir d'expressions qui manquent de justesse et d'exactitude. Comment les plantes, qui n'ont ni cerveau ni nerfs, qui manquent des organes des sens, des mouvemens et de la voix, peuvent-elles jouir du

portion de la vie dont le but est d'entretenir avec les objets du dehors un commerce nécessaire à notre existence. On peut dire que le sommeil établit la division la plus naturelle des phénomènes de la vie ; et l'on a lieu de s'étonner que les physiologistes aient si long-temps suivi l'ancienne division des fonctions en *vitales*, *animales* et *naturelles*, tandis que l'état de sommeil leur en fournissoit une analyse à la fois si simple et si exacte. Les organes des sens et des mouvemens, las d'agir, se reposent par le sommeil ; mais plusieurs circonstances favorisent cette cessation de leur exercice. Si l'on excite continuellement les organes des sens, on les entretiendra dans une veille constante : l'éloignement des causes matérielles de nos sensations tend donc à nous plonger dans les bras du sommeil ; c'est pourquoi on le goûte mieux dans le silence et dans l'obscurité des nuits (1). Nos organes s'endorment successivement ; l'odorat, le goût et la vue sont inactifs, lorsque l'ouïe et le toucher nous

---

sommeil, qui n'est autre chose que le repos d'organes dont elles sont complétement privées ?

(1) Le tissu des paupières n'est pas tellement opaque, que nous ne puissions, à travers leur épaisseur, distinguer la lumière des ténèbres ; c'est ce qui fait qu'un flambeau allumé dans un appartement nous empêche de nous endormir. Par la même raison, le jour qui succède à la nuit est une cause du réveil, car, malgré la clôture exacte des paupières, lumière peut encore agir sur le globe de l'œil.

transmettent encore de foibles impressions. Les perceptions confuses finissent par disparoître ; les sens intérieurs cessent d'agir, aussi-bien que les muscles destinés aux mouvemens volontaires, dont l'action est entièrement subordonnée à celle du cerveau.

Le sommeil est un état, sinon tout-à-fait passif, au moins dans lequel l'activité du plus grand nombre des organes est singulièrement diminuée, et celle de quelques-uns complétement suspendue. C'est donc à tort que certains auteurs ont considéré cet état négatif comme un phénoméne actif, et l'ont envisagé comme une fonction de l'économie vivante ; ce n'est qu'un mode ou manière d'être. Vainement a-t-on prétendu qu'il falloit, pour dormir, un certain degré de force. Les fatigues excessives n'empêchent le sommeil que par le sentiment douloureux qu'elles laissent dans tous les muscles, sentiment qui devient une nouvelle cause d'excitation pour le cerveau, qu'il tient éveillé jusqu'à ce que le repos l'ait complétement dissipé.

On a voulu assigner la cause prochaine du sommeil. Les uns ont dit que cet état tenoit à l'affaissement des lames du cervelet, qui, selon eux, sont redressées pendant la veille ; et ceux-là s'appuient sur l'expérience, qui consiste à comprimer le cervelet d'un animal vivant pour le faire aussitôt dormir. Ce sommeil, comme celui que procure la compression de toute autre partie de la masse

cérébrale, est un état vraiment maladif : il n'est pas plus naturel que l'apoplexie. D'autres, croyant sans doute le sommeil analogue à cette dernière affection, le font dépendre du transport des humeurs vers le cerveau pendant la veille. Cet organe, disent-ils, comprimé par le sang qui obstrue ses vaisseaux, tombe dans un véritable engourdissement. Cette opinion est aussi peu fondée que la précédente. Tant que les humeurs se dirigent en abondance vers l'organe cérébral, elles l'entretiennent dans un état d'excitement qui n'est point du tout favorable au sommeil. Ne sait-on pas qu'il suffit d'être fortement occupé de quelque idée, d'être vivement affecté d'un objet quelconque pour qu'on ne puisse en goûter les douceurs ? Le café, les spiritueux, pris en petite quantité, causent l'insomnie en excitant les forces circulatoires, en déterminant vers le cerveau un afflux de sang plus considérable. Tout ce qui peut, au contraire, détourner ce fluide vers un autre organe, comme les saignées abondantes, les bains de pieds, les purgatifs, la digestion, la copulation, un froid extérieur très-vif, ou qui diminue la force avec laquelle il y est poussé, comme l'ivresse, la débilité générale, influe puissamment sur le sommeil; aussi observe-t-on que la masse cérébrale s'affaisse pendant sa durée; preuve que la quantité du sang qui s'y porte se trouve notablement diminuée.

Les organes des sens, successivement endormis, s'éveillent de la même manière; les sons et la

lumière produisent des impressions, d'abord confuses, sur les yeux et sur les oreilles; bientôt ces sensations deviennent plus distinctes; nous flairons les odeurs, nous goûtons les saveurs, nous apprécions les corps par le toucher. Les organes de nos mouvemens se préparent à entrer en action, puis nous transportent où notre volonté les dirige (1). Les causes du réveil agissent en déterminant une plus grande affluence du sang vers le cerveau; elles embrassent tout ce qui peut émouvoir les sens, comme le retour du bruit et de la lumière, avec le lever du soleil : elles agissent quelquefois au dedans de nous. C'est ainsi que les urines, les matières fécales et les autres liqueurs accumulées dans leurs réservoirs les irritent par leur présence, et propagent vers le cerveau un ébranlement qui concourt à dissiper le sommeil. L'habitude a encore sur ce phénomène, comme sur toutes les actions qui se passent dans le système nerveux et sensible, la plus remarquable influence. Plusieurs personnes goûtent le repos au milieu d'un bruit éclatant, qui d'abord les empêchoit de s'y livrer. Quelque besoin qu'il eût de dormir plus long-temps, un homme qui a fixé l'heure journalière de son réveil, se réveille chaque jour à la même heure. Il est également subordonné à la puissance de la volonté; il suffit de le vouloir

(1) *Voyez* au chapitre *des Mouvemens*, art. CLX.

fortement, pour s'arracher au sommeil à une heure déterminée.

CLIX. *Songes, somnambulisme.* Quoique le sommeil suppose le repos parfait des organes des sensations et des mouvemens, il est assez rare d'en jouir dans toute sa plénitude : l'homme qui dort du sommeil le plus calme et le plus profond se réveille rarement dans la position qu'il avoit au moment où il s'est endormi ; il en a changé plusieurs fois dans son sommeil, ce qui suppose qu'excité par des sensations obscures, il a exécuté divers mouvemens tout-à-fait comparables à ceux qu'exécute le fœtus au sein de sa mère. Plus souvent encore plusieurs fonctions intellectuelles s'exerçant, divers mouvemens volontaires s'accomplissent ; ce qui établit des états intermédiaires entre le sommeil et la veille, de véritables sensations mixtes, qui tiennent plus ou moins de l'un ou de l'autre. Supposons, par exemple, que l'imagination reproduise dans le cerveau (1) des sensations qu'il a autrefois éprouvées, l'intellect travaille, associe et combine des idées, souvent disparates, et quelquefois naturelles ; enfante des monstres horribles, bizarres et ridicules ; nous fait éprouver la joie, l'espérance, la tristesse, la surprise ou l'ef-

(1) Les songes ne forment des choses en dormant que dans le moule que les pensées ont fait en veillant. (*Voyages* de Chardin, *Description des sciences*, ch. 12, *de la Morale.*

froi ; et toutes ces idées, toutes ces passions se représentent quand nous sommes éveillés, et laissent après elles un souvenir plus ou moins distinct, qui ne nous permet pas de douter que le cerveau n'ait réellement agi pendant le repos des sens et des organes moteurs. On a donné le nom de *songes* à ces phénomènes. Quelquefois nous parlons en rêvant, et cet état nous rapproche un peu plus de la veille, puisqu'à l'action du cerveau se joint celle des organes de la voix et de la parole. Enfin toutes les fonctions relatives peuvent s'exercer, à l'exception des sens extérieurs. Le cerveau n'agit et ne détermine l'action des organes et des mouvemens, de la voix et de la parole, qu'en conséquence des impressions antérieures ; et cet état qui ne diffère de la veille que par l'inactivité des sens, se nomme *somnambulisme.*

On raconte à ce sujet des choses surprenantes. On a vu des somnambules se lever, se vêtir, sortir de la maison en ouvrant et en refermant soigneusement toutes les portes, bêcher au jardin, tirer de l'eau d'un puits, tenir des discours raisonnables et suivis, retourner au lieu de leur repos, puis se réveiller, sans conserver aucun souvenir de tout ce qu'ils avoient fait et dit pendant leur sommeil. Cet état est toujours bien dangereux ; car, ne se conduisant que d'après les impressions reçues durant la veille, les somnambules ne sont point avertis par leurs sens des choses qui menacent leur existence ; ils ne peuvent éviter aucun des

dangers qui se trouvent sous leurs pas. Aussi les voit-on fréquemment se jeter par les fenêtres de leur appartement, ou tomber des toits sur lesquels ils montent, sans être pour cela plus habiles à s'y tenir, comme le croit le vulgaire, toujours ami du merveilleux. Toutefois ce préjugé populaire est loin d'être dépourvu de tout fondement. L'ignorance du danger donne aux somnambules une assurance qui les préserve des accidens, lesquels arriveroient infailliblement s'ils étoient éveillés. L'homme dont la tête est la plus forte, c'est-à-dire, la moins sujette aux étourdissemens, ne pourra rester un moment au bord d'un précipice et y fixer ses regards que bientôt il ne se trouble, chancelle et tombe : tous les observateurs parlent des graves inconvéniens qu'il y a de réveiller un somnambule lorsqu'il s'est mis dans une situation périlleuse.

Quelquefois un organe des sens reste ouvert aux impressions des corps qui l'affectent : l'on peut alors diriger à volonté le travail intellectuel. C'est ainsi que l'on fait converser sur telle ou telle matière celui qui parle en rêvant, et qu'on lui arrache l'aveu de ses plus secrètes pensées. Ce fait peut être donné en preuve des erreurs des sens, et du besoin que nous avons de les corriger les uns par les autres.

La disposition des organes influe sur la nature des choses dont on s'occupe pendant les songes. La surabondance de la liqueur séminale suggère

des songes licencieux; dans les cachexies pituiteuses, les malades rêvent à des objets dont la teinte ressemble à celle de leurs humeurs. C'est ainsi que l'hydropique ne voit qu'eaux et fontaines, tandis que, pour l'homme atteint d'une affection inflammatoire, tous les corps paroissent teints en rouge, c'est-à-dire, de la couleur du sang, qui est l'humeur prédominante.

La digestion difficile trouble le sommeil. Que l'estomac trop plein d'alimens empêche l'abaissement du diaphragme, la poitrine se dilate avec peine; le sang, qui ne peut traverser les poumons, stagne dans les cavités droites du cœur, de là naît un sentiment pénible; il nous semble qu'un poids énorme accable la poitrine et va nous suffoquer; nous nous réveillons en sursaut pour nous soustraire à un si pressant danger : c'est ce qu'on nomme l'*incube*, affection qui peut reconnoître d'autres causes, un hydrothorax, par exemple, mais qui dépend toujours du passage difficile du sang à travers les poumons.

Les facultés intellectuelles exercées pendant les songes peuvent nous conduire à certains ordres d'idées auxquels nous n'avions pu atteindre durant la veille.

C'est ainsi que des mathématiciens ont achevé pendant leur sommeil les calculs les plus compliqués, et résolu les problèmes les plus difficiles. On conçoit que, dans le sommeil des sens externes, le centre sensitif doit être tout entier aux combi-

naisons des idées, et les opérer avec plus d'énergie. Il est rare que l'influence de l'imagination sur les organes génitaux durant l'état de veille soit portée au point de provoquer seule l'émission de la semence; rien n'est plus commun pendant le sommeil, dans les songes érotiques.

L'espèce humaine n'est pas la seule qui pendant le sommeil éprouve ce genre d'agitations que l'on comprend en général sous le nom de *rêves :* ces phénomènes s'observent aussi chez les animaux, qui y sont d'autant plus soumis, que leur nature est plus irritable et plus sensible. Ainsi le chien et le cheval rêvent plus que les ruminans; le premier aboie, le second hennit quelquefois pendant le sommeil. Les vaches qui allaitent leurs veaux expriment par des mugissemens sourds leur sollicitude maternelle; les taureaux et les beliers paroissent tourmentés de désirs, qu'ils expriment surtout par des mouvemens particuliers de leurs lèvres.

D'après ce que nous avons dit du sommeil et des songes, il ne sera pas difficile d'expliquer pourquoi le premier répare si peu les forces, lorsque nous sommes, pendant sa durée, tourmentés par des rêves effrayans. Souvent on se réveille extrêmement fatigué des inquiétudes et des mouvemens que l'on s'est donnés pour échapper à des périls imaginaires.

Nous avons vu les relations de l'homme avec les objets du dehors établies au moyen d'organes par-

ticuliers qui, par le moyen des nerfs, vont tous aboutir à une partie centrale, siége essentiel et principal de la fonction qui fait l'objet de ce chapitre. Comme les phénomènes des sensations s'accomplissent par l'entremise d'un agent inconnu, et qu'analogues à ceux de l'électricité et du magnétisme, ils ne paroissent point obéir aux lois ordinaires du mouvement et de la matière, ils ont fourni le champ le plus vaste aux vaines suppositions de l'ignorance et du charlatanisme. C'est pour les expliquer qu'ont été imaginées les théories les plus nombreuses et les plus folles.

Le 23 décembre, on ne dit pas de quelle année, un médecin de Lyon, M. Petetin, est appelé auprès d'une jeune dame de dix-neuf ans, sanguine et robuste. Elle étoit cataleptique. Le docteur met en usage divers remèdes, et prend un jour le parti de renverser la malade sur son oreiller; il tombe à moitié penché sur le lit, et cela le conduit à la *découverte du transport des sens dans l'épigastre à l'extrémité des doigts et des orteils.* Je copie ici les termes fastueux et peu français dont il se sert pour annoncer sa découverte. Là, notre docteur raconte sérieusement que, mettant de la brioche sur l'épigastre de la malade, elle en percevoit le goût, puis exerçoit des mouvemens de déglutition; s'il faut l'en croire, elle entendoit, flairoit, goûtoit, voyoit et touchoit par-là, les sens externes étant pour lors complétement endormis. Afin de rendre la chose plus croyable, il ajoute

qu'elle voyoit l'intérieur de son corps, devinoit ce que renfermoient les poches des assistans, en faisoit l'inventaire, ne se trompoit point sur le nombre des pièces de monnoie contenues dans leur bourse; mais le miracle cessoit de s'opérer dès qu'on enveloppoit les objets d'une étoffe de soie, d'une couche de cire, ou que l'on interposoit tout autre corps aussi peu conducteur de l'électricité. Enfin, pour exercer tout-à-fait la foi de ses lecteurs, M. Petetin s'écrie : « O prodige inconcevable! « formoit-on une pensée sans la manifester par la « parole, la malade en étoit instruite aussitôt (1). » Il est inutile de raconter avec plus de détails une histoire aussi invraisemblable.

Je me serois tu sur le livre de M. Petetin, et l'aurois laissé dormir en paix à côté des innombrables brochures enfantées par le mesmérisme, si le professeur Dumas n'avoit été la dupe de cette mystification, et n'en avoit pris occasion d'écrire un long chapitre sur les transports ou déplacemens de la sensibilité.

Dans le cas où les amis du merveilleux nous reprocheroient de pousser trop loin le scepticisme, nous leur répondrons que M. Petetin est le seul témoin du miracle (2); qu'il est impossible, d'après

---

(1) *Électricité animale*, 1 vol. in-8°. Lyon, 1808.

(2) Je ne croirai à un miracle, disoit Voltaire, que lorsqu'il se sera opéré en plein midi, devant l'Académie des Sciences de Paris, ou la Société royale de Londres, assistées

sa narration, de dire en quelle année et sur quelle personne se sont opérés les prodiges qu'il raconte, et que cet auteur enthousiaste pourroit bien avoir inventé ce conte pour confondre les incrédules qui se permettoient de tourner en dérision son système sur l'électricité du corps de l'homme.

---

d'un régiment aux gardes pour écarter la foule des fanatiques et des imbécilles. En pareil cas, le parti le plus sage est d'adopter cette belle maxime du président Dupaty : « Entre des « hommes qui disent, Telle chose est, et la nature qui dit, « Telle chose n'est pas, il faut en croire la nature. »

CHAPITRE VII.

Des Mouvemens.

CLX. Il est seulement question, dans ce chapitre, des mouvemens qu'exécutent les muscles soumis à l'empire de la volonté, mouvemens de *locomotion*, à l'aide desquels notre corps se déplace, se transporte d'un lieu dans un autre, fuit ou recherche l'approche des êtres qui l'environnent, les attire, les embrasse ou les repousse loin de lui. Les mouvemens *intérieurs*, *involontaires*, *organiques*, à l'aide desquels chaque fonction s'exécute, ont été examinés séparément.

Les organes de nos mouvemens peuvent être distingués en *actifs* et en *passifs*. Les premiers sont les muscles; les seconds sont les os, et toutes les parties qui servent à leurs articulations. En effet, lorsqu'à l'occasion d'une impression reçue par les organes des sens, nous voulons nous rapprocher ou nous éloigner de l'objet qui l'a produite, les organes musculaires, stimulés par l'influx cérébral, se contractent, tandis que les os qui obéissent à cette action ne jouent qu'un rôle secondaire, passif, et peuvent être regardés comme des léviers absolument inertes.

Les muscles sont des paquets fibreux, toujours plus ou moins rouges dans l'homme, quoique

cette couleur ne leur soit point essentielle, puisqu'on peut la détruire et blanchir le tissu musculaire par la macération ou par des lotions répétées.

Quelles que soient la situation, la longueur, la largeur, l'épaisseur, la figure, la direction d'un muscle, il est composé par l'assemblage de plusieurs faisceaux de fibres qu'enveloppe une gaîne cellulaire, semblable à celle qui revêt le corps du muscle lui-même et le distingue des parties environnantes. Chaque faisceau est formé de la réunion d'une multitude de fibres si déliées, que nos instrumens anatomiques ne peuvent en opérer la dernière séparation, et que la plus petite fibre apercevable résulte encore de la juxta-position de plusieurs fibres d'une indéfinissable ténuité. Comme les dernières divisions de la fibre musculaire échappent entièrement à nos moyens d'investigation, il seroit bien absurde d'en vouloir exposer la structure intime, et, marchant sur les traces de Muys, d'écrire un long ouvrage sur ce point obscur de la physiologie. Dirons-nous avec l'auteur que je viens de citer que chaque fibre apercevable est formée de trois fibrilles, dont la grosseur éprouve un décroissement progressif; avec Leuwenhoek, que le diamètre de cette fibre élémentaire ne fait que la cent millième partie de celui d'un grain de sable; avec Swammerdam, de Heyde, Cowper, Ruisch et Borelli, que cette fibre primitive est formée d'une suite de molécules glo-

buleuses, rhomboïdales ou noueuses; avec Lecat, que sa nature est absolument nerveuse; avec Wieussens et Willis, qu'elle n'est autre chose que les dernières ramifications des artères; avec d'autres, qu'elle est cellulaire, tomenteuse, etc.? Comment énoncer quelque chose de positif sur la nature des parties d'un tout que sa ténuité soustrait à nos plus scrupuleuses recherches? Pour expliquer les phénomènes de l'action musculaire, il suffit de concevoir chaque fibre comme formée d'une série de molécules d'une nature particulière, réunies ensemble par un moyen inconnu; que ce soit le gluten, l'huile, ou tout autre substance, mais dont la cohésion, la mutuelle adhérence est manifestement entretenue par la force vitale, puisque les muscles se déchirent, sur les cadavres, par des efforts auxquels ils auroient résisté pendant la vie, et que, dans ce dernier état, leur résistance est si grande, que rien n'est plus rare que leur rupture.

Ces fibres, qui possèdent au plus haut degré la propriété de se raccourcir, de se contracter lorsqu'on les irrite, quelque degré de finesse et de ténuité qu'on leur suppose, reçoivent des nerfs et des vaisseaux. En effet, quoique leur nature ne soit ni vasculaire ni nerveuse, ce dont il est facile de se convaincre en comparant le volume des vaisseaux et des nerfs qui entrent dans la structure des muscles avec celui de ces organes, et en réfléchissant à la différence de leurs propriétés,

chaque fibre tient le pouvoir de se contracter du sang que lui apportent les artères, et du fluide que le cerveau y projette par le moyen des nerfs. Une gaîne cellulaire environne ces fibrilles (et peut-être les nerfs et les vaisseaux se terminent-ils dans son épaisseur); d'autres les unissent ensemble; des gaînes communes entourent les faisceaux; ceux-ci, réunis de la même manière, forment des paquets plus ou moins considérables; et de l'assemblage de ces derniers résulte le corps des muscles. Il s'amasse rarement de la graisse dans le tissu cellulaire qui unit ensemble les plus petits faisceaux; elle s'accumule en petite quantité dans les interstices des paquets plus considérables; enfin elle est un peu plus abondante autour du muscle lui-même. Une vapeur lymphatique et aqueuse remplit ces cellules, entretient la souplesse du tissu, et favorise l'action de l'organe, qu'eût gêné une humeur plus consistante.

La plupart des muscles se terminent par des corps ordinairement arrondis, d'une blancheur éclatante, et qui tranche sur la couleur rouge de la chair musculaire, dans l'épaisseur de laquelle une de leurs extrémités se prolonge, tandis que l'autre extrémité est attachée aux os, et semble se confondre avec le périoste qui recouvre ceux-ci, quoique les *tendons* (c'est ainsi qu'on nomme les corps par lesquels les muscles se terminent) en soient parfaitement distincts. Les tendons sont formés

d'un assemblage de fibres longitudinales et parallèles; leur structure est plus serrée que celle des muscles; ils sont plus durs, ne reçoivent ni nerfs ni vaisseaux apparens, n'ont par conséquent qu'un bien foible degré de vie : aussi se rompent-ils souvent par l'effort de traction que les muscles exercent sur eux. Les fibres musculaires s'implantent à la surface des cordes tendineuses, sans se continuer avec les filamens qui forment ces dernières : elles s'y rendent d'une manière différente, et s'y insèrent sous des angles plus ou moins ouverts.

Les tendons, en pénétrant dans le corps charnu des muscles, s'élargissent en diminuant d'épaisseur, et forment ainsi les aponévroses intérieures. Les aponévroses extérieures sont indépendantes des tendons, quoique leur structure soit la même, et qu'elles n'en diffèrent qu'en ce que les fibres dont elles sont composées forment des plans minces et étendus en largeur; tantôt elles recouvrent une portion de la surface du muscle auquel elles appartiennent; d'autres fois elles enveloppent la totalité d'un membre, fournissent des points d'attache aux muscles qui le composent, préviennent le déplacement de ces muscles et des cordes tendineuses qui les terminent, dirigent en quelque sorte leur action, et accroissent leur force de la même manière qu'une ceinture médiocrement serrée, augmente la vigueur d'un athlète.

On ne peut admettre avec Pouteau que les muscles des membres, quoique retenus contre les os

qui en forment le centre, par les enveloppes aponévrotiques, puissent se déplacer et faire hernie. Lorsqu'on les contracte dans une position fausse ou vicieuse, quelques fibrilles se déchirent, et de là naissent la plupart de ces douleurs instantanées, souvent très-vives, que l'on connoît sous le nom de *crampes*. J'ai actuellement sous mes yeux l'exemple d'une petite fille dont l'aponévrose de la jambe, mise à découvert par suite d'une large ulcération, s'est exfoliée depuis la partie moyenne et antérieure du membre jusqu'au coude-pied. Cette exfoliation a été suivie du déplacement du muscle jambier antérieur, et de celui des extenseurs des orteils; la jambe s'est déformée, les mouvemens d'extension du pied et des orteils sont difficiles, et deviendront bientôt impossibles, lorsque l'exfoliation des tendons suivra celle de l'aponévrose, qui les garantissoit du contact de l'air.

CLXI. Lorsqu'un muscle se contracte, ses fibres se rident, se plissent en travers; leurs extrémités se rapprochent, puis s'éloignent pour se rapprocher de nouveau. A ces oscillations ondulatoires, qui sont très-rapides, succède une moindre agitation; le corps du muscle, gonflé, durci en se raccourcissant, a exercé un effort de traction sur le tendon qui le termine; l'os auquel celui-ci s'attache a été remué, si d'autres puissances plus fortes que le muscle qui agit ne l'ont empêché d'obéir à cette action. Tels sont les phénomènes que présentent les muscles mis à découvert sur

un animal vivant ou sur l'homme, lorsqu'on en provoque les contractions par l'application d'un stimulus. Mais ces contractions par cause extérieure n'ont jamais la force, l'instantanéité de celles que la volonté détermine d'une manière puissante et soudaine. Examinez un athlète maigri par une maladie, au moment où il contracte le biceps brachial pour fléchir fortement l'avant-bras, on voit ce muscle se grossir tout à coup, se roidir, et persister immobile dans cette contraction pendant tout le temps que dure l'influx cérébral ou l'acte de la volonté qui le détermine.

Quoique les muscles se gonflent manifestement lorsqu'ils se contractent, et que les membres auxquels ils appartiennent se trouvent gênés par les liens que l'on passe autour d'eux, néanmoins le volume total de l'organe contractile reste le même; il perd en longueur autant à peu près qu'il acquiert en grosseur. C'est ce que prouve l'expérience de Glisson, laquelle consiste à plonger le bras dans un vase rempli d'un liquide dont le niveau s'abaisse lorsqu'on fait agir les muscles. On ne peut pas calculer la diminution du volume par le degré d'abaissement du liquide, puisque cet effet est dû en grande partie à l'affaissement des couches du tissu graisseux, qui se trouve comprimé dans les interstices musculaires.

L'intégrité des vaisseaux et des nerfs qui se distribuent aux muscles est une condition indis-

pensable à leur contraction. Il suffit d'empêcher l'abord du sang ou du fluide nerveux par la ligature des artères ou des nerfs ; d'empêcher, par celle des veines, le retour du fluide qu'elles rapportent au cœur, pour que les muscles soient complétement paralysés. La section ou la ligature des nerfs empêche subitement l'action des muscles auxquels ils se distribuent; l'interception du cours du sang artériel produit le même effet, quoique d'une manière moins prompte et moins instantanée; et il est bien remarquable que l'intégrité des veines est presque aussi essentielle à l'action musculaire que celle des artères. Boerhaave a expérimenté que la ligature de la veine - cave au-dessus de la naissance des iliaques entraînoit la perte du mouvement dans les extrémités postérieures, aussi-bien que celle de l'aorte, pratiquée par Sténon à la même hauteur; ce qui prouve de plus en plus ce que nous avons dit ailleurs de la propriété stupéfiante du sang qui coule dans les veines.

La contractilité des muscles destinés aux mouvemens volontaires est en raison directe du nombre et de la grosseur des nerfs et des artères qui se répandent dans leur tissu. La langue, qui, de tous les organes contractiles, est celui qui reçoit le plus de nerfs cérébraux, est aussi celui, de tous ceux qui sont soumis à l'empire de la volonté, dont les mouvemens sont les plus étendus, les plus libres,

les plus variés (1). Les muscles du larynx, les intercostaux, n'en reçoivent guère moins, si on les compare au petit volume de ces parties, etc.

Il faut soigneusement distinguer dans les muscles l'aptitude de ces organes à se contracter, de la force avec laquelle ils se contractent. Les muscles débiles d'une femme vaporeuse se contractent avec une telle facilité, que souvent leur contraction paroît involontaire, tandis que les muscles puissans d'un athlète n'entrent en action qu'autant qu'ils y sont portés par des stimulans énergiques, ou par une volonté bien déterminée.

CLXII. Parmi les hypothèses imaginées pour exprimer les phénomènes de la contraction musculaire, celle qui la fait dépendre des combinaisons de l'hydrogène, du carbone, de l'azote et des autres substances combustibles qui se trouvent dans le corps charnu du muscle, avec l'oxigène qu'apporte le sang des artères, n'est pas sans probabilités.

Pour que cette combinaison s'opère, il faut

---

(1) Il n'est pas besoin de répéter que nous ne parlons point ici des mouvemens plus ou moins involontaires qu'exécutent les muscles qui reçoivent leurs nerfs, en partie ou en totalité des grands sympathiques. Quoique la nature particulière de ces nerfs ait une grande influence sur les facultés des organes dans le tissu desquels ils se répandent, on voit cependant que la règle générale souffre peu d'exceptions, puisque le cœur et le diaphragme, ces organes qui tiennent le premier rang parmi les parties contractiles, reçoivent beaucoup de vaisseaux et beaucoup de nerfs.

non-seulement que le sang artériel arrose la chair musculaire, et que l'oxigène se mette en contact avec les substances qu'il doit oxider; il faut encore qu'un courant nerveux traverse le tissu du muscle et détermine les compositions qui s'opèrent comme le passage de l'étincelle électrique donne naissance à l'eau par la combinaison des deux gaz dont elle est fornée. Selon cette théorie, due à Girtanner, tous les changemens qui arrivent à un muscle qui se contracte, le gonflement, le raccourcissement, le durcissement de son tissu, le changement de température, tiennent à cette action réciproque des élémens de la fibre musculaire et de l'oxigène du sang artériel.

La chair musculaire est d'autant plus dure, plus ferme, plus brûlée, que l'animal se meut davantage : on sait quelle différence existe entre la chair des bêtes fauves et celle de nos animaux domestiques; entre la viande des volailles de basse-cour et celle des oiseaux de haut vol : autant elle est, chez les premiers, blanche, douce, tendre et délicate, autant elle est chez les autres dure, fibreuse, coriace, noire, charbonnée et fortement odorante. La respiration, dont le principal usage est d'imprégner le sang artériel de l'oxigène nécessaire aux contractions de la fibre musculaire, est d'autant plus complète, altère une quantité d'autant plus grande d'air atmosphérique, que les animaux sont par leur nature destinés à plus de mouvemens. Les oiseaux obligés de se soutenir

dans les airs par des mouvemens forts et pressés, sont aussi ceux qui respirent davantage. Les athlètes, qui nous étonnent par le développement de leur organe musculaire et la grandeur des efforts dont ils sont capables, ont tous une poitrine fort ample, une voix forte, les poumons d'une grande capacité (1). Les coureurs, qui consomment une grande quantité du principe moteur, *halètent*, c'est-à-dire respirent précipitamment, afin d'oxider le plus possible le sang qui doit entretenir les contractions nécessaires à la course.

Les expériences récentes (1823) de MM. Prevost et Dumas apprennent qu'au moment où l'influx nerveux détermine une contraction musculaire, chaque fibre du muscle se fléchit en zigzags. A chaque point de flexion répond un filament nerveux dont la direction est perpendiculaire à celle de la fibre musculaire, qu'i lembrasse par une anse; car, après avoir coupé à angle droit la direction des fibres musculaires, les filets des nerfs reviennent sur eux-mêmes et rejoignent la branche qui les a

(1) Je n'ai jamais vu d'homme très-fort qui n'eût de larges épaules; ce qui indique un grand développement de la cavité respiratoire. S'il est des individus qui paroissent se soustraire à cette loi générale, c'est que, par un fréquent exercice, par une vie laborieuse, ils ont augmenté la force naturelle de leurs muscles. Cet accroissement est rarement général, mais presque toujours borné à certaines parties qui ont été les plus exercées, les bras, les jambes ou les épaules.

produits. Cela posé, le phénomène de contraction musculaire a lieu par l'influence du double courant électrique en sens contraire, dont les nerfs sont les conducteurs. A la faveur de ce double courant, des attractions et des répulsions alternatives, toutes les fibres musculaires sont pliées en zigzags; il y a raccourcissement sans que le volume du muscle augmente, au moins d'une manière appréciable. Pour étudier ces phénomènes, MM. Prevost et Dumas placent sous le microscope un muscle assez mince pour conserver sa transparence. Dans la contraction musculaire, comme dans toutes les actions vitales, nous retrouvons donc cet agent universel, cette âme du monde et de la nature qui, depuis un siècle à peine, est, de la part des savans, l'objet d'une étude attentive.

CLXIII. *Prépondérance des muscles fléchisseurs sur les extenseurs* (1). Les muscles extenseurs sont généralement plus foibles que les fléchisseurs; aussi la situation la plus naturelle, celle dans laquelle toutes les forces se font mutuellement équilibre, celle que nos membres prennent durant le sommeil, lorsque la volonté cesse de déterminer l'influx vital dans les muscles soumis à son empire, celle que nous conservons le plus long-temps

(1) La théorie de la prépondérance des muscles fléchisseurs sur les extenseurs m'appartient exclusivement; je l'ai, le premier, proposée dans le Recueil des Mémoires de la Société médicale de Paris, pour l'an VII de la république (1799).

sans fatigue, est un état moyen entre la flexion et l'extension, une véritable demi-flexion.

On a voulu remonter aux causes de cette prépondérance des muscles fléchisseurs sur leurs antagonistes. Selon Borelli, les fléchisseurs de la même articulation étant moins longs que les extenseurs, et tous se contractant également (1), les premiers doivent faire parcourir aux membres un espace plus considérable, et les déterminer de leur côté. Mais, outre qu'il n'est point vrai que les fléchisseurs soient plus courts que les extenseurs, si l'on veut estimer par la longueur d'un muscle l'étendue des mouvemens que son action peut produire, on ne doit ni mesurer la longeur totale du corps charnu, ni comprendre dans l'évaluation la corde tendineuse qui le termine, mais avoir égard à la longueur particulière des fibres qui le composent, et de laquelle dépend en entier l'étendue des mouvemens que ses contractions déterminent.

Le degré de raccourcissement dont un muscle est susceptible est toujours relatif à la longueur de ses fibres charnues, comme la force avec laquelle il se contracte est en raison de leur nombre. Or, si les fibres des fléchisseurs sont plus nombreuses que celles des extenseurs, une consé-

---

(1) *Musculi flexores ejusdem articuli breviores sunt extensoribus, et utrique æquè contrahuntur.* Prop. 130, *de Motu animalium.*

quence nécessaire, c'est que les membres seront entraînés dans la flexion lorsque le principe du mouvement se distribuera en égale quantité ; et lors même que le nombre des fibres seroit égal dans les fléchisseurs et les extenseurs, les membres seroient encore fléchis, si, les fibres des premiers étant plus longues, ils peuvent faire parcourir aux parties de plus grands espaces.

Si l'on examine les diverses régions du corps, les articulations des membres, et surtout celle du genou, dont la connoissance est la plus importante pour bien entendre la théorie de la station, on verra que les muscles fléchisseurs l'emportent de beaucoup sur les extenseurs pour le nombre et la longueur de leurs fibres charnues. Si l'on compare le biceps crural, le demi-tendineux, le demi-membraneux, le droit interne, le couturier, les jumeaux, le plantaire grêle et le poplité, qui tous concourent à la flexion de la jambe sur la cuisse, au triceps crural et au droit antérieur, qui en opèrent l'extension, on verra bientôt que les fibres de ceux-ci sont bien plus courtes et moins nombreuses. Celles du couturier et du droit interne sont les plus longues de toutes celles des muscles employés aux mouvemens volontaires : les fibres des muscles postérieurs du membre ne le cèdent point pour la longueur à celles des autres muscles antérieurs.

D'un autre côté, les muscles fléchisseurs s'insèrent aux os qu'ils doivent mouvoir plus loin

du centre de leurs mouvemens. En effet, si l'insertion du demi-membraneux se fait à peu près à la même hauteur, le couturier, le droit interne, le demi-tendineux, le biceps et le poplité s'attachent plus bas que les extenseurs de la jambe. Mais cette différence est surtout marquée relativement au plantaire grêle et aux jumeaux, qui se terminent le plus loin possible du centre des mouvemens, et agissent par un bras de levier qui a une longueur considérable (1); enfin le plus grand nombre de ces muscles s'écartent bien plus que les extenseurs du parallélisme avec les os de la jambe. On sait quel contour font les trois muscles couturier, droit interne et demi-tendineux, pour rendre plus avantageux l'angle sous lequel ils s'y insèrent.

Les muscles fléchisseurs, presque parallèles aux leviers qu'ils doivent mouvoir au moment où ils entrent en action, tendent à leur devenir perpendiculaires, à mesure que le mouvement de flexion s'exécute. Ainsi le brachial antérieur, le biceps brachial et le long supinateur, dont la ligne

(1) On peut, sous ce rapport, comparer les muscles jumeaux au long supinateur, dont l'usage n'est point borné, ainsi que l'a fait voir Heister, à opérer la supination de la main, mais qui fléchit encore l'avant-bras sur le bras avec une force d'autant plus grande que son attache inférieure est à une distance plus considérable de l'articulation du coude, et que ses fibres sont les plus longues de toutes celles des muscles de l'extrémité supérieure.

moyenne de direction est presque parallèle à celle des os de l'avant-bras, lorsque la flexion de ce membre commence, deviennent obliques, puis perpendiculaires à ces os, et finissent par les rencontrer sous l'angle le plus avantageux à l'efficacité de leur action. Il en est de même des fléchisseurs de la jambe. L'angle de leur insertion s'agrandit à mesure qu'elle se fléchit sur la cuisse. Les muscles extenseurs, au contraire, sont dans les dispositions les plus favorables au moment où leur contraction commence : à mesure que l'extension s'opère, ils tendent à devenir parallèles aux leviers qu'ils meuvent ; leur action est même neutralisée avant que le parallélisme soit exact, au coude, par la résistance qu'oppose l'apophyse olécrâne, et au genou, par les ligamens nombreux, et par les tendons placés vers la partie postérieure de l'articulation.

Les muscles fléchisseurs ont donc des fibres plus nombreuses et plus longues que les extenseurs. Leur insertion se fait aux os, plus loin du centre, de leurs mouvemens, sous un angle plus ouvert, et qui s'agrandit encore à mesure que les membres se fléchissent. C'est à ces causes réunies que les fléchisseurs doivent la supériorité dont ils jouissent ; c'est à la plus grande étendue des mouvemens que ces muscles déterminent que doit être attribuée la disposition des surfaces articulaires, presque toutes inclinées du côté de la flexion.

Cette prépondérance des muscles fléchisseurs varie suivant les périodes des âges. Dans le fœtus, toutes les parties, repliées sur elles-mêmes, sont fléchies outre mesure : cette convolution du nouvel individu sur lui-même peut être aperçue dès les premiers temps de la gestation, lorsque, semblable à une fève de haricot, et suspendu par le cordon ombilical au milieu des eaux de l'amnios, l'embryon flotte dans une cavité où il se trouve de plus en plus resserré à mesure qu'il s'approche du terme de sa naissance. Cette flexion outrée des parties, nécessaire pour que le produit de la conception s'accommode à la forme ellipsoïde de l'utérus, concourt à donner aux muscles qui l'opèrent la supériorité dont ils jouissent durant le reste de la vie.

L'enfant nouveau-né conserve d'une manière remarquable les habitudes de la gestation; mais à mesure qu'il prend de l'accroissement, il se redresse sur lui-même; des pandiculations fréquentes annoncent qu'une juste proportion tend à s'établir entre les puissances musculaires. Lorsque l'enfant devient capable de se tenir debout, abandonné à ses propres forces, toutes ses parties sont à demi fléchies, sa démarche est chancelante; il vacille sans cesse sur son point d'appui. Vers le milieu de la vie, la prépondérance des fléchisseurs sur les extenseurs devient moins apparente; l'homme jouit du plein et entier exercice de sa faculté locomotrice; mais à mesure qu'il avance en

âge, cette vigueur l'abandonne, les muscles extenseurs redescendent par degrés à cet état de débilité relative qu'ils avoient dans l'enfance, et deviennent incapables d'assurer la station d'une manière fixe et durable.

CLXIV. L'état de nos membres pendant le sommeil se rapproche de celui du fœtus, qui, suivant la remarque de Buffon, peut être considéré comme profondément endormi. Sa cessation est suivie, chez l'homme ainsi que chez la plupart des animaux, de fréquentes pandiculations. Nous étendons fortement nos membres pour donner aux extenseurs le ton nécessaire aux fonctions qu'ils doivent remplir pendant l'état de veille (1). Barthez rapporte à une semblable utilité les chants et les agitations des ailes par lesquels le coq annonce son réveil.

Il peut arriver que, par une direction vicieuse de l'influx vital, nos parties persistent dans l'extension durant le sommeil. Aussi Hippocrate recommande-t-il d'observer soigneusement l'état des membres tandis que le malade dort; car, ajoute-

---

(1) Haller pense que ces extensions ont pour but de faire cesser la sensation incommode que produit la flexion prolongée. « *Nunc quidem homines et animalia extendunt artus*, « *quòd iis ferè conflexis dormiant, et, ex eo perpetuo situ*, « *in musculis sensus incommodus oriatur, quem extensione* « *tollunt.* » (*Phænomena expergiscentium*, *Elementa physiologiæ*, tome V, page 621.)

t-il, plus cet état s'éloigne du naturel, plus il y a à craindre pour la vie. Dans certaines maladies nerveuses, caractérisées par une aberration manifeste dans la distribution des forces vitales, l'extension soutenue doit être regardée comme un sinistre présage; j'ai eu plusieurs fois occasion d'observer que, dans les plaies qui se compliquent de convulsions et de tétanos, ces accidens terribles sont annoncés par l'extension persévérante des membres durant le sommeil, avant que la difficulté des mouvemens de la mâchoire puisse les faire pressentir.

Les maladies, les excès de tous genres introduisent dans les muscles extenseurs une faiblesse relative bien remarquable. Aussi voit-on les convalescens, et ceux qui ont multiplié leurs jouissances, marcher les genoux fléchis, d'autant plus que leur débilité est plus grande, et que la force des extenseurs est plus radicalement énervée. Alors la flexion des genoux a pour terme cet état dans lequel le tendon des extenseurs de la jambe rencontre le tibia sous un angle dont la grandeur compense la diminution de leur énergie. Il est un état de l'économie animale dans lequel tous les organes musculaires paroissent las d'agir, et les membres indifférens à toute espèce de situation : dans cet état, toujours très-fâcheux, parce qu'il indique un défaut presque absolu d'action dans un système d'organes dont l'exercice est essentiel à la vie, état que les médecins sont convenus de

désigner sous le nom de *prostration* (1), les membres, abandonnés à eux-mêmes, tombent de tout leur poids, comme s'ils étoient paralysés ; le corps immobile demeure renversé sur le dos. Le malade ne peut changer d'attitude ; cédant à sa pesanteur, il glisse sur le plan incliné que le lit lui présente,

---

(1) Dans le traitement des maladies, c'est de l'appréciation de l'état des forces que le médecin tire ses indications les plus lumineuses et les plus fécondes. Il me semble qu'on devroit s'attacher à caractériser par des termes spécifiques les divers états de la dynamique animale, considérée dans les différentes maladies. Notre langue, moins riche en images que les langues anciennes, offrira difficilement ces dénominations caractéristiques, si utiles dans une science qui doit peindre les objets sous les couleurs les plus vraies, sous les termes les plus voisins de la nature. Il faudra donc recourir aux langues grecque et latine, et préférer peut-être cette dernière, généralement connue par ceux qui s'occupent de l'art de guérir. L'application de ce principe aux différens ordres de fièvres prouvera son tutilité, et engagera sans doute à l'étendre à toutes les classes de dérangemens morbifiques :

In febre inflammatoria seu synocho simplici (angeiotenicâ) . . . . . *Oppressio virium.*
In febre biliosâ seu ardente (gastritis aucta Broussais). . . . . *Fractura virium.*
In febre pituitosâ seu morbo mucoso (enteritis B.). . . . . *Languor virium.*
In febre putridâ (adynamicâ). . . . . *Prostratio virium.*
In febribus malignis seu atactis. . . . . *Ataxia virium.*
In febre pestilentiali (adeno-nervosâ). . *Syderatio virium.*

Le premier terme, très-susceptible d'être rendu en français, exprime avec précision cet état dans lequel le système

et paroît extrêmement lourd à ceux qui le soulèvent, parce que, s'abandonnant entièrement à leurs efforts, ils doivent le remuer comme un corps absolument inerte.

CLXV. *Force des muscles, manière de l'estimer, déchets qu'elle éprouve.* La force effective des

---

vivant, loin de manquer de forces, est embarrassé de leur excès, est opprimé sous sa propre puissance. On pourroit l'appliquer, avec de légères modifications, à tous les genres de phlegmasies et d'hémorragies actives.

La seconde dénomination, plus difficile à traduire, rend ce sentiment de contusion générale et de brisement que les malades affectés de fièvre bilieuse ou de gastrite suivant M. Broussais, éprouvent dans tous les membres.

Cette douleur contusive se fait, à la vérité, ressentir dans la fièvre pituiteuse ou entérite; mais celle-ci est plus particulièrement caractérisée par la langueur, l'abattement des forces. Un grand nombre de maladies lymphatiques présentent le même phénomène.

La prostration, qui caractérise si éminemment les fièvres putrides, et leur a mérité le nom d'*adynamiques*, se reconnoît aisément à la presque cessation ou à la lésion notable de toutes les fonctions confiées à des organes musculaires, comme le mouvement volontaire, la respiration, la circulation, la digestion, l'excrétion des urines, etc.

Le désordre introduit dans l'exercice des forces caractérise les ataxiques. Tout est irrégulier dans ces fièvres, et se succède d'une manière anomale. On pourroit en rapprocher, sous ce point de vue, plusieurs genres de maladies nerveuses.

Enfin le mot *sydération* me paroît exprimer avec force cette stupeur subite et profonde qui atterre en quelque sorte les malades que frappe la peste d'Orient.

muscles est immense, semble croître en raison des résistances qu'on lui oppose, et ne pourra jamais être évaluée que d'une manière approximative. Borelli est tombé dans de graves erreurs en estimant la force d'un muscle d'après son poids, comparé à celui d'un autre muscle; car, du tissu cellulaire, de la graisse, des parties tendineuses et aponévrotiques peuvent les surcharger, sans pour cela leur donner plus de force. Cette propriété est toujours relative au nombre des fibres charnues qui entrent dans leur composition; aussi la nature a-t-elle multiplié ces fibres dans les muscles qui doivent surmonter de grandes résistances. Et pour que cette multiplication ne donnât point aux membres un volume trop considérable, elle les a rendues plus courtes, en rapprochant leurs points d'insertion, qui se font toujours à des surfaces très-étendues, soit aponévrotiques, soit osseuses. On peut, en général, juger de la force d'un muscle par l'étendue des surfaces auxquelles s'implantent ses fibres charnues; c'est ainsi que les jumeaux et le soléaire ont des fibres courtes, pressées et disposées obliquement entre deux larges aponévroses.

Si la force avec laquelle un muscle se contracte est en raison du nombre de ses fibres, le degré de raccourcissement dont il est susceptible, et par conséquent l'étendue des mouvemens qu'il peut imprimer aux membres, sont relatifs à la longueur des mêmes fibres. Ainsi le muscle couturier, qui,

de tous ceux du corps humain, a les fibres les plus longues, est aussi celui dont la contraction est la plus étendue, et qui imprime des mouvemens plus considérables à la jambe. On ne peut assigner de limites précises au raccourcissement de chaque fibre musculaire en particulier; car, si la plupart des muscles longs des membres ne perdent guère que le tiers de leur longueur en se contractant, les fibres circulaires de l'estomac, qui, dans l'état de dilatation extrême de cet organe, représentent des cercles de près d'un pied de diamètre, peuvent se resserrer à tel point, lorsqu'il reste long-temps vide, qu'elles forment des anneaux qui n'aient qu'un pouce de circonférence. Dans ces cas d'allongement ou de constriction extrêmes, sont-ce les molécules dont la série forme la fibrille musculaire, ou la substance qui leur sert de moyen d'union, qui ressentent le changement? ou bien se passe-t-il à la fois dans les unes et dans l'autre?

Quelle que soit la force des muscles, une grande partie de cette force est rendue inutile par la disposition défavorable des organes de nos mouvemens; presque toujours parallèles aux os qu'elles doivent mouvoir, les puissances musculaires agissent avec d'autant moins d'efficacité sur ces leviers, que la ligne moyenne de leur direction est plus éloignée de la perpendiculaire, et s'approche davantage du parallélisme par rapport à eux.

La plupart des muscles s'implantent d'ailleurs aux os, très-près de leurs articulations ou du centre

de leurs mouvemens, et les meuvent à la manière des leviers du troisième genre, dans lesquels la puissance se trouve toujours placée entre le point d'appui et la résistance. En multipliant ainsi, dans la machine animale, les leviers du troisième genre, la nature a diminué les forces en augmentant les vitesses; car, dans ce genre de levier, la puissance n'a besoin que de parcourir de très-petits espaces pour en faire parcourir de très grands à la résistance. En outre, les fibres charnues n'exercent point, en se raccourcissant, une traction directe sur le tendon par lequel le muscle se termine; presque toujours ces fibres se rendent obliquement à l'expansion aponévrotique que forme la corde tendineuse en se prolongeant dans l'épaisseur du corps charnu : or, leur action s'exerçant suivant cette ligne plus ou moins oblique, se trouve décomposée, et il n'y a d'utilement employée que la partie qui s'exerce suivant la direction du tendon. Les muscles passant souvent sur plusieurs articulations pour arriver à l'os qu'ils doivent mouvoir, une partie de leur force se perd dans le jeu plus ou moins libre qu'exécutent les unes sur les autres les diverses pièces sur lesquelles s'appuie l'os auquel ils s'insèrent. Toutes ces imperfections organiques entraînent un déchet énorme dans les forces, et en rendent inutile la plus grande portion. On à calculé que le muscle deltoïde emploie une force équivalente à 2,568 livres pour vaincre une résistance de 50. Il ne faut pas croire néanmoins qu'il y ait une perte de 2,518 livres;

car le deltoïde, agissant sur l'épaule et sur le bras, emploie à peu près la moitié de sa force sur chacune de ces deux parties : ce qui a fait dire que, pour estimer la force totale d'un muscle, on doit doubler l'effet de sa contraction, son action se passant en même temps et sur le poids qu'il soulève ou la résistance qu'il surmonte, et sur le *point fixe* auquel s'attache son extrémité opposée.

Si les muscles étoient exactement parallèles aux os, ils ne pourroient les mouvoir en aucun sens. Aussi la nature en a-t-elle, autant qu'elle a pu, corrigé le parrallélisme, en écartant, comme nous le verrons en étudiant le système osseux, les tendons de la ligne moyenne de direction des os, et en agrandissant les angles sous lesquels ils s'y insèrent; soit qu'elle ait placé sur leur trajet des os qui en changent la direction, comme le font la rotule et les sésamoïdes; soit que, pour produire le même effet, elle ait donné aux extrémités articulaires des os plus de volume qu'à leur partie moyenne; soit qu'elle ait établi, dans certains endroits, des poulies de renvoi, sur lesquelles les tendons ou les muscles eux-mêmes se réfléchissent d'une manière plus ou moins complète, comme on peut le voir dans les contournés du voile du palais, les obturateurs internes, etc.

La nature n'a donc point autant négligé les avantages mécaniques qu'on pourroit le croire, en se contentant d'un examen superficiel des organes moteurs. Et si l'on fait attention que dans

les diverses conditions de la vie nous avons moins besoin de force que d'agilité ; que les forces pouvoient être augmentées par la multiplication des fibres, tandis qu'il n'existoit d'autre moyen de gagner en vitesse que l'emploi mécanique de telle ou telle espèce de levier ; et qu'enfin, pour que nos membres eussent les formes les plus avantageuses, il falloit que les muscles fussent couchés sur les os, on conviendra que, dans la disposition de ces organes, la nature, en sacrifiant fréquemment la force à la vitesse, a concilié, autant qu'il étoit possible, ces deux élémens presque inconciliables.

Quoique le levier du troisième genre se trouve le plus fréquemment employé dans l'économie animale, les deux autres leviers n'en sont point entièrement bannis ; il est même des membres qui représentent des leviers différens, suivant les muscles qui les mettent en mouvement ; ainsi, prenant le pied pour exemple, cette partie nous présente des leviers de toute espèce. Le pied, détaché du sol, suspendu en l'air, est-il étendu sur la jambe, il forme un levier du premier genre ; le point d'appui est dans l'articulation, et sépare la puissance qui se trouve au talon de la résistance qui existe dans la pointe du pied abaissée : cette pointe appuie-t-elle sur le sol, et nous tenons-nous debout sur la pointe des pieds, ils sont transformés en levier du second genre ; la puissance reste bien au talon, mais le point d'appui est

transporté à l'autre extrémité du levier, et la résistance au milieu, résistance qui est très-considérable, puisque le poids entier du corps pèse sur l'articulation du pied avec la jambe. Dans la station sur la pointe des pieds, les muscles du mollet se fatiguent prodigieusement, quoique leur action se trouve aidée par l'emploi du levier le plus avantageux (1), accommodé à la résistance la plus grande que la nature se soit opposée à elle-même. Enfin le pied est mu à la manière d'un levier du troisième genre, lorsque nous le fléchissons sur la jambe.

CLXVI. Ce que l'on nomme point fixe dans l'action des organes musculaires ne mérite pas toujours ce nom. Ainsi, quoique l'on dise avec raison que la plupart des muscles de la cuisse ont leur point fixe dans les os du bassin, auxquels s'attache leur extrémité supérieure, et qu'ils meuvent le fémur sur l'os des îles, moins mobile que lui, lorsque la cuisse est fixée par l'action d'autres muscles, ceux-ci meuvent le bassin sur elle, et leur point fixe devient leur point mobile. Il en est de même de tous les muscles du corps; de manière que le point fixe est seulement celui qui, dans le plus grand nombre des cas, fournit un point d'appui à l'action musculaire. Cette fixation

(1) Des leviers à bras inégaux, celui du second genre est le plus favorable, puisque constamment le bras de la puissance est plus long que celui de la résistance.

nécessaire des os auxquels s'attache l'une des extrémités d'un muscle que nous voulons contracter, fait que le moindre mouvement exige l'action de plusieurs muscles, et suppose un mécanisme assez compliqué. Rien n'est plus aisé que d'en administrer la preuve. Supposez un homme étendu par terre ou couché sur le dos ; s'il veut relever sa tête, il faudra que la poitrine devienne le point fixe de l'action des muscles sterno-cléido-mastoïdiens, principalement chargés de ce mouvement. Or, pour que les pièces dont l'assemblage forme cette charpente osseuse restent immobiles, il faut que la poitrine elle-même soit fixée par l'action des muscles du bas-ventre, qui de leur côté prennent sur le bassin le point fixe de leur action ; celui-ci ne cède point, retenu par la contraction des fessiers, etc., etc. C'est d'après cette observation que Winslow a le premier donné le précepte de faire coucher les malades dont on veut réduire les hernies, sur un plan parfaitement horizontal, en leur recommandant de ne point lever la tête ; afin que, les muscles de l'abdomen restant relâchés, leurs diverses ouvertures se prêtent à une réduction plus facile.

Les deux points opposés auxquels les extrémités d'un muscle s'attachent sont-ils également mobiles, la contraction les rapproche l'un de l'autre, en leur faisant parcourir des espaces égaux. Les espaces parcourus seroient inégaux, si la mobilité étoit différente. Chaque muscle a son antagoniste,

c'est-à-dire un autre muscle dont l'action lui est directement opposée. Ainsi les fléchisseurs balancent l'action des extenseurs, les abducteurs impriment des mouvemens opposés à ceux que font exécuter les adducteurs. Lorsque deux muscles antagonistes d'égale force agissent en même temps sur une partie également mobile dans tous les sens, les forces opposées se détruisent réciproquement, et la partie reste immobile. Si nous les contractons à divers degrés, la partie se dirige vers le muscle dont la contraction est la plus forte ; si l'antagonisme n'est pas direct, elle suit une direction moyenne entre celle des deux puissances qui la meuvent. Ainsi le muscle droit externe de l'œil n'est point l'antagoniste du droit inférieur de cet organe : aussi, ces deux muscles venant à se contracter simultanément, l'œil ne se trouve porté ni en bas ni en dehors ; mais en bas et en dehors en même temps : on dit alors qu'il se meut suivant la diagonale d'un parallélogramme, dont les deux muscles qui agissent formeroient les côtés.

CLXVII. *Nature de la chair musculaire.* Nous ne parlerons point ici de la manière dont les muscles se nourrissent, en retenant dans les mailles de leur tissu la fibrine que le sang leur apporte en si grande abondance, que Bordeu a nommé ce liquide *chair coulante*, expression énergique et vraie, puisque tous les organes se réparent et s'accroissent en solidifiant ses diverses parties. Haller

a le premier fait observer que la plupart des artères musculaires se recourbent sur elles-mêmes d'une façon remarquable, en pénétrant dans les muscles. Cette disposition, qui doit ralentir beaucoup le cours du sang, favorise la formation et la sécrétion de l'élément fibreux, dont le muscle s'empare pour l'approprier à sa substance, avec laquelle il a déjà une si frappante conformité. Le mouvement influe sur cette sécrétion nutritive d'une manière bien remarquable. Les muscles les plus exercés sont constamment ceux qui acquièrent le plus de force et de volume. Pour les atrophier et les réduire à des lames très-minces, en faisant cesser la sécrétion du principe fibrineux, il suffit de les condamner à une entière inaction. Le mouvement musculaire favorise puissamment le cours et la distribution de toutes les humeurs. L'écoulement du sang veineux à la suite de l'opération de la saignée n'est jamais considérable, si l'on n'a pas l'attention de faire contracter les muscles de l'avant-bras, en plaçant le lancetier dans la main du malade, et en lui recommandant de le tourner sans cesse.

La nature chimique du muscle est la même, à peu de chose près, que celle de la fibrine retirée du sang (1). Comme cette dernière, il contient

(1) Rien ne prouve mieux les différences essentielles qui existent entre la portion charnue des muscles et leurs parties tendineuses et aponévrotiques que l'analyse chimique de ces organes. Les tendons et les aponévroses se résolvent complé-

beaucoup d'azote, est par conséquent très-animalisé et éminemment putréfiable. C'est de la chair musculaire que Berthollet a retiré, en grande proportion, l'acide particulier des animaux, que ce chimiste nomme *acide zoonique*. Un principe analogue retiré abondamment de la chair musculaire a été désigné sous le nom d'*osmazome* par nos nouveaux chimistes; c'est une espèce d'*extrait animal*, brunâtre, aromatique, éminemment restaurant; c'est à lui que le bouillon doit sa saveur; le jus de viande en est presque entièrement formé. Quoique l'osmazome soit un produit animal, on le trouve, par l'analyse, dans quelques espèces de champignon. Enfin l'élément du sang à l'aide duquel se répare la chair musculaire, la fibrine est déjà empreinte des propriétés vitales, lorsqu'elle coule encore mêlée aux autres parties du liquide. On voit cette fibrine, retirée du sang et soumise à l'influence galvanique, frémir évidemment et se contracter sous cette influence. Quel est l'instant où cette substance acquiert la faculté contractile? C'est sans doute au moment où elle s'organise en passant à l'état solide. Quel rapport existe entre l'organisation de la matière et les propriétés

---

tement en gélatine, par une ébullition prolongée qui dessèche au contraire la chair musculaire, en mettant la fibrine à nu, par la fusion de la graisse, du tissu cellulaire, et des sucs albumineux dont elle est enveloppée.

vitales dont elle est douée? Question insoluble dans l'état actuel de la physiologie.

CLXVIII. *Galvanisme*. Un professeur d'anatomie à l'université de Bologne, Galvani, faisoit un jour des expériences sur l'électricité. Dans son laboratoire, et non loin de la machine, se trouvoient des grenouilles écorchées, dont les membres entroient en convulsion chaque fois que l'on soutiroit une étincelle. Surpris de ce phénomène, Galvani en fit le sujet de ses recherches, et reconnut que des métaux appliqués aux nerfs et aux muscles de ces animaux déterminoient des contractions fortes et rapides, lorsqu'on les disposoit d'une certaine manière. Il a donné le nom d'*électricité animale* à cet ordre de nouveaux phénomènes, d'après l'analogie qu'il crut apercevoir entre ses effets et ceux que produit l'électricité. Cette découverte fut annoncée; plusieurs savans, et principalement ceux d'Italie, parmi lesquels on distingue Volta, s'empressèrent d'ajouter aux travaux de l'inventeur. La Société de Médecine d'Édimbourg crut devoir faire de ce point de physiologie le sujet d'un des prix qu'elle distribue chaque année, et couronna l'ouvrage du professeur Crève, de Mayence, dans lequel le terme d'*irritation métallique* (*irritamentum metallorum*) se trouve substitué à celui d'*électricité animale*. Cette nouvelle dénomination est essentiellement mauvaise, puisqu'elle tend à faire croire que l'irritation par les métaux peut seule détermi-

ner les phénomènes galvaniques, tandis que le charbon, l'eau et beaucoup d'autres substances peuvent également les produire. On a également renoncé au nom d'*électricité animale*, malgré l'identité reconnue entre les effets de l'électricité et ceux du galvanisme, pour employer de préférence ce dernier terme, qui, pouvant s'appliquer à la généralité des phénomènes, éternise la mémoire de leur premier observateur (1).

Pour donner naissance aux effets galvaniques, il

---

(1) Sulzer, dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, et dans sa *Théorie générale du Plaisir*, ouvrage publié en 1757, et inséré en 1769 dans un recueil imprimé à Bouillon, sous le titre de *Temple du Bonheur*, tome III, page 124, avoit annoncé que, deux lames de différens métaux étant placées l'une en dessus et l'autre en dessous de la langue, et inclinées l'une vers l'autre par leurs extrémités au moment où elles se touchent, on éprouve une saveur piquante, assez souvent accompagnée d'une espèce de lueur qui passe devant les yeux.

Cotugno rapporte, dans le Journal encyclopédique de Bologne, 1786, n° 8, qu'un élève en médecine, disséquant une souris vivante, fut fort surpris d'éprouver dans la main une commotion électrique en touchant avec son scalpel l'un des nerfs de l'animal.

Ce fut seulement en 1789 que Galvani commença ses expériences. Il n'en est pas moins regardé comme inventeur, parce qu'en supposant qu'il connût les expériences précédentes, leurs auteurs n'en avoient tiré aucune conséquence; tandis qu'au contraire Galvani, les répétant, les variant, les multipliant, reconnut le premier l'existence d'une sorte d'électricité dans l'économie animale.

faut établir une communication entre deux points, d'une série d'organes nerveux et musculaires. De cette manière, on forme un *cercle* dont un *arc* est composé par les parties animales que l'on soumet à l'expérience, tandis que l'autre *arc* est figuré par les instrumens *excitateurs*, qui consistent le plus souvent en plusieurs pièces, dont les unes, placées sous les parties animales, se nomment *supports*; tandis que d'autres, destinées à établir communication entre ces derniers, sont appelées *communicateurs*.

Pour former un cercle galvanique complet, prenez une cuisse de grenouille dépouillée de sa peau, détachez le nerf crural jusqu'au genou, appliquez-le sur une plaque de zinc; faites reposer sur une plaque d'argent les muscles de la jambe, puis achevez l'*arc excitateur*, et complétez le cercle galvanique en établissant communication entre les deux supports au moyen d'un fil de fer, de cuivre, d'étain ou de plomb : au moment où le communicateur touchera les deux supports, une partie de l'*arc animal*, formée par les muscles de la jambe, entrera en convulsion. Quoique cette disposition des parties animales et des instrumens galvaniques soit la plus favorable au développement de ces phénomènes, on peut varier beaucoup la composition de l'arc animal et de l'arc excitateur. Ainsi l'on obtient des contractions en plaçant les deux supports sous le nerf, et en laissant les muscles hors du cercle galvanique; ce qui

prouve que les nerfs constituent essentiellement l'arc animal. Enfin le cercle galvanique peut être entièrement animal ; pour cela, prenez une grenouille bien vive, c'est-à-dire jouissant d'une forte contractilité : après avoir isolé le paquet des nerfs lombaires, présentez ces nerfs à la cuisse de la grenouille ; au moment du contact, le membre entrera en convulsion. Le professeur Aldini est le premier auteur de cette expérience, qui est vraiment une des plus curieuses, en ce qu'elle nous conduit plus directement à expliquer l'influence des nerfs sur les organes musculaires.

Il n'est pas nécessaire que les nerfs soient intacts pour que les contractions aient lieu ; elles s'observent, soit que ces organes aient été liés, soit qu'ils aient été coupés, pourvu qu'il y ait simple contiguité entre les deux bouts résultans de cette section. Ceci prouve qu'on ne peut rigoureusement conclure de ce qui arrive dans les phénomènes galvaniques à ce qui s'opère dans l'action musculaire, puisqu'il suffit qu'un nerf, dans l'homme, soit coupé ou serré par une ligature, pour que les muscles auxquels il se distribue perdent la faculté de se mouvoir. J'ai cependant observé qu'en désorganisant par une forte contusion le nerf qui forme la totalité, ou seulement une partie de l'arc animal, on interrompt ou au moins l'on rend plus difficile le courant galvanique.

L'épiderme est un obstacle au développement

des effets galvaniques; ils se manifestent toujours foiblement dans les parties qui en sont recouvertes. Lorsqu'il est humide, mince et délicat, il ne les interrompt pas tout-à-fait; et de là on déduit la possibilité de faire sur soi-même les expériences suivantes :

Mettez sous la langue une plaque de zinc; appliquez une plaque d'argent à la face supérieure de cet organe; faites-les toucher l'une et l'autre, et vous percevrez une saveur acerbe, accompagnée d'un léger frémissement. Appliquez sur les yeux deux pièces métalliques hétérogènes, puis faites-les communiquer, et vous apercevrez des étincelles. Placez un morceau d'argent dans la bouche; introduisez dans l'anus un gland d'étain, de cuivre ou de tout autre métal; établissez communication avec un fil de fer : ce long muscle creux, qui de la bouche s'étend jusqu'à l'anus en formant la base du canal digestif, éprouve une secousse marquée : on est parvenu ainsi à purger doucement, en occasionant des coliques légères. Humboldt, après avoir détaché l'épiderme de la nuque et du dos, au moyen de deux vésicatoires, fit appliquer des métaux sur les parties découvertes, et ressentit dans chacune de vifs picotemens, accompagnés d'une excrétion séro-sanguinolente, au moment où l'on établit la communication.

On peut construire l'*arc excitateur* avec trois, deux, ou même un seul métal; avec des alliages, des amalgames ou autres combinaisons métalli-

ques et minérales; avec des substances charbonneuses, etc. (1) : et l'on observe que les métaux, qui sont en général les excitateurs les plus puissans, sollicitent avec d'autant plus d'avantage les contractions qu'ils offrent une plus large surface. Les métaux sont plus ou moins excitateurs; ainsi l'on observe que le zinc, l'or, l'argent, l'étain, tiennent le premier rang, puis le cuivre, le plomb, le nikel, l'antimoine, etc., sans qu'on puisse trouver aucun rapport entre ces divers degrés de puissance excitante et leurs propriétés physiques, comme leur pesanteur, leur malléabilité, etc.

CLXIX. Il en est de la susceptibilité galvanique comme de l'irritabilité musculaire : elle s'épuise par un exercice trop prolongé, et se répare lorsqu'on laisse quelque temps les parties en repos. L'immersion des nerfs et des muscles dans l'alcohol et les dissolutions opiacées affoiblit et va même jusqu'à éteindre cette susceptibilité, de la même manière sans doute que, dans l'homme vivant, l'usage immodéré de ces substances engourdit et paralyse l'action musculaire. L'immersion dans l'acide hydrochlorique redonne aux parties fatiguées le pouvoir de répondre aux stimulus. Humboldt a observé que la saison du printemps,

---

(1) Je me suis servi avec succès, pendant l'hiver de 1800, de glaçons employés, soit comme *supports ou armatures*, soit comme *communicateurs*.

comme la jeunesse des grenouilles, favorisoit la naissance des phénomènes, et que les pates antérieures de ces reptiles, avec lesquelles le mâle se cramponne sur le dos de la femme en serrant ses côtés, sont plus excitables que ses pates postérieures; tandis que, dans l'autre sexe, ces dernières sont au contraire celles qui jouissent de la plus grande susceptibilité. Hallé s'est assuré, par des expériences faites à l'École de Médecine de Paris, que les muscles des animaux tués par des décharges répétées d'une batterie électrique éprouvent un accroissement de susceptibilité galvanique; que cette propriété subsiste sans altération dans les animaux asphyxiés, par la submersion dans le mercure, par le gaz hydrogène pur, hydrogène carboné, acide hydrochlorique, et acide sulfureux, par la strangulation, par la privation d'air dans la machine pneumatique; qu'elle est affoiblie après les asphyxies par submersion, par les gaz hydrogène sulfuré, azote et ammoniac, et qu'enfin elle est absolument anéantie dans les animaux que suffoque la vapeur du charbon. Le printemps est la saison pendant laquelle les expériences galvaniques réussissent le mieux; un surcroît de vie semble alors animer tous les êtres; c'est aussi vers cette époque que le plus grand nombre travaille à la reproduction des espèces.

CLXX. La susceptibilité galvanique s'éteint dans les muscles des animaux à sang chaud à mesure que la chaleur vitale se dissipe. Quelquefois même,

lorsque la vie de ces animaux s'est terminée par des mouvemens convulsifs, la contractilité ne peut plus être mise en action, quoique la chaleur ne soit point complétement éteinte, comme si cette propriété vitale se consumoit par les convulsions au milieu desquelles ces animaux rendent les derniers soupirs. Dans ceux à sang froid, au contraire, la susceptibilité est plus durable : longtemps après avoir été séparées du tout, et même jusqu'au moment où la putréfaction s'en empare, des cuisses de grenouilles répondent aux stimulans galvaniques, sans doute parce que, chez ces animaux, la contractilité est liée d'une manière moins intime à la respiration, que la vie est moins une, qu'elle est plus partagée en différens organes qui ont moins besoin d'agir les uns sur les autres pour l'exécution de ses phénomènes.

La contractilité est donc, comme je l'ai prouvé dans un autre ouvrage, trop peu durable chez l'homme pour que les expériences galvaniques tentées après sa mort puissent fournir quelques lumières sur l'affoiblissement plus ou moins considérable de cette propriété vitale dans les diverses maladies. Les auteurs qui ont avancé que la susceptibilité galvanique est plutôt éteinte dans les cadavres des personnes mortes d'affections scorbutiques que dans ceux qui ont succombé à des maladies inflammatoires ont donc hasardé une conjecture assez probable, mais qui ne peut être confirmée par l'expérience.

CLXXI. *Appareil de Volta*, ou *pile galvanique.* Curieux de déterminer les rapports soupçonnés par plusieurs physiciens entre l'électricité et le galvanisme, Volta a imaginé l'appareil suivant, qui se trouve décrit, aussi-bien que les effets qu'il produit, dans un mémoire présenté par ce savant à la société royale de Londres. Ces effets prouvent la plus frappante analogie entre ces deux ordres de phénomènes, comme on va le voir par leur exposé succinct. Élevez une pile, en posant successivement une plaque de zinc, une plaque de carton mouillé (1), une plaque d'argent, puis une seconde plaque de zinc, etc., jusqu'à ce que la pile ait plusieurs pieds d'élévation; car les effets qu'elle produit sont d'autant plus marqués qu'elle est plus élevée; puis touchez à la fois les deux extrémités de la pile avec un même fil de fer : au moment du

---

(1) Les expériences de MM. Traill, Cumming et Marsh (*philosophical Magazine*, november 1823) viennent de prouver que la chaleur peut tenir la place de l'humidité, en sorte qu'il suffit d'échauffer un appareil électro-galvanique pour que l'électricité s'y développe par le simple contact des métaux hétérogènes et sans interposition d'un corps humide. Ces expériences ont fait découvrir de nouveaux rapports entre le magnétisme et l'électricité, en manifestant l'influence d'un circuit thermo-électrique sur de l'aiguille aimantée. La chaleur, la lumière, l'électricité, tous ces agens que nous nommons impondérables, ne seroient-ils que des modifications du même principe, ou mieux des propriétés de ce que les anciens philosophes appeloient l'*âme* du monde?

contact il s'excite une étincelle aux extrémités de la pile, et souvent on aperçoit en même temps des points lumineux, à différentes hauteurs, aux endroits où le zinc et l'argent se touchent. Éprouvée par l'électromètre de Coulomb, l'extrémité de la pile qui répond au zinc paroît électrisée positivement; celle qui est formée par l'argent donne au contraire les signes d'électricité négative ou résineuse.

Si, après avoir mouillé les deux mains, en les trempant dans l'eau, ou mieux encore dans une dissolution saline, on touche les deux extrémités de la pile, on ressent dans les articulations des doigts et des coudes une commotion suivie d'un picotement incommode.

Cet effet peut être ressenti par plusieurs personnes qui se tiennent par la main, comme dans l'expérience de Leyde; il est d'autant plus sensible, la composition de la pile étant d'ailleurs la même, que la chaîne est composée d'un plus petit nombre d'individus, et qu'ils sont mieux isolés.

La pile de Volta s'électrise constamment d'elle-même; ses effets paroissent augmenter à mesure qu'on les sollicite, et se renouvellent bientôt avec plus de force, lorsqu'on les a affoiblis par de puissantes décharges, tandis qu'une bouteille de Leyde, une fois déchargée, a besoin d'être électrisée de nouveau. Celle-ci perd d'ailleurs, par l'humidité, ses propriétés électriques, tandis que celles de la pile restent les mêmes, quoique l'eau ruisselle de

tous côtés, et ne s'éteignent que par l'immersion entière dans ce liquide. Par la découverte de sa pile, Volta a donc rendu un service immense à cette partie de la physique qui traite de l'électricité.

Si l'on introduit dans un tube rempli d'eau, et hermétiquement fermé par deux bouchons de liége, les extrémités de deux fils d'un même métal, qui, par l'autre extrémité, sont en contact, l'un avec le sommet, l'autre avec la base de la pile galvanique, ces deux bouts, rapprochés à la distance de quelques lignes, éprouvent des changemens manifestes au moment où l'on touche les extrémités de la pile. Le fil, en contact avec l'extrémité de la pile qui répond au zinc, se couvre de bulles de gaz hydrogène; celui qui touche l'extrémité formée par l'argent s'oxide. Si l'on rapproche les bouts de fil qui plongent dans l'eau, et qu'on les fasse se toucher, tout effet cesse : il ne se fait plus ni dégagement de bulles d'une part, ni oxidation de l'autre. Les plaques de zinc et d'argent s'oxident également dans la pile, mais seulement par les surfaces qui touchent le carton mouillé, et très-peu, ou point du tout, par la surface opposée, etc.

Les propriétés de la pile de Volta et de tous les appareils électriques analogues, tels que la couronne à tasses, tiennent à celle qu'ont deux métaux hétérogènes en contact de se constituer dans deux états d'électricité différente, l'une positive, et l'au-

tre négative. D'autres corps dans la nature jouissent de la même propriété de se mettre, par le simple contact, dans un état électrique, c'est-à-dire de produire la plupart des phénomènes qui dénotent l'accumulation de l'électricité, tels que des secousses, des irritations, des étincelles. Le nouvel appareil électrique est devenu, entre les mains des chimistes, le plus puissant moyen d'analyse. « On a trouvé, dit M. Davy (1), que divers corps « composés étoient susceptibles de décomposition « par l'électricité; et des expériences que j'ai eu « le bonheur de faire ont prouvé que plusieurs « substances qui, dans tous les procédés auxquels « elles avoient été soumises n'avoient jamais subi « de transformation, étoient susceptibles d'ana- « lyse par les forces électriques; ainsi on a montré « que les alkalis fixes et la plupart des terres « étoient des métaux combinés avec l'oxigène; di- « vers agens nouveaux ont été ainsi procurés à la « chimie, et ils ont fait découvrir plusieurs résul- « tats qui, en même temps qu'ils ont confirmé « quelques-unes des doctrines de l'école de Lavoi- « sier, en ont renversé d'autres, et ont prouvé « que les idées générales des phisolophes antiphlo- « gisticiens n'avoient pas anticipé sur la masse « entière des découvertes. »

Les êtres organisés, et spécialement le corps

---

(1) Elements of chemical philosophy by sir Humphry Davy. London, 1812, p. 1, v. 1.

de l'homme, composés par l'assemblage d'un grand nombre de substances hétérogènes en contact, nous présentent de véritables appareils électriques compliqués, dans lesquels le principe dont les nerfs sont les conducteurs, semble agir d'une manière analogue à celle de l'électricité. Depuis long-temps on avoit reconnu dans certains poissons le pouvoir d'engourdir la main qui les touche, ou même d'exercer, à une certaine distance, cette faculté torporifique, de manière à paralyser les animaux dont ils font leur proie, et à les empêcher de fuir. Redi et plusieurs physiciens avoient vainement cherché à expliquer ce phénomène, lorsque Valsh, membre de la Société royale de Londres, démontra l'identité de la vertu de la torpille et de l'action du fluide électrique (1). L'anguille de Surinam (*gymnotus electricus*) jouit de la même propriété que la raie torpille ; trois autres espèces de poissons sont douées du même pouvoir, mais à un degré plus foible (2). John Hunter a le premier fait connoître l'organe dans lequel réside cette singulière propriété. Aux deux côtés du crâne et de la poitrine de la torpille existe un appareil membraneux, formé de lames et de tuyaux multipliés, dont l'intérieur est partagé lui-même par un grand nombre de cloisons sur lesquelles beaucoup de nerfs se

(1) Of the electric property of the torpedo. London, 1774.

(2) Ce sont un tétrodon, un trichiure et un silure. *Voyez* Lacépède, Histoire naturelle des poissons.

répandent. L'animal paroît doué de la faculté de développer l'électricité par le frottement et le contact mutuel de cette multitude de surfaces humides ; il produit une quantité de fluide électrique tellement surabondante, qu'il peut décharger à plusieurs reprises cet appareil fulminant, engourdir ainsi la main du pêcheur qui veut le saisir, et frapper de stupeur les poissons qui se trouvent à sa portée. Les organes torporifiques de l'anguille de Surinam sont encore plus puissans. Les surfaces humides que présentent ces organes, au nombre de quatre, offrent une étendue plus considérable ; aussi ce gymnote peut-il engourdir et tuer de grands animaux, des chevaux et des mulets, par exemple (1). Tel est l'appareil particulier auquel certains êtres doivent la propriété singulière de développer une somme d'électricité supérieure à celle qu'exigent les besoins de la vie.

Galvani s'aperçut bientôt de l'analogie des phénomènes offerts par la torpille avec ceux que le hasard lui avoit fait découvrir ; il fit voir qu'une grande quantité de nerfs se rendent aux surfaces multipliées des organes électriques : l'ablation du cerveau et de la moelle épinière, la section des nerfs, ôtent à la torpille sa vertu engourdissante ; de sorte qu'ici, comme dans tous les animaux, les nerfs jouent le rôle principal dans la pro-

(1) Humboldt. *Voyage aux régions équinoxiales*, etc.

duction de l'électricité animale. Sans leur influence, les appareils électriques que possèdent narurellement certains animaux ne pourraient donner naissance aux phénomènes que produit, sans le concours d'aucune force étrangère, une suite de métaux hétérogènes séparés par des corps humides.

Dans l'état actuel de la science, le galvanisme appartient davantage aux sciences physico-chimiques qu'à celle de l'économie animale ; ses effets sur nos organes sont analogues à ceux de l'électricité. Cependant les expériences faites par Hallé et Thillaye prouvent que les effets de la pile pénètrent et affectent les organes nerveux et musculaires plus profondément que les appareils électriques ordinaires ; qu'ils provoquent de vives contractions, des sensations fortes de picotement et de brûlure, dans les parties que leur état maladif rend insensibles aux étincelles, et même aux commotions électriques. Un homme dont tous les muscles du côté gauche de la face étoient paralysés n'éprouvoit aucun effet de la commotion électrique. On le soumit à l'action galvanique d'une pile de cinquante étages, en faisant communiquer, au moyen de chaînes et d'excitateurs métalliques, les deux extrémités de la pile avec différens points de la joue malade : au moment du contact, tous les muscles de la face entrèrent en convulsion, avec chaleur, douleur, etc. Ces essais, répétés pendant

plus de six mois, ont à peu près ramené les parties à leur état naturel.

Le professeur Alibert a appliqué le galvanisme, avec un succès encore plus marqué, sur un prêtre frappé d'hémiplégie. Ce malade, couché dans les salles de l'hôpital Saint-Louis, a recouvré le mouvement du côté paralysé d'une manière assez marquée pour pouvoir marcher presque sans aide, et se servir de son bras droit pour satisfaire à ses besoins. Le traitement a duré plusieurs mois. La pile dont on a fait usage étoit composée de cinquante étages, zinc et cuivre. J'ai employé le même appareil sur un officier suédois qui a réclamé mes soins pour une surdité incomplète, jusqu'alors rebelle à tous les moyens connus, administrés dans divers pays d'Allemagne. De fortes commotions électriques, conseillées par Hufeland, avoient dissipé en grande partie la dureté de l'ouïe ; mais cette amélioration n'étoit que temporaire : elle a cessé avec l'administration de l'électricité. Dès la première épreuve galvanique, j'ai obtenu le même effet. L'extrémité d'un conducteur étant mise dans le conduit auditif externe du côté droit (mouillé avec une dissolution de muriate d'ammoniaque, aussi-bien que les rondelles d'étoffe qui entrent dans la composition de la pile), la main gauche, trempée dans la même liqueur, touche un conducteur placé au pôle cuivre ; aussitôt une irritation, suivie de picotemens douloureux, s'établit dans l'oreille, dont le pavillon rougit d'une manière

remarquable. L'organe cérébral participe à l'excitement, les yeux entrevoient des bluettes ; et l'effet est tel, qu'après être resté quelques minutes dans le cercle galvanique fermé, le malade éprouve une sorte d'ivresse. J'ai porté comme on l'a fait à Berlin, une irritation encore plus directe sur l'oreille droite, qui est la plus dure, en introduisant derrière le voile du palais, sur l'orifice guttural de la trompe d'Eustache, le bouton qui termine le conducteur du pôle zinc ; j'ai encore fait répondre cette extrémité à une surface dénudée par le vésicatoire derrière cette oreille malade.

Pour employer le galvanisme dans la paralysie de la vessie, il faudroit placer le conducteur du pôle zinc dans le rectum, celui de l'autre pôle devant répondre à un vésicatoire appliqué au-dessus du pubis, ou bien à la partie supérieure de la cuisse. Dans la femme, on devroit préférer le vagin au rectum ; les parties molles qui font l'office de conducteurs humides remplissant d'autant mieux cette destination qu'elles ont moins d'épaisseur. Le galvanisme est donc un stimulant énergique des forces vitales : on peut l'employer avec beaucoup d'avantage dans toutes les paralysies du sentiment et du mouvement. Il agit comme irritant ; il rubéfie la peau à laquelle on l'applique, en y déterminant l'abord du sang et un développement plus considérable de chaleur. Monro se procuroit à volonté une hémorragie nasale en

l'appliquant à la membrane pituitaire. J'ai fait diverses expériences qui ont pour but de constater l'efficacité du galvanisme dans les tumeurs blanches des articulations, et dans les ulcères qui pèchent par défaut de ton, tels que ceux qui ont le scorbut pour complication ou pour cause, etc. : dans tous ces cas, il agit comme résolutif et comme tonique. Les asphyxies sont les cas dans lesquels on peut se promettre les plus grands avantages du galvanisme, pourvu qu'on en fasse l'application avant que toute la chaleur vitale soit éteinte.

La cause productrice des phénomènes galvaniques n'est probablement autre chose que le principe vital lui-même, ou plutôt la vie et ses propriétés, dans les êtres qui en sont doués, sont un produit de cette modification de l'électricité à laquelle on donne le nom de *galvanisme*. Les médecins allemands ne se contentent pas de proposer cette opinion comme une simple conjecture; selon eux, tous les phénomènes que les corps organisés présentent tiennent à la diversité de leurs organes, au mélange de leurs parties, *miscellæ partium* (1). Tout dans l'homme, comme dans le reste de la nature, existe sous l'empire de deux forces opposées; tout est attraction ou répulsion, dilatation ou condensation; le magnétisme, l'électricité, la lu-

(1) Prochaska, Sprengel, Ritter, Hildebrandt, Autenrieth, etc.

mière, la chaleur, le son, le galvanisme, tous ces élémens impondérables présentent ces deux forces opposées, attirent ou repoussent, sont dans un état positif ou négatif. Ces élémens impondérables, plus ou moins adhérens à nos organes, en déterminent l'action différente, suivant que, par leur nature diverse, nos parties jouissent d'une propriété conductrice ou isolante de ces agens de la nature. Les phénomènes magnétiques, électriques, galvaniques, ont en effet de nombreuses ressemblances avec les phénomènes de la vie. Leurs principes ne sont pas soumis aux lois ordinaires de la matière, ne gravitent point vers le centre de la terre, ont une action qui, en s'exerçant, ne tend point essentiellement à s'épuiser et à s'affoiblir comme toutes les actions chimiques et mécaniques; en outre, les substances impondérables agissent à des distances plus ou moins grandes, tandis que toute action chimique ou mécanique suppose le contact immédiat; elles agissent avec une rapidité presque incommensurable, pénètrent les corps sans obstacle, et se propagent sans confusion dans des directions infiniment variées, et souvent opposées. Le son, la chaleur, la lumière, offrent à cet égard des propriétés analogues à celles du fluide électrique; les rayons lumineux, comme les rayons sonores, se croisent sans confusion, se divisent et se multiplient à l'infini, etc., etc. La pensée, ce résultat merveilleux de l'organisation, n'offre rien de plus rapide, rien

de plus compliqué, rien de plus inconcevable dans ses phénomènes que les singulières actions du magnétisme, de l'électricité et du galvanisme.

Les dernières recherches des physiciens viennent d'établir que le principe des phénomènes du magnétisme est identique avec l'électricité. Qui pourroit assurer que la lumière et la chaleur ne sont pas elles-mêmes des modifications de ce principe universel, dont le soleil, centre de notre système, seroit alors le vaste réservoir? Masse opaque, immense, auprès de laquelle la terre paroît un atome, tournant sur lui-même avec une extrême rapidité, environné d'une atmosphère beaucoup plus dense que la nôtre (Newton); atmosphère que terminent des nuages phosphorescens ou lumineux (Herschell) (1), le soleil ne produit-il point, en vertu de son mouvement giratoire et des énormes frottemens qui en résultent, une continuelle émission de chaleur et de lumière, par un mécanisme analogue à celui qui dans les machines électriques donne naissance aux étincelles? Enfin les révolutions des planètes, comme la vie des corps qui existent à leur surface, ne dépendroient-elles point de cette cause unique?

Si les progrès des sciences donnent jamais à ces

---

(1) L'existence de cette atmosphère incandescente paroît confirmée par les phénomènes de la polarisation de la lumière. Arrago, 1824.

probabilités la certitude d'une démonstration mathématique, le système du monde auquel appartient la terre seroit enfin expliqué. Alors de cette connoissance sublime l'homme pourroit s'élever peut-être à l'étude plus difficile et plus vaste encore du mécanisme de l'univers, tout infini pour l'intelligence humaine, et dont notre monde n'est visiblement que l'une des innombrables parties. A la vue d'un aussi grand spectacle, l'esprit humain s'étonne et demeure comme anéanti. Toutefois, si nous portons les yeux sur la route déjà parcourue, le sentiment de notre foiblesse diminue, et les connoissances acquises servant de base, l'on conçoit l'espoir raisonnable de s'élever par degrés aux vérités de l'ordre le plus élevé. L'homme en seroit moins éloigné sans doute, s'il n'avoit été détourné de cette recherche par la multitude de systèmes ridicules dont fut bercée l'enfance de notre espèce; systèmes dont les auteurs ignorans et vains se firent sans hésiter le centre de l'univers, en cela semblables à ces misérables habitans de quelque îlot perdu dans les vastes espaces de l'Océan, et qui, ne connoissant rien au delà de leur horizon, s'imaginent que c'est pour eux seuls qu'existe tout ce qu'ils sont capables d'apercevoir.

Un même principe répandu dans toute la nature est donc très-probablement la source ou la cause première de l'existence, et tous les êtres n'en sont que des modifications diverses. Cet agent, ou plutôt ce

principe universel, représente ce que les anciens philosophes avoient appelé l'âme du monde, *anima mundi*, cause active de tous les mouvemens que nous présentent la matière inerte et les êtres organisés; esprit subtil qui, pénétrant tous les corps et se mêlant à leur substance, donne naissance à des phénomènes variés comme leur composition (1). Ainsi que les philosophes platoniciens le pensoient, ce principe n'est point séparé de la matière, et celle-ci ne peut pas être considérée comme complétement inerte; essentiellement active, douée de forces toujours agissantes, et d'une constante énergie, elle renferme en soi la raison suffisante des phénomènes. Mais tous ces phénomènes sont-ils les résultats mathématiques d'un petit nombre de lois générales, comme on n'a pas

---

(1) Tous les progrès des sciences physiques chez les modernes nous ramènent, comme on voit, à la doctrine de Pythagore, adoptée par l'école du Portique. Seulement les découvertes des modernes tendent à substituer à ces aperçus vagues, quoique sublimes, de l'ancienne philosophie, une théorie appuyée sur des faits observés avec précision. En traitant de semblables matières, qui ne se rappelle ces beaux vers où le chantre d'Énée expose les idées reçues de son temps ?

Principio cœlum. . . . . .

. . . . . .

Spiritus intùs alit, totamque infusa per artus
Mens agitat molem, et magno se corpore miscet.

Æneidos lib. VI, v. 724.

craint de l'affirmer récemment (1); et ces lois générales régissent-elles à la fois les êtres vivans et les corps non organisés, malgré les prodigieuses différences qui existent entre eux? Laissons la philosophie spéculative, au défaut de faits et d'expériences, se complaire dans le vague des conjectures et dans le vide des hypothèses : n'anticipons point sur l'avenir; et, après avoir signalé l'écueil contre lequel sont venus se briser les efforts des philosophes et des médecins d'Allemagne, tâchons du moins de l'éviter.

CLXXII. *Considération générale du système osseux.* L'homme, comme tous les animaux à sang rouge (*mammifères*, *oiseaux*, *reptiles et poissons*), a un squelette intérieur formé d'un grand nombre d'os articulés, et mis en mouvement par les muscles qui les recouvrent. Les animaux à sang blanc n'ont point d'os à l'intérieur; des parties dures, écailleuses ou pierreuses, les enveloppent et forment ce que l'on nomme leur squelette extérieur. Enfin il est des animaux absolument dépourvus de parties dures; ce sont les zoophytes, plusieurs vers et quelques insectes. La composition intime de la substance des os est à peu près la même dans tous les animaux, de la gélatine et des sels à base

---

(1) La Place, *Considérations sur la Théorie des phénomènes capillaires*, mémoire lu à l'Académie des sciences, le 13 septembre 1819.

calcaire. Le squelette extérieur des animaux à sang blanc ressemble bien plus à l'épiderme de ceux à sang rouge qu'à leur système osseux. Comme l'épiderme, il se détruit et se renouvelle; c'est ainsi que la coquille de l'écrevisse éclate chaque année, lorsque le corps de ce crustacé augmente de volume et se remplace par une nouvelle enveloppe, qui, d'abord très-molle, acquiert par degrés la même consistance que la première. Enfin le squelette des oiseaux diffère de celui de tous les autres animaux en ce que ses principales pièces sont percées de conduits communiquant avec les poumons, et toujours remplis d'un air raréfié par la chaleur vitale; ce qui concourt puissamment à leur donner la légèreté spécifique, si nécessaire à leur mode particulier d'existence.

Le système osseux sert de fondement à la machine animée, prête un appui solide à toutes ses parties, détermine la grandeur du corps, ses proportions, sa forme et son attitude. Sans les os, le corps n'auroit point de forme constante, et ne pourroit que difficilement changer de place. Lorsque, par la perte du sel calcaire, auquel ils doivent leur dureté caractéristique, ces organes se ramollissent, les membranes se déforment, la station et les divers mouvemens progressifs finissent même par devenir impossibles. Tels sont les effets du rachitis, maladie dont la nature est aujourd'hui bien connue, sans que pour cela on soit plus éclairé sur la manière d'agir des causes qui la produi-

sent, et sur les remèdes qu'il convient de lui appliquer.

La colonne vertébrale forme la partie vraiment essentielle et fondamentale du squelette ; on peut la regarder comme la base de l'édifice osseux, comme l'aboutissant de tous les efforts, comme le centre sur lequel les os s'appuient dans leurs divers mouvemens, puisque tous les ébranlemens, toutes les secousses un peu considérables viennent s'y faire ressentir. De plus, elle renferme dans le conduit dont elle est percée la masse nerveuse de laquelle émanent le plus grand nombre des nerfs du corps.

Pour servir de soutien à toutes les parties, protéger en même temps l'organe délicat qu'elle loge dans son épaisseur (1), et se prêter aux attitudes variées qu'exigent les besoins de la vie, la colonne vertébrale devoit réunir à une extrême solidité une mobilité assez grande : elle possède ces deux

---

(1) Le mode de développement des vertèbres est lui-même accommodé à la délicatesse de la moelle épinière : long-temps formée de plusieurs pièces que des cartilages séparent, la circonférence de la large ouverture dont ces os sont percés peut s'agrandir à mesure que la moelle de l'épine grossit avec l'âge. Le contour du trou de l'occipital, et celui de la première vertèbre, os qui correspondent aux parties les plus épaisses de cette moelle, est, à cause de cela, formé de quatre pièces distinctes, séparées par des cartilages dans le premier de ces os, et de cinq dans le second.

avantages, et tient le premier de la largeur des surfaces par lesquelles sont articulés les os qui la composent, du volume, de la longueur, de la direction, de la force de leurs apophyses, et de la multitude des muscles et des ligamens qui s'y attachent, et vont de l'un à l'autre; tandis qu'elle doit le second au grand nombre de pièces osseuses qui entrent dans sa formation. Chaque vertèbre est peu mobile; mais toutes pouvant se mouvoir à la fois, leurs mouvemens s'ajoutent les uns aux autres; il en résulte un mouvement total, considérable; mouvement général que l'on évalue en multipliant les mouvemens partiels par le nombre des vertèbres.

Le centre des mouvemens, par lesquels la colonne vertébrale s'étend ou se ploie, en s'inclinant en arrière ou en avant, ne se trouve ni dans l'articulation des apophyses obliques de chaque vertèbre, comme l'a dit Winslow, dans les Mémoires de l'Académie des sciences pour l'année 1730; ni dans la symphyse cartilagineuse qui unit leurs corps, l'extension et la flexion des vertèbres ne s'exécutent point non plus sur deux centres de mouvement, dont l'un seroit dans cette symphyse, et l'autre dans les articulations des apophyses articulaires, comme l'ont pensé Cheselden et Barthez, mais plutôt sur un axe que traverseroit l'os entre son corps et sa grande ouverture. La partie antérieure de l'os et son apophyse épineuse exécutent autour de cet axe imaginaire des

mouvemens d'arc de cercle, qui, pour être peu étendus, n'en sont pas moins marqués ; et dans ces mouvemens, tantôt les surfaces articulaires que sépare le cartilage intervertébral se rapprochent antérieurement, et cette substance se trouve comprimée, tandis que les apophyses obliques glissent l'une sur l'autre et tendent à s'abandonner; c'est ce qui arrive dans la flexion du tronc, tandis que, dans son redressement, les parties antérieures des surfaces s'éloignent, les postérieures se rapprochent, et finissent par se toucher, quand l'extension du tronc est poussée aussi loin que le permettent les apophyses épineuses.

L'usage de cette rangée d'éminences qui s'élèvent de la partie posterieure des vertèbres est de mettre des bornes au renversement du tronc en arrière, et de faire que les muscles qui le redressent agissent par un bras de levier plus avantageux. Lorsque, par l'habitude d'une position habituellement redressée, on a empêché ces apophyses de se développer suivant leur direction, le tronc peut être tellement renversé en arrière, que le corps figure dans ce sens un plus ou moins grand arc de cercle. C'est ainsi que, dès la plus tendre enfance, l'on exerce les bateleurs, qui nous étonnent par la prodigieuse souplesse de leurs reins, à se renverser sur eux-mêmes de manière à changer la direction naturelle des apophyses épineuses.

Il étoit important que les mouvemens de la

colonne vertébrale s'exécutassent dans un grand nombre d'articulations à la fois ; par-là les inflexions sont plus légères, et l'organisation de la moelle de l'épine, qui avoit besoin de si grands ménagemens, n'est point altérée. Les pièces fibro-cartilagineuses, qui unissent ensemble les corps des vertèbres entre lesquelles elles sont placées, douées d'une grande élasticité, comme tous les corps de cette nature, soutiennent avec avantage le poids du corps. Lorsque la pression qu'elles éprouvent est long-temps continuée, elles s'affaissent un peu, leur épaisseur diminue, et cet effet se passant à la fois dans toutes les lames intervertébrales, notre stature s'abaisse sensiblement. Le corps est, à cause de cela, toujours plus petit le soir que le matin ; et cette différence de grandeur peut être portée assez loin, comme Buffon en rapporte des exemples. Le fils de l'un de ses plus zélés collaborateurs (M. Guéneau de Montbeillard, auquel est due la plus grande partie de l'histoire des oiseaux), jeune homme d'une taille élevée (cinq pieds neuf pouces), arrivé au terme de son accroissement, avoit perdu dix-huit lignes, après avoir passé toute une nuit au bal. Cette différence de grandeur tient en même temps à l'affaissement du tissu cellulaire graisseux qui se trouve au talon, et forme, dans toute l'étendue de la plante du pied, une semelle assez épaisse.

Le fémur est plus long dans l'homme que dans

les quadrupèdes, et cette grandeur proportionnelle de la cuisse lui donne l'avantage exclusif de pouvoir reposer son corps en *s'asseyant*.

Des deux os de la jambe, le tibia seul sert de colonne d'appui. Le péroné, placé à son côté externe, trop mince et trop grêle pour soutenir le poids du corps, n'a que des usages relatifs à l'articulation du pied, au côté externe de laquelle il est placé. Il soutient cette partie, et empêche son renversement en dehors par une abduction trop forte. Dans ce mouvement, le pied fait effort contre le péroné, qui se trouve d'autant plus courbé en dehors (1), que l'individu, étant plus avancé en âge, a exercé davantage cette force de résistance. Les animaux grimpeurs, l'écureuil, la

---

(1) Cette courbure, très-prononcée dans les chefs-d'œuvre de la sculpture antique, donne au bas de la jambe des plus belles statues une grosseur qui ne s'accorde guère avec nos idées actuelles sur l'élégance des formes; ce qui prouve, ce me semble, que le beau n'est pas invariable, comme l'ont dit bien des philosophes, et que cette perfection idéale n'est point exactement la même dans tous les siècles, chez les nations également civilisées. Il est facile de vérifier cette observation sur l'Apollon du Belvedère : ses genoux sont assez gros et rapprochés; le pied est déjeté en dehors, parce que le genou l'est en dedans; et cette forme est la plus belle expression de la nature, qui, donnant au fémur une direction oblique en dedans, ne fait ni des genoux parfaitement droits, ni des jambes dans lesquelles il existe, entre le *bas* et le *mollet*, une disproportion excessive.

fouine, etc., dont les pattes sont dans une abduction continuelle, ont aussi un péroné très-gros, et fortement courbé.

La multiplicité des pièces dont les pieds sont composés, outre qu'elle donne à ces parties une solidité plus grande, est encore utile pour que le corps ne soit point ébranlé avec trop de force par la percussion du sol dans nos divers mouvemens progressifs. Celui qui saute d'un lieu élevé cherche à tomber sur la pointe des pieds, afin que les mouvemens s'affoiblissent, en se transmettant dans les nombreuses articulations du tarse et du métatarse, et n'impriment pas au tronc et à la tête une secousse pénible, et souvent dangereuse. On sait qu'il suffit, dans une chute, que la plante des pieds porte tout entière, pour qu'il arrive des fractures aux cols des fémurs, des commotions au cerveau et dans les autres organes.

CLXXIII. *Structure des os.* Quelque différence que présente, au premier aspect, un os comparé avec un autre organe, sa composition est la même; des parties absolument semblables entrent dans sa structure, à l'exception d'une matière saline inorganique, qui, déposée dans les cellules de son tissu, lui donne sa dureté, sa solidité, principal caractère qui le distingue des parties molles. On sépare cet élément salino-terreux en tenant l'os plongé dans l'acide nitrique, étendu d'une suffisante quantité d'eau. On reconnoît alors que c'est un phosphate de chaux qui se décompose en cé-

dant à l'acide nitrique sa base calcaire. L'os, ainsi dépouillé du principe auquel il doit sa consistance, se ramollit, devient souple, flexible, et présente l'apparence d'un cartilage qui se résout enfin, par une longue macération, en un tissu cellulaire semblable à celui des autres parties. Dans ce tissu se répandent, même en assez grand nombre, des artères, des veines (1) et des vaisseaux lymphatiques. Les os sont donc des parenchymes celluleux, dont les aréoles contiennent une matière saline cristallisée, qu'ils séparent du sang, et dont ils s'encroûtent par une force inhérente et particulière à leur tissu. On arrive au même résultat en en faisant une analyse inverse. Si on soumet un os à une ébullition de quelques heures dans la machine de Papin, tout ce qu'il contient d'organique se dissout, entre en fusion, et fournit une gélatine abondante, après quoi il ne reste qu'une concrétion saline inorganique, que l'on peut également obtenir séparée, en calcinant les parties dures. Les proportions respectives de la partie saline avec la portion organisée varient beaucoup aux diverses époques de la vie; les os de l'embryon sont d'abord entièrement gélatineux. A l'époque de la naissance, et dans les pre-

(1) Il me semble que mieux vaut laisser à ces veines le nom sous lequel elles sont connues depuis plus de deux mille ans, que de leur substituer celui de *conduits veineux des os*.

mières années de la vie, la partie organique est en plus grande proportion : les os sont aussi moins cassans, plus flexibles, plus vivaces, et leurs fractures se consolident avec plus de promptitude et de facilité. Dans la jeunesse, la quantité des deux parties constituantes est à peu près égale. Il en est de même chez les adultes et chez les vieillards, quoique l'on ait long-temps pensé le contraire. C'est donc moins à la prédominance du phosphate calcaire (1) qu'à l'affoiblissement général, au ralentissement des mouvemens organiques qu'est due la difficulté avec laquelle les fractures se consolident chez les personnes d'un âge avancé. L'énergie des facultés vitales des os, leur flexibilité, leur élasticité, leur aptitude à se consolider quand leur continuité est détruite par un accident quelconque, sont dans un rapport absolument inverse des années.

Les anatomistes distinguent dans les os trois substances, qu'ils désignent par les noms de *compacte*, de *spongieuse*, et de *réticulaire*. La première, qui est la plus dure, accumulée au centre

(1) Les analyses chimiques des os y ont démontré la présence de plusieurs autres matières salines mêlées au phosphate de chaux ; mais ce sel formant à lui seul la plus grande partie de la substance à laquelle les os doivent leur dureté, nous avons cru qu'une exactitude minutieuse à rapporter dans cet ouvrage les produits des analyses chimiques les plus récentes ne seroit d'aucune utilité.

des os longs, endroit ou viennent aboutir les efforts qui s'exercent sur leurs extrémités, donne à cette partie moyenne la solidité dont elle avoit besoin pour y résister. On a diversement expliqué sa formation : les uns ont prétendu qu'elle n'étoit si dure que parce que les deux extrémités des os, en se développant, s'appuyoient sur la partie moyenne, comme la tige et les racines s'appuient sur le collet d'une plante. Haller dit qu'elle est formée par les battemens des artères nourricières qui pénètrent dans les os longs par la partie moyenne de ces os ; mais alors pourquoi ne s'en trouve-t-il pas autant vers leurs extrémités, qui reçoivent des artères aussi grosses et en plus grand nombre ? Dans le travail de l'ossification, cette substance paroît la première à la partie moyenne des os longs ; ce qui confirme l'assertion de Kerkringius, qui dit que nos os commencent à se durcir dans les endroits où ils doivent supporter les plus grands efforts.

La substance spongieuse est placée dans l'épaisseur des os courts et dans les extrémités des os longs, où son accumulation présente deux avantages, celui de donner à l'os, sans augmenter sa pesanteur, une grosseur considérable, au moyen de laquelle il s'articule avec les os voisins par de larges surfaces, ce qui étoit nécessaire à la solidité de leurs connexions ; et celui d'écarter de la ligne parallèle les tendons qui passent autour des articulations, d'agrandir l'angle sous lequel ils se

rendent aux os auxquels ils vont s'implanter, et d'augmenter ainsi l'efficacité de l'action musculaire. Les hypothèses mécaniques proposées par Haller et par Duhamel sur la formation de cette substance spongieuse, outre qu'elles sont peu satisfaisantes, paroîtront inutiles, si l'on fait attention que, dans les os gélatineux de l'embryon, les places que doit occuper la substance spongieuse, c'est-à-dire les extrémités des os longs dont on aperçoit les linéamens, paroissent plus volumineuses que le reste. Toutes les cellules de cette substance spongieuse communiquent ensemble ; elles sont tapissées par une membrane très-fine et remplies par le suc médullaire. Les lames qui, en s'entrecroisant de diverses manières, forment les parois des cellules, deviennent plus rares, plus minces ; le tissu spongieux s'épanouit en s'approchant de la partie moyenne des os, et forme dans le canal médullaire de la substance compacte un tissu réticulaire, dont l'usage est de soutenir le tuyau membraneux qui contient la moelle.

Ces trois substances, malgré leur inégale densité, ne sont réellement qu'une seule et même substance, différemment modifiée. La réticulaire et la spongieuse ne diffèrent de la compacte qu'en ce qu'elles contiennent moins de phosphate de chaux, que leur tissu est plus rare et plus épanoui. Du reste, les altérations du tissu osseux, qui constituent les exostoses laminées et éburnées, la conversion des os, par les acides, en un

cartilage flexible que la macération réduit en tissu cellulaire, prouvent que ces trois substances sont vraiment identiques, et ne diffèrent que par leur texture plus ou moins serrée, et la quantité de phosphate calcaire déposée dans les mailles de leur tissu.

On pense que la substance compacte est formée par un assemblage de lames concentriques, fortement unies les unes aux autres, et formées de fibres placées de champ, ou juxta-posées et dirigées suivant la longueur des os. On cite en preuve de cette opinion l'exfoliation des os soumis au contact de l'air; mais ces lames, qui se détachent dans un os qui s'exfolie, ne prouvent autre chose que la manière dont agit la cause destructive. L'air, la chaleur, ou tout autre agent, s'appliquant successivement à divers plans osseux, établissent entre eux une distinction qui n'existoit pas dans l'état naturel, et en déterminent la chute successive. Certaines parties, dans lesquelles on n'admet point une structure lamelleuse, peuvent offrir ce mode de décomposition. Ainsi de Lassone a vu un lambeau de peau humaine long-temps conservé dans un caveau se détacher par écailles d'une extrême ténuité.

La vie, qui existe à un moindre degré dans les os que dans les autres parties, paroît animer plus ou moins leurs diverses substances. Proportionnée à la quantité des vaisseaux qui s'y répandent, elle est plus active dans la substance spongieuse :

aussi des bourgeons charnus s'en élèvent-ils plus promptement dans les fractures, et la formation du cal s'y effectue-t-elle avec promptitude. La carie y fait également des progrès plus rapides, et il est bien plus difficile d'arrêter son mouvement propagateur.

CLXXIV. *Usages du périoste et des sucs médullaires.* Quelle que soit leur situation, leur grandeur, leur figure et leur composition, tous les os sont enveloppés par le périoste, membrane blanchâtre, fibreuse, dense et serrée, que traversent les vaisseaux qui pénètrent dans leur propre substance. Le périoste est une membrane parfaitement distincte des autres parties molles, et de l'os lui-même, à la surface duquel il adhère par le moyen des vaisseaux et du tissu cellulaire qui passent de l'un à l'autre d'une manière d'autant plus intime que l'on est plus avancé en âge. Les fibres celluleuses et vasculaires qui traversent la substance de l'os établissent un commerce sympathique très-étroit entre son périoste et la membrane très-mince qui tapisse ses cavités intérieures, sécrète la moelle, et a reçu le nom de *périoste interne.* La membrane médullaire, étant détruite par l'introduction d'un stylet dans le canal intérieur, les couches extérieures de l'os se gonflent, se séparent des couches intérieures, et forment comme un nouvel os autour du séquestre. Le nouvel os n'est point formé par le périoste ossifié, comme l'avoit avancé Troja. Cette membrane reste aussi étran-

gère à la formation du nouvel os dans les nécroses profondes qu'à la formation du cal dans les fractures. Le périoste dont est couvert l'os affecté de nécrose n'acquiert ni une épaisseur, ni une consistance plus grandes, de même qu'il ne forme point autour des bouts des os fracturés une virole qui les maintienne réunis, comme c'étoit le sentiment de Duhamel, récemment enseigné dans un ouvrage où l'auteur semble se complaire à reproduire des erreurs réfutées depuis plusieurs siècles. Privé de nourriture, mort et desseché dans cette nécrose artificielle, l'os séquestré se remue au centre du canal osseux formé par les couches extérieures gonflées, d'où on l'extrait après une térébration préliminaire. C'est en vertu de la même sympathie que les douleurs ostéocopes sourdes, profondes et nocturnes, qui tourmentent les malades échauffés par la chaleur du lit dans les dernieres périodes de l'affection vénérienne, douleurs qui paroissent avoir leur siége dans le centre des os longs, occasionent le gonflement de ces os et du périoste.

Le périoste a pour principal usage de régulariser la distribution des sucs nourriciers des os; puisque, dès qu'on l'enlève, il se forme à l'endroit dénudé des végétations plus ou moins irrégulières. Cette propriété est d'ailleurs commune à toutes les membranes fibreuses dont la destruction est suivie d'excroissances qui s'élèvent des organes qu'elles enveloppent. Un phénomène absolument semblable se passe après l'écorcement partiel des

arbres. On a cru à tort que le périoste, comme l'écorce des végétaux, contribuoit à l'accroissement des os en grosseur, par le durcissement successif de ses lames intérieures.

La moelle qui remplit la cavité centrale des os longs, et les sucs médullaires contenus dans les cellules de la substance spongieuse, ont avec la graisse la plus grande analogie par leur nature chimique, et sans doute aussi par leurs usages (CV). La proportion de ces deux humeurs est constamment relative : dans les personnes très-maigres, les os ne contiennent qu'une moelle aqueuse, très-fluide, et quoique cette liqueur remplisse toujours les cavités intérieures de ces organes, dont les parois solides ne peuvent s'affaisser sur elles-mêmes, elle contient bien moins de particules sous le même volume; et sa quantité, comme celle de la graisse, est véritablement diminuée. Elle est le produit de l'exhalation artérielle, et ne sert point à la nutrition immédiate de l'os, comme le pensoient les anciens, au moins d'une manière exclusive, puisque, dans la classe nombreuse des volatiles, la plupart des os longs, percés par des conduits aériens, sont dépourvus de cette humeur. Il est très-difficile d'assigner les usages de la moelle et du suc médullaire; n'existeroient-ils que pour remplir les cavités dont la nature a creusé les parties dures, afin de les rendre plus légères? Une partie de ces liquides peut-elle transsuder à travers l'épaisseur des cartilages articulaires, et venir, au

moins dans les grandes articulations, se mêler à la synovie, en augmenter la quantité, en la rendant plus onctueuse, plus glissante et plus propre à adoucir les frottemens des surfaces articulaires? Si cette transsudation peut avoir lieu après la mort, pourquoi, a-t-on dit, ne s'opèreroit-elle pas lorsque toutes les parties sont dans l'état de chaleur et d'expansion vitale? Mais c'est précisément l'état de vie qui, par la diversité et les propriétés différentes dont sont animés les tissus, s'oppose à ce que l'effet physique de la transsudation s'accomplisse, et contient chaque humeur dans ses limites.

CLXXV. *Articulations, cartilages et ligamens articulaires, humeur synoviale.* Les articulations des différentes pièces du squelette ne sont pas toutes disposées à permettre des mouvemens; plusieurs, telles que les sutures par engrenure réciproque, par juxta-position harmonique ou écailleuse, la gomphose, ou la jonction par implantation, sont absolument immobiles, et se nomment, à cause de cela, *synarthroses.* Toutes les autres articulations, soit que les os se touchent immédiatement (*diarthroses de contiguité*), soit qu'une substance, interposée entre leurs extrémités, les unisse (*diarthroses de continuité* ou *amphiarthroses*), sont douées d'une plus ou moins grande mobilité. Nous ne parlerons ici que des articulations mobiles; soit qu'elles permettent des mouvemens étendus et dans toutes les directions (*diarthroses orbiculaires*), soit que les os ne se meuvent que dans deux sens

opposés (*diarthroses alternatives* ou *ginglymes*), en formant un angle (*ginglyme angulaire*), ou en exécutant l'un sur l'autre des mouvemens de rotation (*ginglyme latéral*).

Dans toutes les articulations, les surfaces osseuses sont recouvertes par des lames d'une substance moins dure que celle de l'os. Ce sont les cartilages articulaires, qui remplissent le double usage de donner aux extrémités des os le poli nécessaire à leur glissement facile, et de favoriser les mouvemens par la grande élasticité dont ils sont doués. Morgagni a fait voir que, de toutes les substances animales, les cartilages étoient les plus élastiques : leur structure est bien différente de celle des os, lors même que ceux-ci sont encore cartilagineux, puisque les cartilages articulaires ne s'ossifient pas dans les personnes les plus âgées (1). Ils sont formés de fibres très-courtes, dirigées dans le sens de la longueur de l'os, fortement pressées les unes contre les autres, et réunies par d'autres fibres transversales. Cette direction verticale du plus grand nombre des fibres cartilagineuses, démontrée par de Lassonne, est très-favorable à leur réaction élastique. Le ligament capsulaire se réfléchit sur eux, en s'amincissant beaucoup, et se con-

(1) Quelquefois néanmoins ces cartilages se détruisent : alors l'os dénudé se polit par les frottemens, et contracte la dureté de l'ivoire.

fond avec leur périchondre, comme l'ont enseigné Bonn, Nesbith et plusieurs autres anatomistes.

Outre les cartilages qui enveloppent les extrémités des os, on trouve, dans certaines articulations, des lames fibro-cartilagineuses placées entre les surfaces articulaires. Ces pièces intermédiaires se rencontrent dans les articulations de la mâchoire inférieure avec les temporaux, dans celle du fémur avec le tibia, dans celle du sternum avec la clavicule; et remarquez que toutes ces articulations exécutent beaucoup de mouvemens, comme celles de la mâchoire, ou souffrent des pressions considérables, comme celles du genou et du sternum. Cette dernière, peu mobile, étant le point auquel viennent aboutir tous les efforts qu'exerce l'extrémité supérieure, avoit besoin de cet appareil, très-propre à en amortir l'effet par rapport au tronc, le mouvement imprimé s'éteignant en partie dans le jeu du cartilage inter-articulaire.

Nous ne reviendrons point sur ce que nous avons dit (XCVII) de la sécrétion de l'humeur, qui lubrifie les surfaces articulaires, facilite leurs mouvemens et entretient leur contiguité. Sa quantité est en raison directe de l'étendue de ces surfaces, et de la capsule membraneuse dont elles sont enveloppées; elle est également proportionnée à la fréquence des mouvemens que chaque articulation peut permettre.

On nomme *synovie* cette liqueur préparée par les paquets glandulo-cellulaires placés au voisi-

nage des articulations, sécrétée par les capsules membraneuses qui les environnent, et se réfléchissent sur les extrémités articulaires des os dont elles recouvrent les cartilages; de manière que, comme Bonn l'a très-bien vu et expliqué vers le milieu du dernier siècle, ces extrémités ne se trouvent pas plus contenues dans la propre cavité de la capsule fermée de toutes parts que les viscères abdominaux ne le sont dans celle du péritoine. La synovie est plus pesante que l'eau commune, parfaitement incolore et plus visqueuse qu'aucun autre liquide animal. On y trouve une grande proportion d'albumine, qui existe, comme l'a observé M. Margueron, qui a donné le premier une analyse un peu exacte de la synovie, dans un état particulier, et très-disposée à se concréter en filamens par l'addition des acides. En outre, elle contient du muriate, du carbonate de soude, du phosphate de chaux, le tout dissous dans l'eau, qui forme environ les trois quarts de son poids.

CLXXVI. *Théorie de l'ankylose* (1). Le mouvement peut être considéré comme le stimulant propre de la sécrétion synoviale; et une articulation qui se meut doit, ainsi que l'observe judicieusement Grimaud, être regardée comme un centre

(1) Les bases fondamentales de cette théorie sont exposées à la fin d'un mémoire sur les fractures de la rotule, que j'ai inséré parmi ceux de la Société médicale, pour l'an VII (1799).

de fluxion vers lequel les humeurs affluent de toutes parts, attirées par l'irritation que les frottemens déterminent. Si l'articulation est tenue long-temps immobile, la synovie se sécrète en moins grande abondance, sa quantité diminue graduellement; il peut même arriver que les surfaces articulaires, long-temps maintenues dans une absolue immobilité, se dessèchent, et, dépourvues de la liqueur qui doit les lubrifier, s'irritent mutuellement et contractent une inflammation adhésive, soit que les vaisseaux du périchondre se développent, soit que le repli que, selon Nesbith, Bonn et plusieurs autres, la membrane capsulaire envoie sur les cartilages, devienne le siége de cette inflammation.

C'est ainsi que se forme la maladie connue sous le nom d'*ankylose;* affection mal à propos attribuée à l'engorgement des parties molles, et surtout des ligamens qui environnent les articulations. En effet, si, dans une fracture de la cuisse ou de la jambe, vers le milieu de la longueur de l'un ou de l'autre de ces membres, et par conséquent le plus loin possible du genou, les circonstances exigent que l'on laisse long-temps le malade dans l'appareil contentif, cette jointure perd sa mobilité, et ne le recouvre qu'avec peine; quelquefois même elle la perd à jamais. J'ai actuellement sous les yeux l'exemple d'un homme chez lequel une affection scorbutique a tellement retardé la consolidation dans une fracture simple du fé-

mur, vers le milieu de cet os, qu'on a été obligé de continuer pendant sept mois l'usage des attelles contentives. Durant un si long repos, les parties molles ont perdu toute habitude de mouvement, et le genou a été frappé d'une ankylose presque complète.

Toutes les fois qu'à l'occasion d'une maladie quelconque, on reste long-temps alité, les premiers mouvemens sont rudes, difficiles et accompagnés d'une crépitation marquée dans les genoux, bruit qui annonce évidemment le défaut de synovie. D'un autre côté, si l'on examine cette articulation sur un individu qui, avant sa mort, est resté long-temps immobile, les surfaces articulaires ont perdu leur poli, sont sèches et raboteuses; elles offrent les traces d'une phlogose évidente. Flajani rapporte l'observation d'un malade qui mourut après avoir passé trois mois au lit dans une immobilité presque complète; les genoux n'offroient à l'extérieur aucune trace de lésion, et cependant il étoit impossible de fléchir la jambe sur la cuisse L'articulation ouverte, on trouva que les surfaces contiguës avoient contracté des adhérences, la face postérieure de la rotule étoit collée à la poulie articulaire des condyles du fémur, et l'on fut obligé d'employer le scalpel pour l'en détacher. J'ai fréquemment observé le même phénomène en disséquant les genoux des malades morts avec des tumeurs blanches ou lymphatiques, avec ou sans ulcération. L'ankylose, suite inévitable de cette

affection, provient évidemment du repos absolu auquel elle condamne l'articulation qui en est attaquée.

L'ankylose, par suite de l'immobilité, et conséquemment par défaut de synovie, n'est pas toujours partielle et bornée à une seule ou à deux articulations; quelquefois elle en frappe plusieurs à la fois, comme chez l'individu dont M. Larrey a tracé l'observation, et déposé le squelette dans le Muséum anatomique de l'École de Médecine de Paris : mais l'art ne possède aucun exemple plus remarquable de cette soudure générale des pièces du squelette que l'histoire communiquée par M. le professeur Percy à l'Institut national de France : elle a pour sujet un ancien capitaine de cavalerie, qui, tourmenté par des accès de goutte vague, dont la syphilis étoit une des causes probables, vit peu à peu toutes ses articulations, et même celle de la mâchoire inférieure se roidir et perdre complétement leur mobilité, au point que, dans les derniers temps de sa misérable existence, on ne pouvoit le remuer et le déplacer sans lui faire ressentir, dans les articulations ankylosées, des ébranlemens douloureux.

On conçoit, d'après cette théorie, l'utilité des mouvemens que l'on fait exécuter aux membres inférieurs lorsque leurs os fracturés ont acquis assez de solidité pour qu'on n'ait plus à craindre d'en déranger les fragmens. Ces mouvemens, indispensables dans toutes les fractures du fémur,

du tibia, et surtout dans celles de la rotule, sont bien plus propres à dissiper la fausse ankylose, et à prévenir la soudure complète, que les diverses applications résolutives et fondantes (*emplâtres de savon, de ciguë, de Vigo, de diabotanum, de diachylon gommé, douches, bains, fumigations*, etc.), que l'on doit cependant joindre à l'exercice gradué du membre, afin d'en assurer le succès.

La goutte se manifeste aux articulations qui exécutent le plus de mouvemens, et éprouvent les plus fortes pressions. Ses premiers accès, comme Sydenham l'observe, se font ressentir dans celle du gros orteil avec le premier os du métatarse, articulation qui supporte le poids de tout le corps, et travaille le plus dans les divers mouvemens progressifs.

Les muscles qui passent autour des articulations les affermissent bien mieux que les ligamens placés sur leurs côtés. En effet, si ces muscles se paralysent, le membre, abandonné à son propre poids, tiraille les ligamens, qui cèdent, s'allongent et permettent à la tête de l'os d'abandonner la cavité qu'elle occupe. C'est de cette manière que la perte des mouvemens et l'atrophie du muscle deltoïde entraînent la luxation consécutive de l'humérus; le ligament orbiculaire de l'articulation de cet os avec l'omoplate, ne suffisant point pour retenir sa tête appliquée contre la cavité glénoïde. La colonne vertébrale, disséquée et réduite à ses moyens d'union ligamenteuse, se

rompt sous un poids bien inférieur à celui qu'elle eût supporté avant d'être dépouillée des muscles qui y prennent les attaches.

CLXXVII. *De la station.* On appelle ainsi l'action par laquelle l'homme se tient debout sur un plan solide. Dans cette position redressée de toutes nos parties, la ligne perpendiculaire, passant par le centre de gravité du corps, doit tomber sur un point de l'espace que mesurent les plantes des pieds. La station est la mieux assurée possible, quand la ligne prolongée du centre de gravité (1) du corps tombe sur sa base de sustentation (c'est ainsi qu'on nomme l'espace circonscrit par les pieds, quel que soit leur degré d'écartement); mais cette ligne peut tendre à la dépasser, sans que pour cela la chute ait lieu, l'action musculaire rétablissant bientôt l'équilibre dérangé par son changement. S'il devient tel que l'extrémité inférieure de la ligne prolongée dépasse les limites de la base de sustentation, la chute est inévitable du côté vers lequel cette ligne est inclinée (2).

---

(1) Ce centre de gravité est placé, dans l'homme adulte, entre le sacrum et le pubis.

(2) « *Quotiescumque linea propensionis corporis humani* « *cadit extra unius pedis innixi plantam, aut extra quadrila-* « *terum, comprehensum à duabus plantis pedum, impediri* « *ruina, à quocumque musculorum conatu, non potest.* » Borelli, Prop. 140.

La solidité de la station dépend donc, en partie, de la largeur des pieds et de leur écartement. Aussi est-elle bien

Si le corps s'incline en arrière, et que la chute sur l'occiput devienne imminente, les muscles extenseurs de la jambe se contractent fortement, afin de prévenir la flexion de la cuisse, tandis que d'autres puissances ramènent en avant les parties supérieures, et redonnent à la ligne prolongée du centre de gravité une autre direction; et si, à mesure que les extenseurs de la jambe entrent en action, son inclinaison augmente au point que rien ne soit capable de retenir le corps, que son propre poids entraîne vers le sol, par un mouvement qu'accélère la vitesse de la chute, ces muscles redoubleront d'efforts pour la prévenir, et pourront, dans cette violente contraction, rompre en travers la rotule, comme je l'ai expliqué dans un mémoire sur les fractures de cet os.

Je crois utile d'insister sur le mécanisme de la station plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, parce que la connoissance exacte de ce mécanisme rend très-facile l'explication des mouvemens progressifs. La marche, la course, etc., exigent que le corps soit debout pour être exécutées; or, lorsqu'on saura par quelles forces le centre de gravité du corps se maintient droit sur le plan qui le soutient, on entendra aisément les manières différentes dont il

---

plus vacillante lorsque nous nous soutenons sur un seul pied, et sommes-nous, dans cette circonstance, obligés à des efforts continuels, pour que le centre de gravité ne dépasse point les limites étroites de sa base de sustentation.

change de place, en se transportant d'un lieu dans un autre.

Examinons d'abord la question si long-temps agitée, de savoir si l'homme est fait pour se soutenir et marcher sur ses quatre membres, dans les premiers temps qui suivent sa naissance.

CLXXVIII. La station seroit pour l'homme un état de repos, si sa tête étoit dans un équilibre parfait sur la colonne vertébrale; si celle-ci, formant l'axe du corps, et supportant également dans tous les sens le poids des viscères abdominaux et thorachiques, tomboit perpendiculairement sur le bassin horizontal, et enfin si les os des extrémités inférieures formoient des colonnes exactement superposées; mais aucune de ces conditions n'existe dans la machine humaine : l'articulation de la tête ne correspond point à son centre de gravité; les viscères thorachiques et abdominaux, les parois des cavités qui les contiennent pèsent presque exclusivement sur la partie antérieure de la colonne vertébrale; celle-ci repose sur une base oblique, et les os des extrémités inférieures, qui se touchent par des surfaces convexes et glissantes sont plus ou moins inclinés les uns sur les autres. Il faut donc qu'une puissance active (1)

---

(1) La station n'est pas, pour certains animaux, un état de travail et d'effort, comme pour l'homme. C'est ce que prouve le fait suivant, acquis par l'observation de M. Duméril.

Les oiseaux de rivage, et surtout les échassiers (*grallæ*, L.),

veille sans cesse à prévenir les chutes dans lesquelles les entraîneroient leur poids et leur direction.

Cette puissance réside dans les muscles extenseurs qui maintiennent nos parties dans une extension d'autant plus parfaite, et assurent d'autant mieux la station qu'ils sont animés d'une force d'antagonisme plus considérable, et que nos organes, par leur disposition mécanique, ont moins de tendance à se fléchir. Il ne sera pas difficile de prouver que, dans les premiers temps de la vie, toutes nos parties sont peu favorablement disposées pour l'action des puissances qui opèrent la station ; et d'ailleurs comme nous l'a-

---

comme les hérons, les cigognes, forcés de vivre au milieu des marais fangeux et des eaux bourbeuses où se trouvent les reptiles et les poissons dont ils se nourrissent, ont depuis longtemps étonné les naturalistes par la longue immobilité dont ils sont capables dans l'état de station. Cette faculté singulière, si nécessaire à des êtres obligés d'attendre leur proie bien plus du hasard que de leur industrie, ils la doivent à une disposition particulière de l'articulation de la jambe avec la cuisse. La facette du fémur, comme l'a vu M. Duméril, sur les pates d'une cigogne (*Ardea Ciconia*, L.), présente, vers son milieu, un creux dans lequel s'enfonce une saillie du tibia. Pour que la jambe se fléchisse, il faut que cette éminence se dégage de la cavité qui la reçoit; ce qu'elle ne peut faire sans tirailler plusieurs ligamens qui maintiennent ainsi la jambe étendue dans la station, le vol et les autres mouvemens progressifs, sans que les muscles extenseurs aient besoin d'y contribuer.

vons vu (CLXV), ces puissances manquent d'un degré suffisant d'énergie pour équilibrer celles dont l'action leur est directement opposée.

La foiblesse relative des muscles extenseurs n'est point le seul obstacle qui s'oppose à la station, dans les premiers temps de la vie : d'autres causes, dans l'examen desquelles nous allons entrer, concourent à priver le nouvel individu de l'exercice de cette faculté.

L'articulation de la tête avec la colonne vertébrale étant plus près de l'occiput que du menton, et ne correspondant point à son centre de gravité, il suffit de l'abandonner à son propre poids pour qu'elle soit entraînée sur la partie supérieure de la poitrine. Elle a d'autant plus de tendance à se fléchir, que son volume est plus considérable ; et comme elle est, dans un enfant nouveau-né, très-grosse, proportionnellement aux autres parties du corps, et que ses muscles extenseurs partagent la débilité de tous les muscles de cette espèce, elle tombe sur la partie antérieure du thorax, et entraîne le corps dans sa chute. Le poids des viscères thorachiques et abdominaux tend à produire le même effet.

L'accroissement procède toujours des parties supérieures vers les parties inférieures, et cette loi constante échappe complétement à toute explication mécanique. Il n'en est pas de même des effets qui doivent résulter de cet accroissement inégal des parties relativement à la station. Les membres

inférieurs qui servent de base à tout l'édifice étant très-peu développés à l'époque de la naissance, les parties supérieures assises sur ces fondemens ruineux doivent tomber et les entraîner dans leur chute.

Le poids relatif de la tête, des viscères thorachiques et abdominaux, tend donc à entraîner en avant la ligne suivant laquelle toutes les parties du corps pèsent sur le plan qui le soutient, ligne qui doit être exactement perpendiculaire à ce plan pour que la station soit parfaite : le fait suivant vient à l'appui de cette assertion. J'ai observé que les enfans dont la tête est très-volumineuse, le ventre saillant et les viscères surchargés de graisse, s'accoutument difficilement à se tenir debout; ce n'est guère qu'à la fin de leur deuxième année qu'ils osent s'abandonner à leurs propres forces; ils restent exposés à des chutes fréquentes, et ont une tendance naturelle à reprendre l'état de quadrupède.

La colonne vertébrale, dans l'enfant, ne décrit point, comme dans l'adulte, trois courbures alternativement disposées en sens contraire. Presque droite, elle offre néanmoins, dans le sens de sa longueur, une courbure légère, dont la concavité regarde en avant. Cette incurvation, qui ne peut être attribuée qu'à la flexion du tronc pendant la grossesse, est aussi d'autant plus marquée, que l'enfant est plus près de l'époque de sa naissance.

On sait que les courbures opposées de la colonne vertébrale affermissent efficacement la station, en augmentant l'étendue de l'espace dans lequel peut se balancer le centre de gravité sans être porté au delà de ses limites. Relativement à cet usage, elle peut être considérée comme ayant un volume déterminé par deux lignes abaissées des parties antérieure et postérieure de la première vertèbre cervicale à la symphyse sacro-lombaire. Ces deux lignes, rapprochées supérieurement, écartées vers leur partie inférieure, seroient les cordes des arcs et les tangentes des courbes que la colonne vertébrale décrit; en sorte que cette colonne peut être considérée comme ayant une épaisseur fictive qui l'emporte beaucoup sur sa grosseur réelle.

Dans l'enfant nouveau-né, non-seulement le défaut de courbures alternatives resserre les limites dans lesquelles le centre de gravité peut varier, mais encore la disposition de la seule courbure qui existe favorise la flexion du tronc, et par conséquent l'inclinaison du centre en avant, et la chute dans ce sens. Cette inflexion de la colonne vertébrale, dans le fœtus et dans l'enfant, est analogue à celle que présente la même colonne chez plusieurs quadrupèdes (1).

---

(1) Cette courbure est très-fortement prononcée dans le cochon. Le dos de cet animal présente une convexité très-saillante ; et cette disposition, nécessaire pour que la colonne ver-

Le désavantage qui résulte du défaut de courbures alternatives dans la colonne vertébrale de l'enfant est rendu plus grand encore par le manque absolu d'apophyses épineuses. On sait que la principale utilité de ces éminences est d'écarter la puissance du centre des mouvemens des vertèbres, d'agrandir le bras de levier par lequel elle agit sur le tronc pour le redresser, et de rendre par-là son action plus efficace. A l'époque de la naissance, les vertèbres sont absolument dépourvues d'apophyses épineuses; elles s'élèveront par la suite de l'endroit où les lames de ces os sont unies au moyen d'une portion cartilagineuse qui complète postérieurement le canal vertébral. Les muscles érecteurs du tronc, affoiblis par sa flexion constante durant la gestation, perdent donc encore la plus grande partie de leur force par la manière défavorable dont ils s'appliquent à la partie sur laquelle ils doivent agir.

La flexion de la tête dépend non-seulement de son poids considérable, mais encore du défaut

---

tébrale puisse supporter le poids énorme de ses viscères abdominaux, a la plus grande influence sur le mécanisme de ses mouvemens progressifs. Lorsque quelque bruit l'effraie, il saute en bondissant; et il est facile de s'apercevoir qu'à chaque saut, la colonne épinière s'arque, puis se redresse, et qu'il hâte principalement sa course par la tension et le relâchement alternatifs de son arc vertébral.

d'apophyses épineuses dans les vertèbres du cou; puisque les grands mouvemens de cette partie se passent bien moins dans son articulation avec l'atlas, que dans celles de toutes les autres vertèbres cervicales.

Le bassin de l'enfant est peu développé, son détroit supérieur très-oblique. Les viscères qui seront par la suite renfermés dans sa cavité se trouvent en grande partie au-dessus d'elle. Cette obliquité du bassin nécessiteroit le redressement continuel de la colonne vertébrale, pour que la ligne prolongée du centre de gravité n'obéît point à la tendance naturelle qui l'incline en avant. D'un autre côté, la colonne vertébrale, reposant sur un bassin peu large, est établie d'une manière moins stable, et peut être plus facilement entraînée au delà des limites de la base de sustentation. Enfin le peu d'étendue du bassin, joint à son obliquité, fait que les viscères du bas-ventre, mal soutenus, tombent sur la partie antérieure et inférieure de ses parois, et favorisent la chute du corps dans le même sens.

La rotule, qui a le double usage d'affermir le genou au-devant duquel elle est placée, et d'augmenter la force effective des muscles de la jambe, en les écartant du centre des mouvemens de cette articulation, et en agrandissant l'angle sous lequel ils s'insèrent au tibia, n'existe point encore chez les enfans nouveau-nés. La portion du tendon des

extenseurs de la jambe, dans laquelle cet os doit se développer, est seulement d'un tissu plus serré, et présente une dureté cartilagineuse.

Du défaut de point d'appui résulte, pour la jambe, une tendance continuelle à se fléchir sur la cuisse, et du parallélisme de ses muscles extenseurs la perte complète de leur force effective. Alors leurs antagonistes entraînent ce membre dans une flexion d'autant plus considérable, qu'elle n'est qu'imparfaitement limitée par la portion tendineuse qui se trouve à la partie antérieure du genou.

La longueur du calcanéum, l'étendue par laquelle il dépasse postérieurement l'extrémité inférieure des os de la jambe, concourt à assurer la station, en allongeant le bras de levier par lequel les extenseurs du pied portent leur action sur cette partie; et comme, dans l'enfant qui vient de naître, cet os plus court se prolonge moins en arrière, la force de ces muscles, dont l'insertion se fait très-près du centre des mouvemens de l'articulation du pied, est considérablement diminuée.

L'homme a les pieds plus larges qu'aucun autre animal, et c'est à cette étendue plus considérable de sa base de sustentation qu'il doit, en grande partie, l'avantage de n'avoir besoin que d'un seul ou de deux de ses membres pour soutenir le poids de son corps dans la station et dans ses divers mouvemens progressifs, tandis que les autres mam-

mifères ne peuvent se soutenir, au moins pendant un certain temps, qu'en s'appuyant sur trois de leurs extrémités. Lorsque je dis qu'à raison de l'étendue de ses pieds, l'homme est, de tous les animaux, celui dont le corps repose sur la base la plus large, je fais abstraction de l'espace que ces parties peuvent embrasser par leur écartement. En effet, cet espace, que les pieds peuvent circonscrire, est bien plus considérable pour les quadrupèdes que pour l'homme. La nature a compensé le désavantage qui naissoit de la petitesse de leurs pieds par l'écartement de ces parties; et si, par cette disposition, elle a rendu chez eux la station bipède impossible, elle a convenablement assuré le mode de station qui leur est particulier.

Les pieds de l'orang-outang, qui, par la disposition générale de ses organes, présente avec l'espèce humaine une si frappante conformité, ressemblent à une main grossièrement organisée, plus faite pour s'accrocher aux arbres sur lesquels cet animal va chercher sa nourriture que propre aux usages que l'homme sait tirer de la sienne. Aussi la station sur deux pieds, qu'il affecte dans certaines occasions, n'est-elle pour lui ni la plus commode, ni la plus naturelle; et comme le dit un philosophe, d'après le témoignage de plusieurs voyageurs, si un danger pressant l'oblige à fuir ou à sauter, en retombant sur ses quatre pates, il décèle bientôt sa véritable origine; il est réduit

à sa juste mesure, en quittant cette contenance étrangère qui en imposoit; et l'on ne voit plus en lui qu'un animal à qui son masque spécieux, ainsi qu'à beaucoup d'hommes, n'ajoute aucune vertu de plus.

Les pieds sont, de toutes les parties de l'enfant qui vient de naître, celles qui sont le moins développées : son corps est mal affermi sur cette base étroite; la ligne prolongée de son centre de gravité, que tant d'autres causes tendent à porter au delà de cette base, la dépasse d'autant plus aisément qu'elle a moins d'étendue.

La plupart des différences que nous venons d'examiner tiennent à la manière dont se fait la distribution des sucs nourriciers dans le fœtus. Les artères ombilicales rapportent à la mère le sang que l'aorte pousse vers les parties inférieures, et n'envoient au bassin et aux membres qui en naissent que de foibles rameaux. Aussi le développement, presque toujours proportionnel à la quantité du sang que reçoivent les organes, est-il très-peu avancé dans ces parties au moment de la naissance, tandis que le développement de la tête, du tronc et des extrémités supérieures, est fort avancé.

L'enfant nouveau-né est donc analogue aux quadrupèdes par la disposition physique de ses organes. Cette analogie est d'autant plus marquée, que l'embryon est plus voisin de l'époque de sa formation; et il me semble qu'on pourroit émettre

comme une proposition générale, que les êtres organisés se ressemblent d'autant plus, qu'on les observe plus près de l'instant où ils ont commencé d'exister : les différences qui les caractérisent se prononçant à mesure qu'ils se développent, et devenant de plus en plus tranchées, à mesure que les actes de la vie se répètent dans les organes qu'elle anime.

La force inégalement répartie dans les puissances musculaires, et la disposition défavorable des parties auxquelles ces puissances s'appliquent, mettent donc l'enfant nouveau-né dans l'impossibilité de se maintenir debout, c'est-à-dire, de retenir la ligne moyenne de direction de son corps dans une situation rapprochée de la perpendiculaire par rapport au plan qui le soutient. Mais à mesure qu'il avance en âge, la prépondérance des muscles fléchisseurs sur les extenseurs cesse d'être excessive; le volume proportionnel de la tête, celui des viscères abdominaux et thorachiques diminue; les courbures de la colonne vertébrale se prononcent; les apophyses épineuses des os qui la composent se développent; le bassin augmente de largeur et diminue d'obliquité; la rotule s'ossifie; l'os du talon se prolonge davantage en arrière, la petitesse relative des pieds disparoît; l'enfant devient par degrés capable de se tenir debout, en ne touchant le sol sur lequel il appuie que par deux ou même un seul de ses membres; les yeux naturellement dirigés vers le ciel, noble prérogative

dont, s'il falloit en croire Ovide (1), l'homme jouiroit seul entre tous les animaux.

De tous les animaux, l'homme est le seul qui puisse se tenir debout et marcher dans cette attitude, lorsque ses organes sont suffisamment développés. Indiquons quelques-unes des principales causes qui lui assurent ce privilége.

CLXXIX. Quoique l'articulation de la tête avec la colonne cervicale ne corresponde ni à son centre de grandeur, ni à son centre de gravité, qu'elle soit plus rapprochée de l'occiput que du menton, son éloignement de cette dernière partie est bien moindre chez l'homme que dans le singe et les autres animaux, dont le trou occipital, suivant la remarque de Daubenton, s'approche d'autant plus de l'extrémité postérieure de la tête, qu'ils nous ressemblent moins. Il s'en faut donc de bien peu que la tête ne soit en équilibre sur la colonne qui la soutient; au moins il n'est besoin, pour l'assurer dans sa position, que de puissances bien moins considérables, tandis que la tête du quadru-

---

(1) *Os homini sublime dedit, cœlum que tueri*
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

Ces vers s'appliquent encore mieux au poisson désigné par les naturalistes sous le nom d'*uranoscope*. Ses yeux, dirigés en haut, restent constamment tournés vers le ciel, ou pour mieux dire, vers le plan supérieur, car le ciel des antipodes est sous nos pieds.

pède, qui tend sans cesse à s'incliner vers la terre, devoit être retenue par une cause capable d'une grande et continuelle résistance. Cette cause, on la trouve dans le ligament cervical postérieur, si remarquable chez ces animaux, s'attachant aux apophyses épineuses des vertèbres du cou, et à la crête occipitale externe, bien plus saillante chez eux que dans l'espèce humaine, où le ligament cervical postérieur se trouve remplacé par une simple ligne cellulaire qui sépare les deux moitiés symétriques de la nuque.

Les courbures alternatives de la colonne vertébrale, la largeur du bassin et des pieds, la force considérable des extenseurs du pied et de la cuisse (1), etc., toutes ces conditions favorables que réunit l'homme manquent aux animaux; mais, de même que chez ces derniers tout concourt à rendre la station sur deux pieds impossible, de même tout dans l'homme est disposé de manière à rendre très-difficile l'appui sur les quatre membres. En effet, indépendamment de la grande inégalité qui existe entre les membres supérieurs et inférieurs, différence de longueur qui, étant d'autant moins sensible que l'on est moins avancé en âge, rend, chez les enfans, la marche sur les mains et les pieds moins incommode; ces quatre

(1) Ces muscles forment le mollet et la fesse : chez aucun animal, ces masses charnues ne sont plus saillantes que chez l'homme.

membres sont loin de fournir au corps un appui également solide. Les yeux, naturellement tournés en avant, se trouvent dirigés vers la terre, et ne peuvent plus embrasser une assez grande étendue, etc.

Il est donc impossible d'admettre avec Barthez que l'enfant soit naturellement quadrupède dans l'enfance, puisqu'il n'est alors qu'un bipède imparfait (CLXXVIII), ni qu'il puisse marcher à quatre pates pendant toute sa vie, si l'on ne corrige cette habitude qu'il contracte pendant ses premières années.

CLXXX. On a peu ajouté à ce qu'a dit Galien, dans son admirable ouvrage sur la structure des parties, concernant les avantages respectifs qui sont attachés à la conformation et à la structure particulière des membres supérieurs et inférieurs. Il est très-facile de voir qu'en conciliant, autant qu'il étoit possible, les élémens de la force et de la mobilité, la nature a fait prédominer la première dans la structure des extrémités inférieures, tandis qu'elle a sacrifié la force à la facilité, à la précision, à l'étendue et à la promptitude des mouvemens dans la construction des extrémités supérieures.

Pour s'en convaincre, il suffit de comparer sous les deux rapports (1), de la résistance dont ils sont

(1) *Voyez* les considérations anatomiques sur le col du fémur, que j'ai placées dans ma thèse inaugurale : *Dissertation*

capables, et des mouvemens qu'ils peuvent permettre, le bassin à l'épaule, le fémur à l'humérus, la jambe à l'avant-bras, et le pied à la main.

Vus lorsque leurs os sont recouverts par les parties molles, les membres inférieurs présentent un cône, ou une pyramide renversée, ce qui paroît d'abord contraire au but que s'est proposé la nature; mais si l'on dépouille les parties osseuses des chairs qui les entourent, on s'aperçoit que ces appuis solides figurent une pyramide dont la base est en bas formée par le pied, et qui diminue de largeur à mesure qu'on s'élève de la jambe, formée par l'assemblage de deux os, à la cuisse qui n'en contient qu'un seul.

Si l'on recherche pourquoi les extrémités inférieures sont formées de plusieurs pièces détachées et superposées, on trouve qu'elles sont par-là bien plus solides que si elles étoient faites d'un seul os; car, d'après un théorème démontré par Euler (1),

---

anatomico - chirurgicale sur les Fractures du col du fémur. Paris, 1799.

(1) *Methodus inveniendi lineas curvas.*

Aussi la nature a-t-elle multiplié ces colonnes dans les extrémités des quadrupèdes, en relevant leur talon et les diverses parties du pied, dont elle a allongé les os pour en faire autant de jambes secondaires. Ces colonnes nombreuses, placées les unes au-dessus des autres, sont alternativement inclinées, et habituellement fléchies chez les quadrupèdes légers à la course, et dans les sauteurs, le lièvre, l'écureuil, par exemple; tandis que dans le bœuf, et surtout dans l'éléphant, elles sont toutes

deux colonnes de même substance et de même diamètre ont des solidités qui sont en raison inverse des carrés de leur hauteur, c'est-à-dire que, de deux colonnes de même substance, de même diamètre et d'inégale hauteur, la plus petite est la plus forte.

Les os longs, dont l'assemblage constitue l'extrémité inférieure, sont intérieurement creusés d'un canal qui augmente encore leur solidité; car, suivant un autre théorème expliqué par Galilée (1), deux colonnes creuses, de même substance, de même poids et de même longueur, ont des forces qui sont entre elles comme les diamètres de leurs excavations intérieures.

La largeur des surfaces par lesquelles se correspondent les os des extrémités inférieures concourt puissamment à les affermir, lorsque, dans l'état de station, ces os sont verticalement redressés. Aucune articulation ne se fait par des surfaces plus étendues que celle du fémur avec le tibia et la rotule, aucune, parmi les *orbiculaires*, ne pré-

---

sur la même ligne verticale : de manière que la masse énorme du dernier de ces animaux se trouve supportée sur quatre piliers, dont les pièces peu longues sont si peu mobiles les unes sur les autres, que, comme l'observe Barthez, saint Basile a partagé l'erreur de Pline, d'Élien et de plusieurs écrivains de l'antiquité, qui disent qu'il n'y a point d'articulation dans les jambes de ce monstrueux animal.

(1) *Opera*, tome II.

sente entre les os des points de contact plus multipliés que l'articulation de l'os de la cuisse avec ceux du bassin. Le professeur Barthez dit que, le corps étant debout, la tête du fémur et la cavité cotyloïde de l'os innominé, qui reçoit cette tête, ne se touchent que par des surfaces peu étendues. Mais je pense, au contraire, que, dans aucune situation possible, le contact mutuel des deux os n'est plus complet : la ligne moyenne de direction de la partie supérieure du fémur est alors exactement perpendiculaire à la surface de la cavité cotyloïde, qui embrasse et touche par tous ses points l'éminence presque sphérique de cet os.

Le col qui la supporte, en écartant le fémur de la cavité du bassin, augmente l'étendue de l'espace dans lequel le centre de gravité peut se balancer sans être entraîné au delà de ses limites.

CLXXXI. L'état de station ne suppose pas une immobilité parfaite : il s'accompagne, au contraire, de mouvemens de vacillation d'autant plus marqués, que l'individu a moins de force et de vigueur. Ces agitations continuelles, quoique peu sensibles dans un homme qui se tient debout, dépendent de ce que les extenseurs, ne pouvant long-temps persévérer dans une contraction soutenue, se relâchent momentanément; et les instans de repos des extenseurs sont d'autant plus fréquens que l'individu est plus foible.

Quelques physiologistes ont donné de la station

une idée fort inexacte, en la faisant dépendre de l'effort général des muscles; les extenseurs seuls sont véritablement actifs : les fléchisseurs, bien loin d'y contribuer, tendent au contraire, à déranger le rapport nécessaire entre les os pour que cet état soit permanent et durable. Ceci explique pourquoi la station entraîne bien plus de fatigue que la marche qui exerce et laisse alternativement en repos les muscles extenseurs et fléchisseurs des membres.

On peut cependant dire que, pour l'assurer mieux, nous contractons quelquefois à un degré modéré les fléchisseurs eux-mêmes; alors cette grande partie de la force réelle des muscles, qui agit suivant la direction même des leviers qu'ils doivent mouvoir (CLXIV), et qui est complétement perdue dans les divers mouvemens qu'ils impriment, se trouve utilement employée pour rapprocher les extrémités articulaires, les serrer fortement les unes contre les autres, et maintenir leur superposition exacte, nécessaire à la rectitude du corps. Personne, que je sache, n'avoit encore parlé de cet emploi de la portion la plus considérable des forces musculaires, que l'on croyoit complétement perdue par la disposition défavorable des organes progressifs.

La ligne suivant laquelle toutes les parties du corps pèsent sur le plan qui le soutient a plus de tendance à s'incliner en avant qu'en ar-

rière (1), et les chutes sur le plan antérieur sont les plus communes et les plus faciles. Aussi la nature a-t-elle dirigé dans ce sens les mouvemens des mains, que nous portons en avant pour graduer les chutes, prévenir les chocs trop violens, et en affoiblir l'effet. En même temps elle a multiplié les moyens protecteurs vers les côtés que les mains ne peuvent garantir. Ainsi elle a donné plus d'épaisseur à la partie postérieure du crâne; la peau qui recouvre la nuque et le dos a une densité bien plus grande que celle des parties antérieures. L'omoplate s'ajoute aux côtes, et défend la partie postérieure de la poitrine; la colonne épinière règne dans toute la longueur du dos; les os du bassin déploient en arrière toute leur largeur, etc.

Les chutes sont d'autant plus graves, que les articulations sont, au moment où elles arrivent, dans un état d'extension plus parfaite; celles de l'enfant qui tient ses membres dans un état de flexion habituelle sont bien moins dangereuses

---

(1) Cette tendance est bien moins marquée dans les hommes maigres et de haute stature. On observe que la plupart de ces individus marchent courbés, ou le dos en voûte, moins encore en vertu de l'habitude qu'ils contractent de se baisser, que pour empêcher le centre de gravité de se porter en arrière. Les femmes enceintes, les hydropiques, toutes les personnes qui ont beaucoup d'embonpoint, s'inclinent au contraire dans ce dernier sens, par une raison diamétralement opposée et facile à expliquer.

que celles d'un adulte fort et robuste, dont le corps tombe *tout d'une pièce*, si je puis me servir de cette expression. Celles que font les patineurs en courant sur la glace sont souvent mortelles, par la fracture du crâne, qui, placé à l'extrémité d'un long levier formé par tout le corps, dont les articulations sont étendues, va frapper le plancher glissant et solide avec une quantité de mouvement qu'augmente encore la vitesse de la chute.

Nous avons vu plus haut que les *échassiers* se tiennent long-temps debout, sans efforts, au moyen d'une mécanique particulière à l'articulation du tibia avec le fémur; mais tous les autres oiseaux ont besoin d'employer l'action musculaire pour se maintenir dans l'état de station, si toutefois l'on en excepte le temps de leur sommeil. La plupart, comme on sait, dorment perchés sur une branche, que les doigts de leurs pates serrent avec force; or, cette constriction, par laquelle ils demeurent accrochés à leur support, est un résultat nécessaire de la manière dont les tendons des fléchisseurs des doigts descendent le long des pates. Ces tendons passent derrière l'articulation du talon; un muscle, qui vient du pubis, se joint à eux en passant au-devant du genou, en sorte qu'il suffit que l'oiseau s'abandonne à son poids pour que les articulations, devenant saillantes du côté vers lequel les tendons sont placés, écartent ceux-ci de la direction verticale, les tiraillent, les allongent, les forcent d'agir sur les pates, dont les doigts

serrent mécaniquement, et embrassent étroitement la branche sur laquelle il est perché. Borelli est le premier qui ait vu clairement et raisonnablement expliqué ce phénomène (1).

CLXXXII. Quoique la station sur deux pieds soit la plus naturelle à l'homme, il peut se tenir debout sur un seul, situation toujours fatigante par l'inclinaison forcée du corps, du côté du membre qui appuie sur le sol, et l'effort de contraction nécessaire pour maintenir cette inflexion latérale; la difficulté devient plus grande, si, au lieu d'appuyer toute la largeur de la plante d'un seul pied, nous voulons nous soutenir sur son talon ou sur sa pointe; la base de sustentation est alors tellement étroite, que tous les efforts ne peuvent maintenir long-temps le centre de gravité dans la situation requise.

Quant au degré d'écartement des pieds dans lequel la station est la plus assurée possible, on le détermine par la longueur même de ces parties: lorsqu'elles circonscrivent un carré parfait, c'est-à-dire, lorsque leur longueur étant supposée de neuf pouces, chaque côté de la figure quadrilatère a cette étendue, la station est la plus ferme qu'on puisse concevoir. Cependant nous sommes loin de garder ou de prendre cette position pour

(1) *De Motu animalium.* Prop. 150. *Quæritur quare aves stando, ramis arborum comprehensis, quiescunt et dormiunt absque ruinâ.* Tab. 11, fig. 7.

prévenir les chutes. Le lutteur qui veut terrasser son adversaire écarte les pieds bien davantage; mais alors il perd d'un côté ce qu'il gagne dans un autre sens; et supposant qu'il écarte les pieds de trente-six pouces, suivant une ligne transversale, il faudra employer beaucoup plus de force pour le renverser sur le côté, mais il en faudra beaucoup moins pour le faire tomber en avant ou en arrière. Aussi un des grands principes de cet art gymnastique est de ramener les pieds médiocrement écartés dans la ligne de l'effort prévu, auquel il s'agit de résister.

On peut rapprocher de la station l'attitude sur les genoux et l'attitude assise.

Dans la première, le poids du corps porte sur les genoux, et nous sommes forcés de ramener le tronc en arrière, afin de reporter le centre de gravité sur le milieu des jambes. Aussi, lorsque nous manquons d'un appui antérieur, cette posture est-elle extrêmement pénible, et ne pouvons-nous la garder long-temps. Nous avons dit, dans un autre ouvrage, que la génuflexion rendoit les moines très-sujets aux hernies, les viscères abdominaux se trouvant poussés contre la partie antérieure et inférieure de l'abdomen par le renversement du corps en arrière (1).

Dans l'attitude assise, le poids du corps por-

---

(1) Nosographie et Thérapeutique chirurgicales.

tant sur les tubérosités ischiatiques, il faut bien moins d'efforts que dans la station sur deux pieds. La base de sustentation est très-agrandie; et quand le dos est appuyé, presque tous les muscles extenseurs employés à la station se trouvent inactifs.

CLXXXIII. *Du Coucher*, *Cubitus*. Tous les auteurs qui, à l'exemple de Borelli, ont traité *ex professo* de la mécanique animale, tous les physiologistes qui, comme Haller, ont exposé avec une certaine étendue le mécanisme de la station et des mouvemens progressifs, ont complétement négligé la considération statique du corps de l'homme en repos, abandonné à son propre poids dans le coucher sur un plan horizontal. L'objet des considérations suivantes est de remplir cette lacune : rappelons d'abord que le coucher sur un plan horizontal est la seule attitude dans laquelle tous les muscles locomoteurs réparent le principe de leur contractilité épuisé par l'exercice; la station immobile n'a que l'apparence du repos, et les contractions persévérantes qu'elle exige fatiguent davantage les organes musculaires que les contractions alternatives par lesquelles s'exécutent les divers mouvemens progressifs.

Le corps de l'homme, étendu sur un plan horizontal, repose dans quatre positions, suivant qu'il porte sur le dos, sur le ventre ou sur l'un des deux côtés. Les Latins exprimoient les deux premières situations par les termes de *supina-*

tion, et de *pronation* (1). Ils n'avoient aucun mot particulier pour indiquer le coucher sur les côtés (2).

Le coucher sur le côté droit est la position la plus ordinaire, celle que nous gardons pendant le sommeil, et dans laquelle nous le goûtons le plus long-temps et le plus volontiers. Un très-petit nombre d'hommes, à moins que l'habitude ne les y porte, se couchent sur l'autre côté. La préférence que nous accordons généralement au côté droit, se fonde sur deux motifs. Lorsque le corps repose sur le côté opposé, le foie viscère volumineux, très-lourd et mal assujéti dans l'hypocondre droit, pèse de tout son poids sur l'estomac et entraîne le diaphragme : de là résulte une gêne et des tiraillemens qui empêchent de garder long-temps la même posture, ou troublent le sommeil par des songes pénibles; ensuite l'estomac de l'homme offre un canal dans lequel le cours des matières est obliquement dirigé de haut en bas et de gauche à droite; l'orifice droit ou pylorique de l'estomac est beaucoup moins élevé que son orifice gauche ou cardiaque; le coucher sur le côté droit favorise donc la descente des alimens, qui, pour passer dans les intestins, ne sont

---

(1) *Cubitus supinus ;* Plin., *cubitus pronus ;* Cicer., *cubare in faciem ;* Juven., *Supinus* vel *pronus jacere.*

(2) *Dextro* vel *lævo latere cubare ; cubitus in latus* ; Pline.

obligés de remonter contre leur propre pesanteur, comme il arriveroit si l'on étoit couché sur le côté gauche. Ces deux causes anatomiques exercent leur influence sur le plus grand nombre des hommes, et s'il en est qui contractent l'habitude de se coucher sur le côté gauche, on est fondé à soupçonner l'existence de quelque vice organique ou d'une cause accidentelle qui les engage comme par instinct à choisir cette position.

Supposons un épanchement sanguin, aqueux ou purulent, formé dans le sac de la plèvre du côté gauche. Le malade se couche sur ce côté afin que le poids de son corps ne s'oppose pas à la dilatation du côté sain de la poitrine. Les parois de cette cavité ne s'éloignent point également de son axe; la pression que le corps exerce sur le plan de sustentation empêche l'écartement des côtes, soit comme obstacle mécanique au déplacement de ces os, soit en engourdissant la contractilité des muscles inspirateurs, tous plus ou moins comprimés. Or, comme le poumon sain doit suppléer au poumon malade, rien ne seroit plus contraire que de produire de ce côté, par une mauvaise position, une gêne égale à celle qu'occasione la maladie du côté opposé.

On a cru long-temps, et l'on enseigne encore que, dans les épanchemens thorachiques, les malades se couchent sur le côté même de l'épanchement, pour empêcher que le liquide épanché ne pèse sur le médiastin et ne le pousse sur le pou-

mon opposé, dont il empêcheroit le développement. Les expériences suivantes démontrent assez la fausseté d'une telle supposition.

J'ai produit des hydrothorax artificiels en injectant d'eau la poitrine de plusieurs cadavres, au moyen d'une plaie faite à l'un de ses côtés. Cette expérience ne peut se faire que sur les cadavres dont les poumons sont libres d'adhérence avec les parois de la poitrine, et le nombre en est plus petit qu'on ne l'imagine. L'on fait entrer ainsi depuis une jusqu'à trois et quatre pintes de liquide. J'ouvrois ensuite avec précaution le coté opposé de la poitrine : les côtes enlevées et le poumon déplacé permettoient de voir distinctement la cloison du médiastin tendue de la colonne vertébrale au sternum, et supportant, sans céder, le poids du liquide, quelle que fût la position dans laquelle les cadavres fussent placés.

C'est donc bien évidemment pour ne pas empêcher la dilatation de la portion saine de l'appareil respiratoire, dont une partie est déjà condamnée à l'inaction, que les malades, dans les épanchemens thorachiques, se couchent toujours sur le côté même de l'épanchement : c'est pour la même raison, à laquelle s'ajoute le motif de ne point augmenter la douleur par le tiraillement de la plèvre enflammée, que les pleurétiques se couchent sur le côté douloureux. La même chose s'observe dans les péripneumonies, en un mot, dans toutes les

affections douloureuses des poumons et des parois de la poitrine.

Le coucher sur le dos, peu ordinaire dans l'état de santé, est naturel dans plusieurs maladies. Il indique généralement une foiblesse plus ou moins grande des muscles inspirateurs. Les puissances contractiles qui président à la dilatation de la poitrine, frappées d'adynamie dans les fièvres de mauvais caractère ou par suite d'une fatigue excessive, n'effectuent qu'incomplétement cette dilatation. Cependant une quantité déterminée d'air atmosphérique doit être admise à chaque instant dans les poumons, et la foiblesse générale seroit augmentée, si la respiration n'imprégnoit pas le sang d'une quantité suffisante d'oxigène : les malades choisissent donc la position dans laquelle la dilatation de la poitrine est plus facile pour ses muscles affoiblis. La paroi postérieure, sur laquelle le corps repose dans le coucher sur le dos, est presque inutile à l'ampliation de la cavité. Les côtes, dont le centre des mouvemens est dans l'articulation avec la colonne vertébrale, sont presque immobiles en arrière, et la mobilité de ces os augmente avec la longueur du levier qu'ils représentent; de sorte que nulle part elle n'est plus grande qu'à l'extrémité antérieure, terminée au sternum. Ainsi le coucher sur le dos offre le double avantage de ne gêner aucun des muscles inspirateurs, et de ne s'opposer au mouvement des

côtes que dans la portion où ces os ont le moins de mobilité. Le coucher en supination (*decubitus supinus*) est un des symptômes caractéristiques de la fièvre putride ou adynamique, du scorbut, et de toutes les maladies dont la débilité des parties contractiles forme le principal caractère. Les personnes fatiguées par une longue marche ou par tout autre exercice se couchent dans cette position, et ne la quittent qu'au moment où le sommeil a suffisamment réparé la perte de la contractilité.

Le coucher sur le ventre a des effets diamétralement opposés. La dilatation de la poitrine se trouve empêchée dans le lieu où la charpente osseuse est douée de la mobilité la plus grande; les viscères abdominaux sont d'ailleurs refoulés vers le diaphragme, dont ils gênent l'abaissement: aussi cette position est-elle peu ordinaire. La possibilité de la conserver pendant le sommeil n'existe que pour les personnes très-fortes; et lors même qu'elles s'endorment dans cette position, elles se réveillent bientôt d'un sommeil troublé par des songes pénibles, éprouvant ce sentiment d'angoisse connu sous le nom d'*incube;* nous prenons quelquefois cette position lorsque nous voulons restreindre l'étendue de la respiration, et par conséquent diminuer l'excitation intérieure durant l'ardeur d'un accès fébrile, par exemple.

Les diverses positions du coucher étant principalement relatives à la plus ou moins grande faci-

lité de la respiration, les enfans très-jeunes et les personnes avancées en âge préfèrent le coucher sur le dos, situation qui, comme nous l'avons vu précédemment, est la plus favorable aux mouvemens respiratoires. La respiration, comme toutes les autres fonctions de l'économie animale, à l'exception de la circulation et des phénomènes qui lui sont immédiatement subordonnés, la respiration, dis-je, a besoin d'une sorte d'éducation; elle ne s'exécute que foiblement dans les premiers temps de la vie; ce n'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, et lorsque les muscles respirateurs, d'abord minces et débiles, se sont fortifiés par l'effet même de leur action, que la poitrine se dilate avec facilité, et que le poumon jouit du plein exercice de ses facultés. Jusque-là l'agrandissement de la cavité, l'ampliation du poumon ne s'effectuoit que d'une manière incomplète; l'enfant ne pouvoit pas même se débarrasser par la sputation des matières muqueuses dont ses bronches sont sujettes à s'emplir, et qui rendent le catarrhe pulmonaire si grave dans le premier âge de la vie. De même, chez le vieillard, les muscles, affoiblis et revenus à cette débilité relative de l'enfance, font de vains efforts pour désobstruer les voies aériennes des mucosités dont elles s'engouent dans le catarrhe suffocant. Les phénomènes mécaniques de la respiration sont donc également difficiles chez l'enfant par la foiblesse des muscles, long-temps inactifs; chez le vieillard,

par l'affoiblissement des mêmes organes et le durcissement des cartilages : aussi le coucher sur le dos est-il la position la plus familière à ces deux termes éloignés de la vie, mais avec une différence assez remarquable qu'il s'agit maintenant d'apprécier.

Dans les considérations précédentes, nous avons toujours supposé le corps de l'homme étendu sur un plan parfaitement horizontal. Il est cependant rare que l'on repose sur un plan ainsi dirigé ; presque tous les hommes, et surtout les personnes avancées en âge, ont besoin que le plan offre une certaine inclinaison, et que la tête soit plus ou moins élevée, sans quoi le cerveau deviendroit le siége d'une congestion sanguine mortelle : les enfans, au contraire, négligent cette précaution sans danger, soit parce que chez eux les propriétés vitales, plus énergiques, balancent mieux l'empire des lois physiques, en s'opposant plus invinciblement aux effets de la gravitation, soit par la raison que les parois des artères intérieures du crâne ont, chez les enfans très-jeunes, une épaisseur relative, et par conséquent, une force plus considérable. L'extrême disproportion qui existe chez les adultes, pour l'épaisseur des parois, entre les artères cérébrales et celles d'un calibre égal, observées dans les autres parties du corps, est peu de chose dans l'enfance; et cette différence anatomique, que j'ai plusieurs fois reconnue dans les dissections, n'est-elle pas une des principales causes qui décident

dans la vieillesse l'apoplexie, à laquelle l'enfant n'est point sujet?

L'on sait que l'agrandissement de la poitrine s'opérant surtout par l'abaissement du diaphragme, les personnes qui ont fait un repas très-copieux, les hydropiques, les femmes enceintes, ne peuvent goûter le repos qu'à la faveur d'un plan incliné; de sorte que, la poitrine étant très-relevée, et l'individu comme assis, le poids des viscères abdominaux les entraîne contre la paroi inférieure, et fait que leur masse ne s'oppose point à l'abaissement du diaphragme.

Il nous resteroit maintenant à examiner quelle est la posture dans laquelle le corps repose avec la moindre fatigue. Cette étude, peu importante pour le médecin, seroit d'un grand prix pour les arts qui ont pour objet la nature imitée. C'est pour l'avoir négligée que, dans les productions de nos peintres, de nos sculpteurs, nous voyons souvent des figures qui, livrées au repos, sont posées dans des attitudes si fausses ou tellement pénibles, que, pour les conserver, elles devroient essuyer la plus grande fatigue et faire les plus grands efforts.

CLXXXIV. *Mouvemens progressifs. De la Marche.* La marche, la course et le saut sont liés par beaucoup de nuances intermédiaires, de façon qu'il est difficile de les distinguer. Il est en effet très-peu de différence entre marcher d'une certaine manière ou courir, et la course s'effectue, le plus souvent, par le mécanisme compliqué de

la marche et du saut. Dans le marcher le plus naturel, nous mettons premièrement le corps en équilibre sur l'un des deux pieds; puis fléchissant le pied opposé sur la jambe, celle-ci sur la cuisse, et la cuisse sur le bassin, nous raccourcissons cette extrémité, nous la portons en même temps en avant, nous étendons ses articulations fléchies, et lorsqu'elle est solidement appuyée sur le sol, nous inclinons le corps en avant, nous reportons le centre de gravité dans cette direction; et, faisant exécuter les mêmes mouvemens au membre qui étoit resté en arrière, nous mesurons l'espace d'autant plus vite, en y employant d'ailleurs des forces égales, que les leviers sur lesquels le centre de gravité se trouve alternativement porté ont une longueur plus considérable. Il en est ici du poids du corps, relativement aux membres inférieurs, comme de celui d'un char qui passe successivement sur les divers rayons de ses roues.

Le centre de gravité ne se meut point suivant une ligne droite, mais entre deux parallèles, dans l'intervalle desquelles il décrit des obliques qui vont de l'une à l'autre, en formant de véritables *zigzags*. La direction oblique du col des fémurs explique les vacillations latérales du corps pendant la marche; les bras, qui se meuvent en sens contraire des membres inférieurs, font l'office de balanciers, conservent l'équilibre et corrigent les vacillations, qui seroient bien plus marquées, si

les cols des fémurs, au lieu d'être obliques, avoient une direction horizontale. Les impulsions qu'ils communiquent au tronc se contre-balancent réciproquement, et celui-ci se meut dans la diagonale d'un parallélogramme dont il formeroit les côtés. Cette rectitude de direction dans la marche est constamment altérée; et si la vue ne nous faisoit apercevoir de loin le but auquel nous devons tendre, nous nous en éloignerions considérablement. Un homme dont on bande les yeux, placé au milieu d'un champ vaste et carré, croit, pour en sortir, marcher en ligne droite, et va gagner un des angles. C'est presque constamment du côté gauche que l'on dévie, l'extrémité inférieure droite, plus forte, poussant le poids du corps sur le côté opposé. Les boiteux s'écartent bien davantage de la direction droite, en déviant du côté de la jambe raccourcie. Toutes ces agitations, qui rendent leur démarche si remarquable, tiennent au besoin qu'ils ont de travailler beaucoup et sans relâche pour empêcher le corps d'obéir à son poids et à la force de l'extrémité saine qui le pousse sur le côté malade.

La largeur des pieds, un degré médiocre d'écartement de ces parties, assurent la marche en offrant un support plus étendu au centre de gravité. Aussi, lorsque nous marchons sur un plancher mobile et peu sûr, écartons-nous ces supports, afin d'embrasser une plus grande base de sustentation. Les hommes qui ont long-temps navigué

contractent même tellement l'habitude de cet écartement des pieds, nécessaire pour se soutenir au milieu du roulis des vaisseaux, qu'ils ne peuvent s'en défaire lorsqu'ils sont à terre, et sont faciles à reconnoître par leur démarche. Un matelot n'est capable d'un service actif que lorsqu'il a, comme disent les gens de mer, le *pied marin*, c'est-à-dire lorsqu'il s'est habitué à marcher avec assurance sur le pont mobile d'un navire battu par la tempête.

La femme, dont les pieds sont naturellement plus petits, a par cela même la démarche moins sûre; mais doit-on en conclure, avec l'écrivain le plus éloquent du dix-huitième siècle, que chez elle la petitesse du pied se rapporte au besoin qu'elle a de fuir pour être atteinte? La forme concave de la plante des pieds, en faisant qu'ils s'accommodent mieux aux inégalités du sol, contribue à affermir le corps dans la marche et les autres mouvemens progressifs. Il est dans la marche un moment intermédiaire entre le commencement et la fin du pas, pendant lequel le centre de gravité se soutient en l'air; il dure depuis l'instant où ce centre abandonne le pied laissé en arrière, jusqu'à celui où il se trouve ramené sur l'autre pied, porté en avant.

La marche se modifie suivant qu'on l'exécute sur un plan horizontal ou sur des plans inclinés: dans ce dernier cas, elle se nomme *montée* ou *descente*, et fatigue beaucoup plus. Pour expliquer l'action de monter, supposons un homme placé

au bas d'un escalier qu'il doit gravir : il commence par fléchir les articulations de l'extrémité qu'il veut porter en avant, il l'élève ainsi en la raccourcissant pour l'avancer ; et lorsque le pied à demi étendu repose, il étend les articulations de l'extrémité laissée en arrière, pousse ainsi le corps en haut, dans une direction verticale, et il achève ce premier pas en contractant les extenseurs de la jambe antérieure, afin qu'ils entraînent en avant et reportent sur elle le centre de gravité, auquel la jambe postérieure, dont le pied est étendu, a imprimé un mouvement vertical d'élévation. Voilà pourquoi la montée fatigue les mollets et les genoux, mais surtout ces derniers, car l'effort par lequel les extenseurs de la jambe antérieure ramènent sur elle le centre de gravité est plus grand que celui par lequel les jumeaux et le soléaire lui impriment, en étendant le pied laissé en arrière, un mouvement d'élévation vertical.

Pour soulager les extenseurs de la jambe, nous inclinons le corps en avant le plus qu'il nous est possible nous le renversons, au contraire, en arrière lorsque nous descendons une montée d'escalier, ou bien une pente rapide, afin de retarder le mouvement par lequel le corps, obéissant à sa propre pesanteur, tombe sur la jambe portée en avant.

Au moment où le centre de gravité abandonne le point de sustentation par l'élévation de la jambe laissée en arrière, toutes les forces se réu-

nissent pour faire qu'il s'éloigne le moins possible de la verticale. Les fessiers maintiennent le bassin, redressent la cuisse ; les muscles des lombes étendent le tronc sur le bassin : voilà la raison pour laquelle la descente fatigue surtout les reins. La descente, lorsque le plan sur lequel on l'exécute est médiocrement déclive, est moins fatigante que la montée, la force de gravitation, ou la pesanteur du corps aidant beaucoup au mouvement vertical descendant. La marche à grands pas ressemble à la montée, en ce que le corps, étant abaissé à chaque écartement considérable des jambes, a besoin d'être élevé chaque fois sur celle qui a été portée en avant.

A chaque pas que nous faisons, l'articulation du pied avec la jambe est le siége principal d'un effort, sur lequel l'attention des physiologistes ne s'est point encore arrêtée. Le poids entier du corps est soulevé par l'action des muscles releveurs du talon, et l'astragale supporte ce poids, plus ou moins lourd, suivant l'embonpoint des individus et les fardeaux dont ils peuvent être chargés. Le poids d'un homme adulte, de taille moyenne, et d'un embonpoint médiocre, évalué 150 livres, peut aller, par l'obésité, depuis 400 jusqu'à 600 livres. La charge ordinaire égale au poids du corps peut être quadruplée, et même portée plus loin, puisque l'on a vu des hommes très-forts transporter des fardeaux pesant plus d'un millier de livres. Ainsi donc, en ajoutant à

la pesanteur du corps celle des fardeaux dont il peut être chargé, on voit sans peine quels efforts prodigieux s'exercent, pour ainsi dire, à notre insu, dans l'articulation du pied avec la jambe. Mais combien la nature s'est ménagé de ressources pour vaincre cette résistance considérable! combien de circonstances se trouvent heureusement réunies pour la surmonter sans fatigue! D'abord, le pied, dans cette action, représente un levier du second genre, et ce levier est, comme on sait, le plus avantageux, la résistance s'y trouvant toujours plus rapprochée du point d'appui que la puissance, et le bras par lequel celle-ci agit consistant dans toute la longueur du levier. Étudiez le mécanisme des diverses pièces du squelette, et vous ne trouverez nulle part, d'une façon aussi marquée, l'emploi d'un levier aussi avantageux. Le calcanéum, en prolongeant le pied derrière son articulation avec la jambe, étend aussi le bras du levier par lequel agit la puissance; sa longueur influe sur la vigueur du sujet, sur l'aptitude à faire sans fatigue de longues marches, ou à se livrer à des exercices qui exigent une grande énergie musculaire de la part des membres inférieurs. Les nègres, qui excellent à la course, et qui se distinguent par une grande prestesse dans la danse et dans tous les exercices de la gymnastique, m'ont toujours offert le calcanéum plus long, plus saillant en arrière que les individus de la race européenne. Les meilleurs danseurs sont

ceux qui ont le tendon d'Achille bien détaché, c'est-à-dire saillant, et le plus éloigné possible de l'axe de la jambe; ce qui suppose que son attache inférieure est reculée par le prolongement du calcanéum.

Ceux dont le talon est court ont le pied long et aplati; cette conformation, vicieuse lorsqu'elle est bien décidée, non-seulement nuit à la beauté des formes, mais encore porte un notable préjudice à la force du membre, ainsi qu'à la facilité de ses mouvemens. Les hommes à *pieds plats* sont constamment de mauvais marcheurs; aussi l'aplatissement extrême est-il regardé comme un cas de dispense pour le service militaire : enfin les termes qui expriment cette imperfection physique sont une injure dans plusieurs idiomes, comme dans la langue française. Mais poursuivons l'examen des avantages que présente l'articulation du pied avec la jambe pour l'exercice facile de la marche et des divers mouvemens progressifs.

Nous avons vu que les tendons s'insèrent généralement, sous des angles très-aigus, aux os sur lesquels ils agissent; ici, au contraire, cette insertion se fait à angle droit, le tendon commun aux muscles du mollet rencontre le calcanéum sous l'angle le plus favorable à l'efficacité de leur action. Si l'on excepte les muscles qui meuvent la tête et la mâchoire inférieure, il n'en est point qui nous présentent cette disposition d'une façon aussi marquée. La nature ne s'est pas contentée de dis-

poser le pied de manière qu'il présente le levier le plus avantageux auquel les puissances motrices s'insèrent le plus loin possible du point d'appui, et sous l'angle le plus favorable à leur action; elle a encore augmenté l'efficacité de cette action en multipliant à l'infini le nombre des fibres musculaires. Il n'est pas de muscle plus fort que le soléaire, dont les fibres courtes et obliques, entre les deux larges aponévroses qui recouvrent ses faces antérieure et postérieure, sont plus multipliées que dans aucun autre muscle, comme on peut s'en faire une idée en réfléchissant à la grande étendue des surfaces auxquelles se fait leur implantation. En outre, le tendon d'Achille est maintenu dans la rectitude nécessaire par le feuillet de l'aponévrose de la jambe, qui passe derrière lui.

Tout, dans les puissances comme dans les leviers, est donc conformé de manière à surmonter sans peine les résistances, c'est-à-dire à soulever le poids du corps par l'extension du pied, dont le bout appuie sur le sol dans chacun de nos mouvemens progressifs.

Cette force immense avec laquelle les muscles des mollets agissent pour relever le talon, et soulever le poids entier du corps qui pèse sur l'astragale, explique la possibilité des fractures transversales du calcanéum, celle des ruptures du tendon d'Achille, malgré son épaisseur considérable; elle doit encore engager à ne permettre aux malades

de marcher librement que plusieurs mois après ces accidens, la substance à l'aide de laquelle s'opère la réunion des parties divisées pouvant se rompre aisément par un effort prématuré, comme on en a plusieurs exemples. Les mêmes dispositions rendent également raison d'un accident sur les causes duquel les pathologistes ont long-temps proposé une théorie invraisemblable.

Il arrive assez fréquemment que les seuls efforts de la marche occasionent le déchirement de quelques fibres dans les jumeaux ou dans le soléaire, rupture (1) à l'occasion de laquelle survient de la douleur, le gonflement des muscles, ainsi qu'une ecchymose plus ou moins large, produite par le sang qui s'infiltre et se résout. Les pathologistes attribuent ces symptômes à la rupture du plantaire grêle, rupture supposée que l'autopsie n'a jamais constatée, et dont les signes sont aussi vains qu'illusoires.

Je pourrois rapporter ici, si c'en étoit le lieu, plusieurs exemples de cette affection : dans tous les cas que j'ai moi-même observés, l'usage des

---

(1) J'observerai, en passant, que l'on s'étonneroit à tort de la rareté des ruptures de la fibre musculaire ; la faculté contractile dont cette partie de l'organisation est douée leur est directement opposée, et, pour que le déchirement s'opère, sa cause a non-seulement à vaincre la force de cohésion, mais encore une faculté vitale dans son plus haut degré de développement et d'énergie.

bains, des cataplasmes émolliens, rendus un peu nacortiques, mais surtout la compression et le repos continués jusqu'à l'entière disparition des symptômes, m'ont paru les remèdes les plus opportuns.

CLXXXV. *De la Course.* Dans la course, le pied laissé en arrière abandonnant le sol avant que celui qu'on porte en avant soit solidement appuyé, le centre de gravité reste un moment suspendu; il se meut alors en l'air, poussé par la force de projection, dont l'exercice opère principalement le saut.

Le mécanisme de la course se compose de celui de la marche et de celui du saut; elle ressemble davantage au dernier qu'au premier de ces mouvemens; c'est pourquoi des auteurs l'ont définie une suite de sauts bas. Ses pas ne sont pas plus grands que ceux de la marche, mais seulement se succèdent avec plus de vitesse. Le centre de gravité se transporte plus rapidement de l'une à l'autre jambe, et les chutes sont bien plus faciles. La prompte répétition des mêmes mouvemens pendant la course exige une contractilité très-vive dans les muscles qui meuvent les extrémités; et comme l'énergie de cette propriété vitale est proportionnée à l'étendue de la respiration, à la quantité du principe aérien dont le sang s'est chargé en traversant les poumons, les coureurs halètent ou respirent fréquemment et à de courts intervalles, sans cependant qu'à chaque fois la poitrine se

trouve beaucoup dilatée. Il étoit nécessaire que les parois de cette cavité eussent pendant la course une grande fixité; car elle devient le point sur lequel s'appuient les puissances qui retiennent le bassin et les lombes, et empêchent que ces parties ne présentent une base vacillante aux membres inférieurs. Les meilleurs coureurs sont ceux qui ont la plus grande *force d'haleine*, c'est-à-dire qui peuvent assurer à la poitrine un degré plus considérable de dilatation permanente. On les voit, lorsqu'ils disputent le prix de la course, jeter la tête et les épaules en arrière, non-seulement pour corriger la propension qu'a la ligne de gravité pour s'incliner vers le plan antérieur, mais encore pour que la colonne cervicale, les omoplates, les clavicules et les humérus, retenus immobiles, fournissent un point fixe à l'action des muscles auxiliaires de la respiration.

La course seroit extraordinairement ralentie, si l'on appuyoit sur la totalité de la plante du pied, soit par le temps qu'exigeroit cette application, soit par les frottemens qu'elle occasioneroit; aussi les coureurs n'emploient-ils que la pointe des pieds. La course la plus rapide s'effectue le pied restant étendu sur la jambe, qui est mue avec célérité par les extenseurs du genou. On voit, d'après cela, pour quelle raison les chutes pendant la course sont si faciles et si fréquentes, le centre de gravité obéissant à des impulsions qui se succèdent avec promptitude, et ne reposant jamais

que sur une base de peu d'étendue. Une autre raison pour laquelle la moindre inégalité du sol devient une cause d'achoppement pour le coureur agile, c'est que la vitesse imprimée à son corps par les extensions subites et instantanées de l'extrémité postérieure augmente à chaque pas, de manière qu'il lui est impossible de s'arrêter tout à coup et sans avoir auparavant ralenti sa course, et modéré la force impulsive à laquelle tout son corps obéit.

Comme c'est surtout en avant que les chutes sont faciles, les coureurs jettent constamment la tête en arrière, et se servent de leurs bras comme de balanciers; ils les disposent de manière qu'ils soient avec les jambes dans une opposition constante, c'est-à-dire que l'extrémité inférieure droite, par exemple, étant portée en avant, le bras gauche soit balancé en arrière.

Il est très-peu d'animaux plus favorablement construits que l'homme pour exécuter des courses rapides : ses membres inférieurs ont la moitié de la longueur totale de son corps, et les muscles qui les meuvent sont doués d'une grande force; aussi le sauvage exercé poursuit et atteint le gibier dont il fait sa proie; et même en Europe, on voit des coureurs de profession qui égalent en vitesse le cheval le plus agile. Cet animal, comme tous les quadrupèdes très-vites à la course, l'exécuteroit bien plus lentement que l'homme, à raison de la multiplicité des colonnes de sustentation,

s'il n'avoit la faculté de les mouvoir par paires, et de réduire ainsi ses quatre jambes à deux seulement, comme il le fait dans ce que les écuyers nomment *galop forcé.*

CLXXXVI. *Du Saut.* Le saut dépend principalement, chez l'homme, de l'extension subite des membres inférieurs, dont toutes les articulations ont été préliminairement réfléchies. Les angles alternatifs du pied, du genou, de la hanche, s'effacent, et les muscles extenseurs se contractent d'une manière presque convulsive, lorsque le corps abandonne le plan qui le soutient. Ce redressement de toutes les parties ne se borne point aux membres inférieurs, si le saut est violent; il a encore lieu dans la colonne vertébrale, qui agit alors à la manière d'un arc qui se détend. Le professeur Barthez, auquel on doit rapporter l'explication de ce mécanisme, que Borelli et Mayow n'avoient entrevu que d'une manière confuse, va peut-être un peu trop loin lorsqu'il regarde comme imaginaire toute répulsion de la part du sol. Cette réaction, admise par Hamberger et par Haller, a bien manifestement lieu lorsqu'on s'exerce à la saltation sur un plancher élastique; c'est par son moyen que les bateleurs s'élèvent, sans faire de grands efforts, sur la corde qui les supporte. Mais si tous les physiologistes ne conviennent point que le sol réagit pour opérer le saut, tous admettent qu'il doit offrir une certaine résistance; en effet, un sable mouvant qui céderoit à la pression

que le corps exerce, finiroit, en s'affaissant beaucoup, par rendre le saut impossible. La contraction instantanée des muscles extenseurs est si forte pour étendre les membres inférieurs, et imprimer au corps la force de projection qui l'élève, que souvent, dans cet effort, les tendons de ces muscles, ou même les os auxquels ils s'insèrent, se rompent en travers : c'est pour cela que les danseurs sont très exposés aux fractures de la rotule : elles arrivent au moment où, détachant leur corps du sol, ils s'élancent avec force à une certaine hauteur.

Si le saut consiste uniquement dans le déploiement subit des extrémités inférieures, dont les articulations sont pliées en sens alternatifs, il doit être d'autant plus considérable que celles-ci auront plus de longueur, seront davantage inclinées les unes sur les autres, et que les muscles qui les redressent se contracteront avec plus d'énergie. Aussi les animaux sauteurs, tels que le lièvre, l'écureuil, la gerboise, etc., ont-ils les extrémités postérieures très-longues par rapport au train antérieur : leurs diverses parties sont d'ailleurs susceptibles d'une plus grande flexion. Tous ces animaux ne peuvent ni marcher, ni courir, strictement parlant; leur course et leur marche consistent dans une suite de sauts et de bonds plus ou moins précipités. Quelques-uns néanmoins, tels que le lapin, le lièvre, peuvent courir lorsqu'ils gravissent une pente rapide, l'inclinaison du sol modérant

alors l'effet de l'impulsion communiquée par le déploiement des membres postérieurs; impulsion qui, à raison de la force et de la longueur de ces extrémités, jette le poids entier du corps sur les pates antérieures, plus faibles et plus courtes, avec une telle puissance, que l'animal est obligé de les roidir, et de les maintenir étendues et redressées, pour ne point heurter le sol avec la tête lorsqu'il saute sur un plan horizontal. Les grenouilles, mais surtout les sauterelles et les puces, chez lesquelles il existe, entre le train postérieur et le reste du corps, une disproportion excessive, nous étonnent par la grandeur de l'espace qu'elles peuvent franchir par l'effet d'un saut unique; mais tout étonnement cesse lorsqu'on réfléchit que les forces impriment aux masses des vitesses égales, lorsqu'elles leur sont proportionnelles; or, les espaces parcourus dépendant entièrement des vitesses, puisque le corps sautant perd, par une gradation que rien ne peut ralentir, celle qu'il avoit acquise, ces espaces doivent être, à peu de chose près, les mêmes pour les petits animaux et pour les grands.

Swammerdam dit, dans sa Bible de la nature, que la hauteur à laquelle les sauterelles s'élèvent par leur saut est à la longueur de leur corps comme 200 = 1. La puce saute encore et plus loin et plus vite (1).

---

(1) Barthez nous apprend, dans sa Mécanique, que les

La larve de mouche, connue sous le nom de ver du fromage, se contourne en cercle, en contractant, le plus qu'elle le peut, ses fibres musculaires ventrales. Après avoir ainsi ramené sa tête vers sa queue, elle se débande subitement par la contraction des fibres dorsales, se redresse et s'élance à une distance considérable. C'est par un mécanisme tout semblable que le saumon, la truite et d'autres poissons remontent les courans rapides interrompus par des cataractes. Ils ploient fortement leur corps, le redressent avec énergie, et sautent par-dessus l'obstacle qui s'oppose à leur progression. Je pense que, dans ce cas particulier, le saut ne dépend pas uniquement du redressement subit de la courbe élastique, comme le disent les auteurs; mais qu'il est encore dû à la résistance qu'oppose l'eau à la queue qui la frappe avec force au moment où elle achève de se redresser : de la même manière qu'on voit, dans les mers du Nord, la baleine énorme frapper l'eau d'un coup de sa queue, si violent et si soudain, qu'elle en emprunte un appui fixe, et s'élève jusqu'à

Arabes appellent ce petit insecte le *père du saut*, et que Roberval, physicien très-estimable, avoit composé une dissertation sur le saut de la puce, *de saltu pulicis*. Un pareil sujet, que le vulgaire croiroit ne fournir matière qu'à une oiseuse et stérile contemplation, peut offrir des résultats infiniment curieux, quand un savant physicien entreprend de le traiter : *in tenui labor*.

quinze et vingt pieds de haut, comme le racontent les navigateurs. Les écrevisses sautent en déployant avec force leur queue, arc élastique et contractile, qu'elles ont auparavant recourbé sous leur corps.

Cette théorie du saut sembleroit contredite par le fait singulier que rapporte le professeur Dumas, d'un sauteur absolument dépourvu de cuisses, et qui néanmoins étonnoit par son adresse et par son agilité. Mais le bassin, la colonne vertébrale, et surtout la portion lombaire de cette colonne, ne pouvoit-elle point, dans ce cas particulier, suppléer, par une mobilité plus grande, au défaut du plus long des trois leviers dont l'extrémité inférieure se compose?

Dans l'action de sauter, le corps, qui a reçu l'impulsion subite, peut s'élever de deux manières : perpendiculairement à l'horizon, ce qui constitue le saut vertical; ou bien suivant une ligne plus ou moins oblique. Le saut vertical a toujours moins d'étendue que celui qui se fait dans la direction d'une ligne inclinée, et ce dernier est toujours plus grand quand il a été précédé par la course. Lorsqu'un coureur va sauter, il a déjà acquis une impulsion qui s'ajoute à celle que le mécanisme du saut peut produire.

Pour nous convaincre de la réalité de cette force additionnelle, rappelons-nous combien il est difficile de s'arrêter tout à coup au milieu des élans de la course, si on n'en a point progressivement

diminué la vitesse. Cette impulsion est une des causes qui font que les coureurs tombent en avant, lorsque le moindre obstacle se rencontre sous leurs pas; mais quelles que soient la force, la direction du saut, et les puissances qui l'opèrent, le corps qui l'exécute doit être considéré comme un véritable projectile jouissant d'un mouvement communiqué, contre lequel la force de gravitation s'exerce. Quels que soient les mouvemens qu'on se donne, tout dépend de l'impulsion primitive; une fois que les pieds ont abandonné le plan de sustentation, il n'est plus en notre pouvoir d'augmenter la force du saut ou sa vitesse. Le danseur qui bat des entrechats n'excelle dans cet exercice qu'autant qu'il est capable de s'élever à une certaine hauteur. J'ai constamment observé que les artistes les plus renommés en ce genre ont le tronc, surtout les membres inférieurs très-bien musclés; les mollets, les fesses et le dos indiquent par leur volume une grande énergie dans les extenseurs, auxquels le saut est principalement confié.

Le sauteur qui s'élève verticalement retombe à terre lorsque sa propre pesanteur l'emporte sur l'impulsion qui l'anime ; sa chute ressemble à celle d'un projectile lancé verticalement ; elle se fait suivant une ligne descendante absolument semblable, pour la direction et pour la hauteur, à la ligne ascendante.

La même chose a lieu dans le saut oblique, ex-

cepté toutefois que le corps, comme la bombe lancée par l'explosion du salpêtre, décrit une courbe parabolique, ascendante tant que la force d'impulsion l'emporte sur la force de gravité, descendante quand cette dernière, qui va toujours en gagnant davantage à mesure que le saut s'exécute, se trouve égale à la force d'impulsion. Ceci a lieu quand le corps a parcouru une courbe qui représente la moitié d'une parabole; dès ce moment, la gravitation va toujours prédominant, et le corps descend par une courbe analogue à la première (1).

CLXXXVII. *De la Nage.* Il est peu d'animaux qui se soutiennent plus difficilement que l'homme à la surface d'un liquide. La pesanteur spécifique de son corps ne surpasse pas cependant de beaucoup celle d'un égal volume d'eau; quelquefois même, lorsqu'il est surchargé de graisse, cette pesanteur est la même : aussi observe-t-on que les personnes qui ont beaucoup d'embonpoint ont moins d'efforts à faire pour surnager; mais ce poids n'est point également réparti sur tous les points du fluide qui le supporte. La tête, dont la pesanteur relative est très-considérable, est le principal obstacle à la facilité de la natation; et ce n'est point sans efforts qu'on la tient soulevée,

(1) *In saltu ad horizontem obliquo, motus fit per lineam parabolicam proximè.* (Borelli, Op. cit. prop. 178. *Voy.* Galilée, sur le mouvement des projectiles.)

afin de conserver à l'air, par la bouche et par les narines, une libre entrée dans les poumons. Les membres supérieurs et inférieurs agissent alternativement, et ramassent les eaux, qu'ils abaissent en s'appuyant sur elles. Dans ces divers mouvemens, il y a flexion, extension, abduction et adduction successives des extrémités; la plupart des muscles du corps travaillent et prennent le point fixe de leur effort, dans les parois de la poitrine, que le nageur maintient dilatée, en retenant, par la constriction de la glotte, une grande masse d'air dans le tissu pulmonaire. La dilatation soutenue de la poitrine a encore cet autre avantage, qu'elle rend le corps spécifiquement plus léger. La force avec laquelle le nageur est obligé de frapper l'eau, la rapidité avec laquelle les mouvemens doivent se succéder pour que le liquide lui prête un point d'appui suffisant rendent raison de la fatigue qui résulte bientôt de cet exercice.

Les poissons ont une structure appropriée à la nature de l'élément qu'ils habitent. La forme de leur corps, terminé de toutes parts par des angles saillans, est très-avantageuse pour opérer la séparation des colonnes d'un liquide. Une vessie pleine d'azote, dont elle se vide au gré de l'animal, rend leur légèreté spécifique plus ou moins supérieure à celle de l'eau, suivant la quantité de gaz qu'elle contient; enfin leur queue, mue par des muscles très-forts, peut être regardée comme un aviron puissant, dont les coups redoublés font avan-

cer le poisson, tandis que les nageoires, comme autant de rames sècondaires, facilitent et dirigent ses mouvemens.

La vessie natatoire des poissons donne à leur dos assez de légèreté pour qu'il demeure en haut; sans cela, cette partie du corps, qui en est la plus pesante, entraîneroit le reste, et le poisson renversé ne pourroit exécuter aucun mouvement progressif : c'est ce qui arrive quand on crève la vessie ou qu'on la perce. Des muscles compresseurs expulsent le gaz qu'elle renferme, et le font passer, au moyen d'un canal, dans l'estomac ou dans l'œsophage, lorsque le poisson veut s'enfoncer et descendre. Cette expulsion est impossible, si le gaz, animé par la chaleur d'une force d'expansion considérable, résiste aux puissances compressives. C'est pour cette raison qu'au temps du *frai*, les poissons, après avoir resté long-temps à la surface de l'eau, exposés aux rayons d'un soleil ardent, ne peuvent plus redescendre, et deviennent si facilement la proie du pêcheur.

Comme le poisson est absolument environné par un milieu qui offre de toutes parts une résistance égale, la vitesse qu'il aurait acquise en frappant le fluide en arrière avec sa queue seroit consumée par la résistance de l'eau qu'il seroit obligé de déplacer en avant, si, immédiatement après qu'il a donné le coup, il ne ramenoit sa queue à la ligne droite, de manière à ne présenter au liquide que la largeur peu considérable de son

corps; la vitesse avec laquelle il avance est d'ailleurs bien inférieure à celle avec laquelle il déploie sa queue. Cette partie étant ramenée à la ligne droite, le poisson la serre et la rétrécit en même temps qu'il l'incline de l'autre côté; puis il l'élargit, la déploie et frappe le liquide en sens contraire, de manière à suivre une direction droite entre les deux impulsions obliques que les deux coups communiquent. Le poisson tourne horizontalement, et se dirige vers le sens qu'il préfère, en frappant plus vite ou plus fort d'un côté que de l'autre, ou en ne frappant que d'un seul côté.

Les poissons dépourvus de vessie natatoire sont condamnés à vivre au fond des courans dont ils sillonnent la vase, à moins que, pourvus d'un corps aplati, et de nageoires horizontales, ils ne frappent l'eau par de larges surfaces et avec une grande force, comme le font toutes les raies, dont les grandes nageoires ont, à juste titre, reçu le nom d'*ailes*, puisque la manière dont ces poissons se meuvent dans l'eau ressemble exactement à celle dont les oiseaux volent dans les airs, et qu'il n'y a de différence que dans la densité différente des milieux, comme nous allons le voir en traitant des mouvemens progressifs particuliers à cette classe d'animaux.

La ressemblance est encore plus frappante dans les poissons volans. L'exocet des tropiques, *exocœtus volitans*, pourvu d'une vessie natatoire

énorme qui occupe plus de la moitié de son volume, n'est guère plus pesant qu'un oiseau de même grosseur ; ses nageoires pectorales offrent à l'air une surface très-étendue. M. de Humboldt a reconnu par la dissection que les neuf cordons de nerfs qui vont aux douze rayons de ces nageoires sont presque trois fois plus gros que les nerfs des nageoires ventrales, et qu'excités par l'électricité galvanique, ils déterminent des mouvemens cinq fois plus forts ; aussi ce poisson est-il capable de s'élancer horizontalement à vingt pieds de distance, étendant et fermant alternativement ses nageoires pectorales pour franchir un tel espace (1).

CLXXXVIII. *Du Vol.* Un oiseau qui s'élève ou se meut dans les airs a besoin d'employer une force et une vitesse plus grandes que celles exigées pour le nager de la part des poissons. Il n'a point, comme ceux-ci, le pouvoir de se mettre en équilibre avec le milieu qu'il doit parcourir, au moyen d'un organe intérieur qui rende sa pesanteur spécifique égale à celle de ce milieu. Ce milieu d'ailleurs présente bien moins de résistance aux puissances qui doivent le frapper pour y trouver un appui.

Si les oiseaux ne peuvent point se rendre aussi légers que l'air, il est cependant en leur pouvoir

---

(1) *Voyez* A. de Humboldt, *Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau-Continent*, tome II, page 17, in-8°. Paris, 1816.

de se procurer une pesanteur spécifique qui ne soit pas de beaucoup supérieure à celle de ce fluide. La nature leur a accordé une légèreté très-grande, en leur attribuant un vaste poumon, extrêmement dilatable par la grande mobilité des parois du thorax, et en étendant ce poumon dans l'abdomen par des sacs membraneux, et, dans les principales pièces du squelette, par des canaux qui font communiquer ces sacs abdominaux et ces conduits aériens osseux avec l'organe pulmonaire; de manière que tout le corps, gonflé d'un air raréfié par une chaleur bien grande, puisqu'elle est de dix degrés supérieure à celle des autres animaux à sang chaud, revêtu par des plumes presque aussi légères que l'air lui-même, a peu de forces à employer pour s'y soutenir. D'un autre côté, lorsque les ailes sont déployées, elles présentent au fluide une surface très-étendue : les muscles pectoraux qui les mettent en mouvement sont d'ailleurs assez puissans pour le frapper avec une force, et réitérer cette percussion avec une rapidité et une persévérance dont aucun autre animal ne seroit capable. On sait combien sont forts (1) les muscles de l'aile, même sur les vo-

(1) Les oiseaux ont trois muscles pectoraux ; le *grand*, qui est attaché à leur énorme sternum, et pèse plus lui seul que tous les autres muscles de l'oiseau pris ensemble ; le *moyen*, dont le tendon se contourne sur une espèce de poulie, et s'attache à la tête de l'humérus, qu'il relève : au moyen de cette

lailles de nos basses-cours, qui les exercent si peu. Enfin la contractilité dont sont animés ces muscles si robustes est supérieure dans l'oiseau à ce qu'elle est dans aucun autre animal; nul n'est doué d'autant de force sous un égal volume. Quel quadrupède du poids de l'aigle pourroit porter avec ses pates des coups aussi violens que le fait cet oiseau, lorsque, pour étourdir sa proie ou se défendre contre un agresseur, il le frappe des coups redoublés de son aile? Cette énergie musculaire est sans doute liée à l'étendue de la respiration, aux qualités vivement stimulantes d'un sang plus chaud, plus oxidé, plus concrescible, plus artériel, en un mot, que celui de tous les autres animaux.

Voyons comme l'oiseau exécute le vol, avec des circonstances d'organisation si favorables à ce mouvement. Il commence par s'élancer dans l'air, en sautant de terre ou en se précipitant de quelque hauteur; s'il est à terre, et que ses ailes soient trop grandes pour être librement déployées dans toute leur largeur, il s'élève difficilement; il doit, dans ce cas, marcher vers une butte isolée, afin de s'en élancer et de trouver un espace suffi-

---

disposition, la nature a pu placer un releveur en bas, et donner ainsi plus de pesanteur à la partie inférieure du corps de l'oiseau, qui, sans cette espèce de leste, eût pu chavirer dans l'espace; le troisième pectoral, ou le *petit*, est destiné à rapprocher l'humérus du corps.

sant pour étendre ses ailes, et frapper l'air du premier coup qui doit l'élever. Les ailes se déploient horizontalement, l'humérus, qui en est la partie principale, étant élevé et écarté du corps, puis elles s'abaissent brusquement; et comme l'air résiste à l'effort subit qui tend à le déprimer, le corps de l'oiseau est élevé par une sorte de réaction élastique, analogue au saut de l'homme et au nager des poissons; l'impulsion donnée, l'oiseau plie l'aile, se fait le plus petit possible, afin que cette impulsion soit presque entièrement employée à le faire monter, et ne soit pas neutralisée par la résistance que l'air oppose à son ascension. Cette résistance, mais surtout son poids, surmontent bientôt la vitesse acquise, et il redescendroit, si de nouveaux coups d'ailes ne lui imprimoient une nouvelle vitesse ascendante. Le second coup est-il donné avant que toute l'impulsion communiquée par le premier soit détruite, l'oiseau s'élève par un mouvement accéléré; est-il retardé, au contraire, l'oiseau descend; s'il ne se laisse tomber qu'à la hauteur du point de départ, il peut, par une suite de vibrations égales, se maintenir à la même élévation. Quelquefois l'oiseau supprime tout-à-fait les battemens de ses ailes; il les ploie contre son corps, et tombe, par un mouvement accéléré, comme tout corps grave. On appelle *foudre*, ou descente foudroyante, cette chute soudaine par laquelle les oiseaux chasseurs fondent sur leur proie. On voit quelquefois un

faucon qui, planant au milieu des airs, s'abat tout à coup sur une basse-cour; si, près d'arriver à terre, il aperçoit quelque danger, il déploie aussitôt ses ailes, et prévient ainsi sa chute; car quelle que soit la vitesse qu'il ait acquise dans ce mouvement accéléré, la résistance de l'air augmente toujours comme le carré des vitesses; puis il s'élève de nouveau, et fuit, en attendant une occasion plus heureuse. On donne le nom de *ressource* à cette action particulière.

Les mouvemens obliques diffèrent du mouvement vertical que nous venons de décrire, en ce que l'oiseau monte par une suite de courbes, d'autant plus surbaissées ou plus petites, que le mouvement horizontal l'emporte davantage sur le mouvement vertical. A raison de la force particulière de leurs ailes, les oiseaux de proie ont un mouvement horizontal très-grand; de manière que, dans le *planer*, les courbes décrites sont si peu prononcées, que le mouvement paroît entièrement dirigé vers l'horizon.

Pour beaucoup d'oiseaux, la nage est un mode de progression plus naturel que le vol lui-même; ces oiseaux très-légers ont le corps couvert d'un duvet et de plumes sur lesquelles l'eau glisse avec une grande facilité; leur corps aplati repose sur le liquide par une grande surface; leur bassin évasé est taillé en carène; enfin les doigts de leurs pates, réunis par des membranes, frappent l'eau par une large surface, etc. C'est ce qu'on observe dans

la nombreuse tribu des oiseaux palmipèdes ou aquatiques.

Ceux qui ont cru à la possibilité que l'homme se soutînt au milieu des airs, en le rendant spécifiquement très-léger, n'ont point fait attention qu'il étoit impossible de donner aux muscles qui meuvent les bras assez de force pour remuer les machines qu'on y adapte. Aussi tous ceux qui ont essayé d'en faire usage ont péri victimes de ces essais téméraires.

CLXXXIX. *De la Reptation.* Tous les mouvemens progressifs dont l'homme et les animaux sont capables peuvent se rallier à la théorie du levier de la troisième espèce. Le corps, dans le saut comme dans la marche, peut être comparé à une courbe élastique, puisque le point d'appui est dans le sol, la force, le ressort ou la puissance, dans les muscles extenseurs, et la résistance dans le poids du corps. La course est-elle autre chose qu'une suite de sauts raccourcis? et son mécanisme ne tient-il pas le milieu entre ceux de la marche et du saut? Le vol et la natation ne sont-ils pas des sauts véritables, dans lesquels le corps de l'animal se ploie et se déploie par mouvemens alternatifs, en s'appuyant sur des milieux bien moins résistans que la terre, sur laquelle la marche, la course et le saut ordinaire s'exécutent? Le mode de progression particulier aux serpens et aux reptiles nous va fournir une nouvelle application de la théorie du troisième levier. La couleuvre, qui

fuit en roulant son corps en ondulations horizontales, établit dans sa longueur une série d'arcs qui se courbent et se redressent d'une manière successive, en procédant de la tête vers la queue, mais quelquefois aussi de la queue vers la tête, chez ces serpens que l'on désigne par le nom d'*amphisbænes* ou de *doubles marcheurs*, parce que la disposition des plaques écailleuses qui garnissent le dessous de leur ventre est aussi avantageuse pour reculer que pour avancer.

Le ramper des serpens est favorisé par la forme allongée de leur corps, le poli de leurs écailles, la force immense de leurs muscles, et la flexibilité de leur colonne vertébrale ; les os qui forment cette partie du squelette sont articulés par *arthrodrie*, lâchement unis, de manière qu'il suffit d'une percussion légère pour détruire leur assemblage : aussi les serpens les plus monstrueux peuvent-ils être tués d'un seul coup de baguette, lorsqu'on les frappe sur le dos. Les inflexions latérales de cette colonne sont très-étendues; l'extension est bornée par les apophyses épineuses, quelquefois très-développées, comme dans le serpent à sonnettes. Aussi, quoi qu'en aient dit plusieurs auteurs, quoique les peintres représentent, dans leurs tableaux, le serpent recourbé en arcs verticaux, sa progression s'effectue, dans le plus grand nombre des cas, par ondulations horizontales.

Lorsque le serpent veut nager, il est obligé d'accélérer la formation et le déploiement des ondes

ou courbures sinueuses qu'il décrit; nager n'est pour lui autre chose que ramper plus vite et se mouvoir sur un plan moins résistant.

Les mouvemens des reptiles, dans la natation, doivent l'emporter, autant par la force et par la rapidité, sur ceux des reptiles qui rampent à terre que celle-ci surpasse l'eau par la fixité du point d'appui. Si le serpent veut sauter, il détend rapidement et à la fois tous ses arcs, en s'appuyant sur l'extrémité de celui qui est le plus voisin de la queue; alors, comme je l'ai observé plusieurs fois, il en décrit le plus petit nombre possible, se recourbe seulement en trois ou quatre arcs plus étendus que de coutume, mais jamais en un seul, quelle que soit la longueur de son corps.

Les tortues, les grenouilles, les lézards, les salamandres, tous les reptiles à pates se traînent plutôt sur le ventre, en se soutenant mal sur leurs pates débiles et trop disproportionnées au volume de leur corps, qu'ils ne rampent par un mécanisme comparable à celui que nous venons d'expliquer.

Le mode de progression particulier à la chenille et aux vers est un ramper analogue à celui des serpens. Les pates de la chenille, trop foibles pour la soutenir ou servir seules à sa progression, sont employées par elle pour s'accrocher aux plans sur lesquels elle s'avance, courbant en arcs, le plus souvent verticaux, les parties de son

corps qui se trouvent entre les pates, disposées par paires plus ou moins éloignées. Les chenilles revêtues d'une enveloppe écailleuse rampent mieux, en raison de l'élasticité des plaques qui s'ajoute à l'action contractile de leurs fibres musculaires. Les vers de terre s'avancent, tantôt par ondulations, comme la couleuvre, tantôt en se traînant à la manière des limaces sans coquille. Cette dernière variété de la reptation consiste en ce qu'au lieu d'arcs étendus et fortement prononcés, les fibres contractiles du reptile se raccourcissent de la tête fixée vers la queue mobile, et ne font décrire au corps de l'animal que des inflexions légères. On peut établir un point de comparaison entre le mouvement par lequel l'homme couché à plat-ventre sur un plan horizontal s'avance en entraînant tout le corps vers ses bras étendus et accrochés à une résistance quelconque, et le mode de ramper particulier à quelques reptiles. Le colimaçon se déplace presque entièrement à la faveur de ce mécanisme.

Cette limace, chargée de sa coquille, adhère au plan qui la soutient par un liquide visqueux et gluant, qui se coagule, et forme sur ses traces un vernis brillant. Elle s'y fixe encore en faisant le vide avec la portion de son corps sur laquelle elle rampe, portion élargie, à bords frangés, et très-propre à former une ventouse. C'est par ce double moyen d'un suc visqueux et gluant, et d'un suçoir contractile, que le colimaçon fixe la partie

antérieure de son corps, et attire ensuite vers cette partie fixée le reste du corps chargé de son habitation calcaire. Cette partie de la limace à coquille, par laquelle elle s'attache au sol sur lequel elle rampe, a une certaine analogie avec les tentacules qui servent à la progression de la sèche et de tous les autres mollusques céphalopodes.

CXC. *Mouvemens partiels, exécutés par les membres supérieurs.* Ces mouvemens vont nous offrir de nouveaux exemples de la courbe élastique ou du troisième levier, à la théorie duquel peuvent se ramener presque tous les mouvemens des animaux et de l'homme. Cette idée simplifie et facilite singulièrement l'étude de la mécanique animale; elle peut être regardée comme une formule générale à l'aide de laquelle on obtient la solution de tous les problèmes que renferme cette intéressante partie de la physique. C'est par son emploi que ce que nous avons dit des mouvemens se distingue surtout de ce qui avoit été dit jusqu'à ce jour.

Les extrémités supérieures de l'homme ne servent pas ordinairement à ses mouvemens progressifs, si l'on en excepte certains cas, celui, par exemple, où, les membres étant étendus et les mains accrochées à un corps, l'action des grands pectoraux entraîne le corps entier, suspendu ou couché à plat-ventre sur un plan horizontal.

Nous grimpons difficilement, parce que les

mains seules sont propres à saisir les corps sur lesquels ce mode de progression peut s'effectuer, tandis que les quatre extrémités des quadrumanes, les ongles aigus des chats, ceux des oiseaux grimpans, rendent pour ces animaux le grimper extrêmement naturel et facile.

Trop de disproportion existe, pour la longueur et pour la force, entre les extrémités supérieures et inférieures, pour que le marcher sur les mains soit un mode de progression naturel à l'espèce humaine; d'ailleurs, comme Daubenton l'a observé, la position du grand trou occipital rend cette attitude extrêmement embarrassée. La situation de cette ouverture près le centre de la base du crâne, dans un plan presque horizontal, empêche de relever la tête assez haut pour tourner le visage en avant et voir devant soi; et si l'on veut l'abaisser jusqu'à terre, on ne peut la toucher qu'avec le front ou le sommet de la tête, etc. (1) Mais si les membres supérieurs ou thorachiques ne servent point à nous transporter où nos besoins l'exigent, ils sont presque exclusivement destinés aux mouvemens par lesquels nous agissons sur les objets dont nous sommes rapprochés.

Voulons-nous pousser ou attirer vers nous, porter ou lancer au loin un corps mobile, le com-

---

(1) Dictionnaire d'histoire naturelle de l'Encyclopédie méthodique. Introduction, pag. 21 et suiv.

primer, le lever ou l'abaisser, etc., les membres supérieurs, presque seuls, servent à ces usages. Voici de quelle manière :

Dans le *pousser*, l'homme se porte entre l'obstacle et le sol; il se plie entre ces deux points par la flexion de toutes ses parties, après quoi il se redresse; tout son corps représente un ressort qui se débande, et dont les deux extrémités rencontrant deux obstacles, le sol et le corps auquel on veut communiquer une impulsion exercent leur action contre le plus mobile; la force est égale à la contraction des extenseurs qui allongent le corps raccourci, et font avancer l'obstacle mobile, de toute la différence qui existe, pour la longueur, entre l'homme dont le corps et les membres sont fléchis, et l'homme dont toutes ces parties sont étendues. C'est de la même manière, et par un mécanisme en tout semblable que le batelier qui appuie son aviron contre le rivage en éloigne sa barque; la colonne vertébrale représente une courbe élastique qui se redresse entre les pieds fixés au bateau mobile, et l'extrémité de la perche ou de l'aviron appuyée contre le rivage ou le fond du fleuve.

Voulons-nous, au contraire, *attirer* à nous un corps, nous le saisissons avec nos bras étendus, puis nous fléchissons ceux-ci avec force; ici le ressort tendu se raccourcit, l'effort est tout entier du côté des fléchisseurs; il est moins fixe et moins durable que celui des extenseurs, parce que les

axes des os ne se correspondent pas en ligne droite, et que la traction est le plus souvent partielle.

Nous pouvons lancer au loin un corps mobile, ou bien le bras étant pendant, et effectuant de simples oscillations, ou bien le bras exécutant des mouvemens de circumduction ou en fronde. Dans ce dernier mode, on agit avec beaucoup plus de force, parce que tous les muscles, qui, du tronc vont à l'extrémité supérieure, concourent à l'action. Dans le premier, les oscillations préliminaires donnent au bras un mouvement propre qui s'ajoute à la force de contraction musculaire et en augmente l'effet.

Le professeur Barthez a très-bien vu que les mouvemens par lesquels l'extrémité supérieure se roidit et s'étend pour lancer au loin un mobile, ou pour repousser une résistance qui lui est opposée, sont parfaitement semblables au saut, et présentent, comme lui, un déploiement subit d'articulations fléchies. Dans les mouvemens contre une résistance insurmontable, le corps n'est point repoussé avec la force que lui imprime, dans le saut, la brusque extension des membres inférieurs. L'omoplate est trop mobile par rapport au tronc; son articulation avec l'humérus est trop peu solide, et l'axe de cet os n'est point dirigé, par rapport à l'épaule, d'une manière assez favorable pour que, lors même que les forces seroient égales (et elles sont loin d'être les mêmes), l'impulsion

communiquée fût aussi grande. Dans toute répulsion et dans toute attraction, soit que nous rapprochions de nous ou que nous en éloignions un objet, en agissant sur lui avec les membres supérieurs, ces membres figurent un arc élastique qui se courbe ou se redresse par l'action de ses fléchisseurs ou de ses extenseurs; et ces mouvemens, comme le plus grand nombre de ceux que nous avons étudiés jusqu'ici, offrent une application précise de la théorie du levier de la troisième espèce.

L'action de saisir un corps avec la main est facilitée, 1° par la rotation du radius sur le cubitus, qui opère la pronation et la supination, mouvemens exclusivement attribués aux mains, et dont les pieds ne sont point capables; 2° par la mobilité du poignet, qui, à proprement parler, se fléchit et s'étend en deux sens; car l'extension de la main ne se borne point à la ramener au parallélisme avec l'axe du membre, mais va jusqu'à la renverser sur la face postérieure de l'avant-bras, phénomène qu'aucune autre articulation ne présente; 3° par les glissemens obscurs des os du carpe, glissemens à la faveur desquels la paume de la main est rendue plus concave; 4° par les mouvemens d'opposition et de circumduction du pouce et du petit doigt; 5° par la multiplicité des phalanges : tout, dans cette dernière partie des membres supérieurs, semble en prouver l'excel-

lence, et justifie les philosophes et les naturalistes qui ont longuement disserté sur les avantages de sa structure.

Pour effectuer une pression, celle, par exemple à l'aide de laquelle on imprime un cachet, on porte le poids presque entier du corps sur l'une des extrémités supérieures, fortement étendue, en ayant soin que l'épaule soit penchée sur le bras de telle manière que la cavité glénoïde de l'omoplate devienne perpendiculaire à la tête de l'humérus.

Il seroit superflu d'entreprendre la description de tous les mouvemens que nos parties peuvent exécuter; ces mouvemens partiels sont exposés dans les traités d'anatomie, à l'article des muscles de l'action desquels ils dépendent: qu'il nous suffise d'avoir parcouru les principaux phénomènes de la mécanique animale, considérés principalement chez l'homme. Des détails plus étendus sur la mécanique des animaux seroient déplacés dans cet ouvage; on les trouve dans les traités *ex professo* (1) sur cette partie importante de la physiologie, la seule dans laquelle on puisse porter les divers objets de démonstration à ce degré d'évi-

---

(1) Consultez J.-A. Borelli, *de Motu animalium*, in-4°. Les erreurs que renferme cet ouvrage tiennent à ce que son auteur étoit bien plus mathématicien qu'anatomiste.

P.-J. Barthez, nouvelle Mécanique des mouvemens de l'homme et des animaux.

dence et de certitude mathématique que recherche avec avidité tout homme dont l'esprit est exact, le raisonnement solide et le jugement sévère.

CXCI. Les mouvemens partiels peuvent encore être étudiés comme signes expressifs des idées; ils composent ce que l'on nomme *langage d'action*, et suppléent à la parole : le langage des gestes, perfectionné, suffit même pour exprimer les idées les plus fines, les sentimens les plus délicats, dans les scènes muettes connues sous le nom de *pantomimes*. Les gestes dont l'homme le plus calme accompagne ses discours sont une langue surajoutée à la langue parlée; ils contribuent à expliquer sa pensée. Mais combien, dans l'homme passionné, les gestes n'ajoutent-ils point de force à l'expression, et de puissance au langage! Cette éloquence du geste, si souvent employée pour émouvoir profondément et entraîner la multitude assemblée dans les places publiques de Rome et d'Athènes, étoit familière aux orateurs des anciennes républiques; et le moment où Marc-Antoine découvre et montre au peuple romain le corps sanglant du premier des Césars n'est pas l'endroit le moins éloquent de sa harangue.

Ainsi, quoique l'organe de la voix soit celui qui nous offre le plus de ressources pour exprimer nos idées, pour communiquer avec nos semblables; quoique l'ouïe soit le sens auquel nous devons nous adresser pour produire en eux des impressions variées, distinctes et durables, cepen-

dant nous nous adressons encore à leur tact et à leur vue lorsque nous voulons les ébranler fortement, en leur expliquant énergiquement nos désirs. Ces trois divers langages sont simultanément employés lorsque nous entraînons un homme vers un but, et qu'en même temps nous lui montrons ce but et lui disons d'y aller; ici l'attouchement et le geste servent d'auxiliaires à la parole, et attestent dans celui qui les emploie une volonté ferme et décidée. Les mouvemens des yeux, des sourcils, des paupières, des lèvres, et en général de toutes les parties du visage, ceux des membres supérieurs, et du tronc lui-même, servent à exprimer nos passions comme nos idées, suppléent à la langue conventionnelle; et ces signes naturels la trahissent souvent, en disant le contraire de ce qu'elle exprime. L'étude des gestes, des mouvemens et des attitudes, considérés comme signes des idées et des passions, est du ressort des métaphysiciens, des peintres, des sculpteurs et des physiognomonistes (1).

---

(1) Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines; Buffon, Histoire naturelle de l'homme; Vinkelman, Traité de l'art; Lavater, Essai de physiognomonie.

CHAPITRE IX.

De la Voix et de la Parole.

CXCII. La voix est un son appréciable, résultant des vibrations que l'air, chassé des poumons, éprouve en traversant la glotte. De ce son, articulé par les mouvemens de la langue, des lèvres et des autres parties de la bouche, naît la parole, que l'on peut définir la *voix articulée.*

Tous les animaux pourvus d'un organe pulmonaire ont de la voix; car il suffit, pour la production de ce son, que l'air, accumulé dans un receptacle quelconque, en soit chassé en masse, avec une certaine force, et rencontre sur son passage des parties élastiques et vibratiles. Les poissons, qui n'ont que des branchies, ne font entendre aucun son; mais ce désavantage, qui nuit sans doute à l'étendue et à la facilité de leurs relations, est en partie réparé par l'extrême vélocité de leurs mouvemens progressifs.

L'instrument de la voix est le larynx, espèce de boîte cartilagineuse, placée à la partie supérieure de la trachée-artère. Les cartilages minces et élastiques qui forment ses parois sont unis ensemble par des membranes, et mus les uns sur les autres par plusieurs petits muscles appelés

intrinsèques du larynx. Ces cinq cartilages paroissent concourir à la formation de la voix, et y contribuer chacun pour une part plus ou moins importante. L'épiglotte elle-même sert à la production de ce phénomène, sans que pour cela ce cartilage doive être regardé comme absolument inutile dans le mécanisme de la déglutition. Si l'on raisonnoit comme ceux qui ont avancé cette opinion pour avoir vu la fonction s'accomplir sur des chiens auxquels ils avoient extirpé l'épiglotte, on pourroit dire que ce fibro-cartilage est parfaitement étranger aux modulations de la voix : le rossignol n'a point d'épiglotte.

Le cartilage cricoïde qui supporte les deux aryténoïdes et leur sert de base, n'est point immobile à la partie inférieure du larynx. La trachée-artère, à laquelle il est attaché par son bord inférieur, cède et s'allonge pour en permettre les mouvemens. Le thyroïde et les aryténoïdes complètent cet appareil de parties cartilagineuses, élastiques et éminemment vibratiles, qui sont mises en mouvement par neuf petits muscles (1), eux-mêmes animés par quatre branches de nerfs appelés *laryngés*, et distingués en supérieurs et en inférieurs. Ces rameaux nerveux sont fournis par la huitième paire ou les nerfs pneumogastriques. Les nerfs laryngés inférieurs, appelés *récurrens*

(1) Crico-thyroïdiens, crico-aryténoïdiens postérieurs et latéraux, thyro-aryténoïdiens et aryténoïdien.

d'après leur direction, sont depuis long-temps célèbres par l'expérience publique que fit sur eux Galien (1), pour prouver que l'animal sur lequel on les coupe devient muet aussitôt. Parmi les modernes, plusieurs de ceux qui ont répété l'expérience de Galien ont trouvé que la voix ne s'éteignoit point entièrement, soit que l'on coupât ces deux nerfs, soit que l'on en fît la ligature. Haller (2) attribue cette différence dans les résultats à plusieurs causes, au nombre desquelles il range la conservation des nerfs laryngés supérieurs, qui peuvent, dit-il, suffire à la production du son vocal. Le même physiologiste avait reconnu dans ses expériences (3) que la ligature de l'un des nerfs pneumogastriques éteint la moitié de la voix, et qu'en les liant tous les deux, entre autres phénomènes, on produit une aphonie complète.

Les nerfs laryngés concourent donc aussi bien que les récurrens à la production de la voix, qu'éteint la section des deux nerfs pneumogastriques, faite au-dessus de l'endroit où ils s'en détachent. Les nerfs récurrens se rendent exclusivement aux muscles crico-aryténoïdiens postérieurs et latéraux, ainsi qu'aux thyro-aryténoïdiens; le nerf

---

(1) *De Hippocrat. et Plat. Decret.* l. 2, c. 6. *Administrationes anatomicæ*, *l.* 8, *c.* 5.

(2) *Aut demùm nervus laryngis naturæ suffecit. Element. physiolog.* t. III, p. 409.

(3) Second mémoire sur les parties irritables et sensibles.

laryngé, au contraire, anime les muscles cricothyroïdiens et aryténoïdiens. D'après cette distribution des nerfs du larynx, on conçoit parfaitement comment, la section des récurrens étant faite, la glotte se resserre encore presque complétement par l'action des trois derniers muscles, agens principaux de son rétrécissement.

La glotte, longue de dix à onze lignes dans un homme adulte, et large de deux à trois vers l'endroit où elle a le plus de largeur, est la partie la plus essentielle du larynx; elle est véritablement l'organe de la voix, qui s'éteint tout à coup lorsqu'en ouvrant la trachée-artère ou le larynx au-dessous d'elle, on empêche l'air de la traverser. La parole seule est perdue lorsque la plaie est faite au-dessus de l'endroit qu'occupe la glotte; ce qui prouve que la voix et la parole sont deux phénomènes bien distincts, dont l'un se passe dans le larynx, tandis que l'autre résulte de l'action des diverses parties de la bouche, et surtout des lèvres. L'ouverture de la glotte, examinée sur un animal vivant, s'ouvre et se ferme, et ses mouvemens alternatifs sont parfaitement isochrones avec ceux de la respiration; la glotte s'ouvre, l'air pénètre dans les poumons; la glotte se ferme et puis s'ouvre de nouveau pour la sortie de l'air expiré. Au moment où l'expiration cesse, le relâchement s'achève. L'ouverture est la plus grande possible, l'inspiration commence. La voix est un phénomène expiratoire : pour le produire, les

muscles intrinsèques du larynx se contractent et mettent les côtés de la glotte et cette ouverture elle-même dans des états différens, suivant la diversité des sons. Tandis que l'ouverture de la glotte s'ouvre ou se ferme pour l'entrée et la sortie de l'air, ou pour imprimer au son vocal les diverses modifications dont il est susceptible, l'ouverture supérieure du larynx, espace ovalaire circonscrit en avant par l'épiglotte, en arrière par les aryténoïdes, et sur les côtés par les replis de la membrane muqueuse qui se portent du sommet des cartilages aryténoïdes aux côtés de la lame épiglottique; l'entrée du larynx reste ouverte, béante, et comme passive par rapport aux phénomènes de la voix, ainsi qu'aux mouvemens de la respiration (1).

Les différentes modifications dont la voix est susceptible dépendent-elles de la grandeur et de l'étroitesse plus ou moins grande de la glotte, ou bien de la tension et du relâchement des ligamens qui forment les côtés de cette ouverture? Doit-on penser avec Dodart que le larynx est un instrument à vent, ou bien adopter l'opinion de

---

(1) Cette ouverture supérieure du larynx, si souvent confondue avec la glotte par les médecins qui ne l'ont point *vue*, est placée beaucoup plus haut que cette dernière ouverture, laquelle existe à peu près vers le milieu de la hauteur de l'organe. Le nom d'*épiglotte* tend à perpétuer et à propager cette erreur, en portant à croire que l'épiglotte est destinée à couvrir *immédiatement* la glotte.

Ferrein qui le regarde comme un instrument à cordes ?

Il est bien vrai que la voix se renforce, grossit et passe de l'aigu au grave à mesure que la glotte s'agrandit par les progrès de l'âge; qu'elle reste toujours plus foible et plus aiguë chez la femme, dont la glotte, est, à peu près, d'un tiers moins grande que celle de l'homme; mais la tension ou le relâchement des ligamens, qui forment les côtés de la glotte (*cordes vocales de Ferrein*), ne rendent-ils pas ces ligamens susceptibles d'exécuter, dans un temps donné, des vibrations plus ou moins étendues et plus ou moins rapides? de telle manière que, si l'air, chassé des poumons par l'expiration, vient les frapper dans l'état de tension, produit par l'action des muscles *crico-aryténoïdiens postérieurs*, qui portent en arrière les cartilages aryténoïdes, auxquels sont attachés les ligamens de la glotte, tandis que le thyroïde, auquel est attachée l'autre extrémité des mêmes ligamens, est porté en bas et en avant, par une sorte de bascule que lui font exécuter les muscles qui vont de ce cartilage au cricoïde (*crico-thyroïdiens*) (1), la voix sera aiguë, c'est-à-dire claire et

(1) Le muscle aryténoïdien sert à la production des sons aigus, en rapprochant les deux cartilages aryténoïdes. M. Magendie prétend que le véritable usage des crico-thyroïdiens est d'élever le cartilage cricoïde sous le bord inférieur du thyroïde; mais les raisons qu'il en donne ne me paroissent pas plausibles. Quant à l'expérience, elle ne décide rien ici, l'ef-

perçante, au lieu qu'elle seroit grave, si les arytĕnoïdes, étant ramenés en avant par l'action des muscles *circo-aryténoïdiens latéraux* et *thyro-aryténoïdiens*, les cordes vocales, relâchées, exécutoient des vibrations moins fréquentes.

Tous ces petits muscles intrinsèques du larynx ne concourent pas seulement à la production de la voix par l'action qu'ils exercent sur les côtés de la glotte; plusieurs d'entre eux, et spécialement les thyro-aryténoïdiens, peuvent être considérés comme faisant partie de cette ouverture dont ils recouvrent les côtés (1). Ces petits muscles, gonflés dans l'état de contraction, sont susceptibles d'un mouvement vibratile, variable suivant le degré de la contraction elle-même; en sorte qu'à la faveur de ces fibres musculaires qui garnissent ses côtés, la glotte est susceptible de vibrations analogues à celle des lèvres appliquées à l'embouchure d'un cor, comme M. Dutrochet en a fait la remarque dans sa thèse inaugurale ayant pour titre : *Essai d'une nouvelle théorie de la voix* (2). La production de ce son est donc principalement

---

facement de l'intervalle crico-thyroïdien pouvant dépendre de l'abaissement du cartilage thyroïde aussi-bien que de l'élévation du cricoïde.

(1) Albinus, *Historia musculorum*, p. 260. Pars hujus musculi decurrit secundùm ventriculum laryngis, ei extrinsecùs adjecta, eumque idcircò valet premere.

(2) Thèses de la Faculté de médecine de Paris, in-4°, juin 1806.

due à l'action vitale. La voix résulte essentiellement des contractions des muscles intrinsèques du larynx ; aussi la paralysie de ces organes en entraîne-t-elle inévitablement la perte.

On a objecté à Ferrein que, pour remplir l'office de cordes vibrantes, les ligamens de la glotte n'étoient ni secs, ni tendus, ni isolés, triple condition nécessaire à la production du son dans les instrumens auxquels cet anatomiste a comparé le larynx; mais, pour ne point ressembler parfaitement à des cordes, les ligamens de la glotte, analogues aux corps vibratiles, placés à l'embouchure des instrumens à vent, tels que les hanches des hautbois, le bec des flûtes, les lèvres elles-mêmes dans le cor, ne contribuent pas moins à la formation et aux inflexions variées du son vocal. Il est d'autant plus difficile de rejeter absolument leur influence, que leur état de tension coïncide toujours avec le rétrécissement de la glotte, et que, ces deux conditions produisant le même effet, il est difficile de décider s'il est dû à l'une plutôt qu'à l'autre, comme il est impossible de déterminer si c'est de l'agrandissement de l'ouverture, ou du relâchement des ligamens, que les tons graves dépendent. Une dernière raison qui me semble devoir faire regarder le larynx comme remplissant à la fois les usages d'un instrument à vent et d'un instrument à cordes, c'est que la ligature ou la section des nerfs récurrens et laryngés, qui donnent à ses muscles intrinsèques la faculté con-

tractile, entraîne la perte de la voix; ce qui prouve bien évidemment la nécessité d'une action quelconque dans les côtés de l'ouverture.

Quand nous voulons parler à voix basse, nous ne contractons que foiblement, ou même nous supprimons tout-à-fait les contractions des muscles du larynx dont l'action est entièrement soumise à l'empire de la volonté. La colonne d'air ne rencontrant alors, dans son passage à travers la glotte, que des parties relâchées et peu capables de vibrer, le son vocal cesse de se produire. L'extinction permanente de la voix doit dépendre, dans le plus grand nombre des cas, de la paralysie des muscles vocaux ou intrinsèques du larynx. Tout engorgement de la membrane muqueuse, qui recouvre les côtés de la glotte, en les rendant peu susceptibles de vibrer, tend également à éteindre le son vocal. Telle est cette extinction complète et passagère de la voix dont s'accompagnent certaines toux catarrhales.

On doit donc, en rejetant les explications opposées et trop exclusives de Ferrein et de Dodart, voir dans le larynx un instrument qui réunit les avantages, et présente le double mécanisme des instrumens à vent et des instrumens à cordes; c'est pour cela qu'il l'emporte sur tous ceux de la musique, par l'étendue, la perfection et surtout l'inépuisable variété de ses effets. Il n'est personne qui, assistant à un concert, entendant un solo de cor exécuté par un artiste habile, n'ait été frappé de

la ressemblance entre les effets de cet instrument et ceux de la voix humaine. C'est que le corps vibratile, placé à l'embouchure de l'instrument, est animé; c'est que les lèvres, comme les côtés de la glotte, sont mobiles et contractiles; l'ouverture de la bouche se dilate ou se rétrécit, et en même temps ses bords se relâchent ou se durcissent par la contraction des muscles des lèvres.

Les modifications de la voix dépendent non-seulement des grandeurs variées de l'ouverture de la glotte et de la contraction des muscles du larynx, mais encore de la disposition différente des diverses parties du pharynx et de la bouche. Suivant que la base de la langue, plus ou moins rapprochée de la voûte palatine, rend l'isthme du gosier plus étroit ou plus large, que par les mouvemens des lèvres, l'ouverture de la bouche change de dimensions, le son vocal se trouve plus aigu ou plus grave; la glotte alors, comme le bec de la flûte, fournit l'élément du son, modifié à mesure qu'il s'éloigne du lieu où il est produit. La longueur plus ou moins considérable de la trachée-artère influe-t-elle aussi sur les qualités du son? Le chanteur qui veut parcourir l'échelle entière des sons, en passant du plus aigu au plus grave, raccourcit manifestement le col et la trachée, tandis qu'il les allonge pour produire un effet contraire.

La force de la voix (1) dépend du volume d'air

(1) Les marins, et ceux qui habitent les bords des grands

qui peut être à la fois chassé du poumon, et de la plus ou moins grande vibralité dont jouissent les parois des canaux qui le transmettent au-dehors. Les oiseaux, dont le corps est tout *aérien*, ont une voix très-forte, si on la compare à leur grosseur. Leur trachée-artère, pourvue d'un double larynx (1), est presque entièrement cartilagineuse: elle l'est surtout dans certains oiseaux criards, comme le geai et quelques autres, tandis qu'elle est presque toute membraneuse chez le hérisson, petit quadrupède dont les cris sont presque imperceptibles.

Le sifflement des couleuvres et le coassement des grenouilles se font entendre à une certaine distance, parce que ces reptiles peuvent chasser une grande masse d'air, à la fois, de leurs poumons vésiculaires, et que, chez les dernières, les cordes vocales sont complétement isolées des parois du larynx, avec lesquelles elles se continuent dans les autres animaux.

La voix des hommes est d'autant plus forte, que leur poitrine présente une plus vaste capacité; elle foiblit toujours après les repas, lorsque l'estomac et les intestins, distendus par les alimens, refou-

---

fleuves, ont ordinairement la voix forte, parce qu'obligés de couvrir le bruit des flots par l'éclat de la voix, ils exercent davantage ses organes.

(1) Consultez les Mémoires de M. Cuvier, sur le double larynx et la voix des oiseaux.

lent le diaphragme et s'opposent à son abaissement. La voix, formée dans le passage de l'air à travers la glotte, acquiert beaucoup de force et d'intensité, devient beaucoup plus sonore par les réflexions que l'air éprouve dans la bouche, et dans les anfractuosités nasales. Elle foiblit et s'altère désagréablement lorsqu'un polype des fosses nasales ou de la gorge, ou la destruction de la voûte palatine, empêchent l'air de parcourir les fosses nasales et leurs divers sinus. On dit qu'alors la voix est *nasonnée*, quoique cette altération dépende au contraire de ce qu'elle n'est point convenablement modifiée par les cavités que le nez recouvre.

M. Biot (1), parlant de cette altération de la voix, avance, sans preuves, que le son vocal devient *nasillard* dès qu'il traverse les fosses nasales. Il suffit de fredonner un air la bouche fermée pour s'assurer du contraire. Le son ne devient désagréable qu'au moment où l'on rétrécit l'ouverture des narines. Il est vrai que la voix est sourde, dans les cas où, par l'effet d'une nécrose de la voûte palatine, il s'est établi communication entre les fosses nasales et la bouche; mais alors le croisement, la déviation des colonnes d'air, suffit pour expliquer l'altération.

CXCIII. *De la Parole.* Parler à *voix basse*, c'est

(1) Traité de physique.

articuler des sons très-foibles, qui, à vrai dire, ne méritent pas le nom de voix, puisqu'ils surpassent à peine le bruit qui accompagne toujours la sortie de l'air pendant l'expiration. L'homme seul peut articuler les sons, et jouit du don de la parole. La disposition particulière de la bouche, de la langue et des lèvres, rend, chez les quadrupèdes, toute prononciation impossible. Le singe, chez lequel ces parties sont conformées comme dans l'homme, parleroit comme lui, si l'air, en sortant du larynx, ne se répandoit dans les sacs hyo-thyroïdiens, membraneux chez quelques-uns, cartilagineux et même osseux dans l'alouate, dont le cri est si rauque et si lugubre. Chaque fois que l'animal veut crier, ces sacs se gonflent, puis se vident, de manière qu'il ne peut point à volonté fournir aux diverses parties de la bouche les sons qu'elles seroient capables d'articuler (1).

Les sons articulés sont représentés par des lettres qui en expriment toute la valeur. Pour peu que l'on y réfléchisse, on verra sans peine quel pas immense l'homme fit vers son perfectionnement lorsqu'il inventa ces signes propres à conserver et à transmettre ses pensées. Les sons vocaux sont exprimés par les lettres que l'on nomme *voyelles*, ce qui veut dire, lettres que la voix fournit presque toutes formées, et qui n'ont besoin,

(1) On observe dans l'âne une structure analogue.

pour être articulées, que de la plus ou moins grande ouverture de la bouche par l'écartement des mâchoires et des lèvres. Nous prononçons sans effort les lettres A, E, I, O, U; ce sont les premières que l'enfant fait entendre : elles paroissent d'ailleurs lui coûter moins de fatigue que les *consonnes*. Celles-ci, qui forment la classe la plus nombreuse des lettres de l'alphabet, ne servent, comme leur nom l'indique, qu'à lier les voyelles. Leur prononciation est toujours moins naturelle, et par conséquent plus difficile. Aussi observe-t-on que les langues les plus harmonieuses, et dont les mots flattent le plus agréablement l'oreille, sont celles qui emploient le plus de voyelles et le moins de consonnes. C'est surtout par cet avantage que la langue grecque l'emporte sur toutes les langues anciennes et modernes (1); que, parmi les langues mortes, le latin tient le second rang; et qu'enfin le russe, l'italien et l'espagnol ont une prononciation plus agréable que le français, et surtout que tous les idiomes dérivés du langage teutonique, tels que l'anglais, l'allemand (2), le hollandais, le suédois, le danois, etc.

---

(1) *Graiis dedit ore rotundo*
Musa loqui.

HORAT.

(2) Il seroit difficile d'accumuler un plus grand nombre de consonnes dans le même mot qu'on n'en trouve dans ce nom propre d'un Allemand appelé SCHNEDER.

Chez quelques peuples du Nord, tous les sons articulés paroissent sortir du nez ou de la gorge, et forment une prononciation désagréable, sans doute parce qu'exigeant plus d'efforts, celui qui écoute partage la fatigue que paroît éprouver celui qui parle. Ne semble-t-il point que les peuples des pays froids soient engagés à user des consonnes préférablement aux voyelles, parce que leur prononciation n'exige point un égal degré d'ouverture de la bouche, et ne donne pas lieu, par conséquent, à l'admission continuelle d'un air glacé dans les organes pulmonaires? Le naturel doux et pacifique des habitans d'Otaïti et des autres îles fortunées de la mer du Sud se peint dans les expressions de leur idiome, où les voyelles abondent, tandis que la langue dure et barbare des sauvages eskimaux, des peuples du Labrador et de la Nouvelle-Zélande, est la conséquence naturelle de la rigueur du climat, de l'infertilité du sol qu'ils habitent, et de leurs habitudes féroces et guerrières.

On ne s'est pas contenté de distinguer les lettres en voyelles et en consonnes, on en a encore établi d'autres classes, d'après les parties qui servent plus spécialement au mécanisme de leur prononciation. Ainsi on reconnoît des voyelles simples et mixtes, et des *semi-voyelles* M, N, R, L, *labiales*, *orales*, *nasales* et *linguales*, suivant que, pour les articuler, la langue frappe la voûte palatine, les dents ou les lèvres; enfin les consonnes *explosives*

K, T, P, Q, G, D, B, et *sifflantes*, H, X, Z, S, J, V, F, C, qui sont plus nombreuses et plus fréquemment employées dans les langues dont la prononciation est la plus difficile. Si cette connoissance avoit un but directement utile, on pourroit expliquer le mécanisme de la prononciation de chaque lettre de l'alphabet, au risque de fournir une nouvelle scène au *Bourgeois gentilhomme*.

CXCIV. *Chant*, *Bégaiement*, *Mutisme*, *Engastrimysme*. Le chant n'est autre chose que la *voix modulée*, c'est-à-dire qui parcourt avec une vitesse variable les divers degrés de l'échelle harmonique, passe du grave à l'aigu, et de l'aigu au grave, en exprimant aussi les tons intermédiaires. Quoique le plus souvent notre *chant* soit *parlé*, la parole n'y est pas nécessaire. Cette action des organes de la voix exige plus d'efforts et de mouvemens que la parole, la glotte s'agrandit ou se resserre, le larynx s'élève ou s'abaisse, le cou s'allonge ou se raccourcit, les inspirations sont accélérées, prolongées ou ralenties; les expirations sont longues, ou courtes et brusques. Aussi toutes ces parties se fatiguent-elles plus que par la parole, et nous est-il impossible de chanter aussi long temps que nous parlons.

Quoi qu'en ait dit Rousseau, dans son *Dictionnaire de musique*, le chant peut être regardé comme l'expression la plus naturelle des passions de l'âme, puisque les peuples les moins civilisés expriment par des chants de guerre ou d'amour,

de joie ou de tristesse, les divers sentimens qui les agitent; et comme chaque affection de l'âme modifie la voix d'une certaine manière, la musique, qui n'est que le chant imité, peut, à l'aide des sons, peindre l'amour ou la fureur, la tristesse ou la joie, la crainte ou le désir, produire les émotions que ces divers états occasionent, maîtriser ainsi le cours de nos idées, diriger à son gré les opérations de l'entendement et les actes de la volonté (1). Comme chaque affection de l'âme modifie la voix d'une certaine manière, la musique, qui imite parfaitement ces modifications particulières, nous émeut en réveillant en nous des idées analogues, de la même manière que la vue d'une peinture lascive nous porte à la volupté. De tous les instrumens que cet art emploie, l'organe vocal de l'homme est, sans contredit, le plus parfait, celui duquel on peut obtenir les combinaisons les plus agréables et les plus variées. Qui ne connoît la propriété qu'a la voix humaine de se plier à tous les accens, et d'imiter tous les langages (2)? J'observerai, à l'occasion du chant, qu'il est spécialement consacré à l'expression des sentimens tendres ou des mouvemens passionnés, et que c'est le détourner de sa destination naturelle et primitive,

---

(1) *Lisez* Grétry, *Essais sur la musique*, etc.

(2) *Voyez*, dans l'*Aviceptologie française*, ou l'*Art de prendre toutes sortes d'oiseaux*, la manière dont on les attire dans les piéges en contrefaisant leur ramage.

que de l'employer dans les circonstances où l'on ne peut soupçonner aucune émotion chez ceux qui en font usage. C'est ce qui rend le récitatif de nos opéras si mortellement ennuyeux, et nous fait trouver si ridicules ces dialogues où les interlocuteurs s'entretiennent, en chantant, des choses les plus indifférentes. Les langues dont les mots renferment un plus grand nombre de voyelles sont par-là plus propres au chant, et favorisent davantage le développement du génie musical. C'est peut-être cet avantage d'une langue plus douce et plus sonore qui assure à la musique italienne la supériorité (1) dont elle jouit sur celle des autres peuples. La déclamation des anciens s'éloignoit beaucoup plus que la nôtre du ton habituel de la conversation, se rapprochoit davantage de la mu-

---

(1) Cette prééminence a été singulièrement contestée, surtout en France, où, vers le milieu du dernier siècle, s'éleva à ce sujet une guerre dans laquelle on vit toute la littérature divisée en deux partis, combattre pour savoir qui devoit l'emporter de la musique italienne ou de la musique française. Cette querelle, un moment apaisée par le renvoi des *bouffons*, se ralluma de nouveau au bout de quelques années, à l'occasion des opéras de Gluck et de Piccini. Dans la foule innombrable d'écrits, soit en vers, soit en prose, qu'elle fit éclore, on se rappellera toujours plusieurs épigrammes, la *Lettre* de Rousseau *sur la musique française*, et l'opuscule de d'Alembert : *de la Liberté de la musique*. Marmontel a fait également de ces disputes l'objet d'un poëme, qui porte le titre de *Voyages de Polymnie*.

sique, et pouvoit être notée comme un véritable chant.

L'agrément, la justesse de la voix, l'étendue et la variété des inflexions dont elle est capable dépendent de la bonne conformation de ses organes, de la flexibilité de la glotte, de l'élasticité des cartilages, de la disposition particulière des diverses parties de la bouche et des fosses nasales, etc. Il suffit que les deux moitiés du larynx, ou les deux fosses nasales soient inégalement développées, pour que la voix manque de précision et de netteté.

Le *bégaiement* est un vice dans la prononciation, trop connu pour qu'il soit besoin de le définir. Une langue trop volumineuse et trop épaisse, une diminution notable de l'irritabilité, comme dans l'état d'ivresse, à l'invasion d'une apoplexie, ou bien encore dans certaines fièvres de mauvais caractère; la longueur excessive du filet de la langue, en s'opposant à la promptitude et à la facilité de ses mouvemens, deviennent les causes du bégaiement. Il peut encore être produit par le manque ou le mauvais arrangement de plusieurs dents. Les mêmes causes, mais surtout la longueur du frein ou filet de la langue, retiennent cet organe contre la paroi inférieure de la bouche, et empêchent que sa pointe ne puisse frapper la partie antérieure de la voûte palatine par un coup sec, nécessaire à la prononciation de la lettre R. On donne le nom de *grasseyement* à ce défaut de la parole.

Quant au *mutisme*, il peut être *accidentel* ou de *naissance*. Lorsque, par un accident quelconque, comme une plaie d'arme à feu, une tumeur cancéreuse qui a nécessité l'extirpation d'une portion de la langue, cet organe, détruit dans une portion plus ou moins considérable de sa substance, ne peut plus se porter contre les diverses parties des parois de la bouche, et combiner ses mouvemens avec ceux des lèvres, alors les personnes sont *muettes*, c'est-à-dire privées de la parole : elles conservent encore la voix ou la faculté de proférer des sons ; elles peuvent même les articuler, en suppléant, par des moyens mécaniques, aux parties de la langue, des lèvres ou du palais, dont le défaut empêche la prononciation.

Il n'en est pas de même du mutisme de naissance. Souvent toutes les parties de la bouche ne présentent aucun vice de conformation, et néanmoins l'enfant ne peut parvenir à parler : tel est le cas d'un petit garçon de trois ans et demi, que l'on a amené chez moi pour lui faire pratiquer l'opération du filet. Quelquefois cependant la langue est trop adhérente à la paroi inférieure de la bouche, parce que la membrane interne de cette cavité se réfléchit sur la surface supérieure, bien avant d'être arrivée à la ligne médiane de la face inférieure. Dans d'autres cas, les bords de la langue adhèrent aux gencives.

D'autres fois enfin la langue est vraiment pa-

ralytique : tel était le cas du fils de Crésus, dont la merveilleuse histoire est rapportée par Hérodote.

Dans les sourds et muets de naissance, le mutisme a constamment la surdité pour cause ; c'est au moins ce qu'a toujours observé M. Sicard sur le grand nombre d'élèves confiés à ses soins : ce qui lui fait dire que l'absence de la parole mérite chez eux moins le nom de *mutisme* que celui de *silence*. Il est entièrement dû à l'ignorance absolue des sons et de leurs valeurs représentées par les lettres de l'alphabet. Les organes de la voix n'offrent les traces d'aucune lésion visible ; ils sont très-aptes par eux-mêmes à remplir les usages auxquels la nature les a destinés ; mais ils restent dans l'inaction, parce que l'enfant sourd ignore qu'il a en eux un moyen de communiquer ses pensées.

C'est d'après cette théorie ingénieuse que M. Sicard a perfectionné l'alphabet artificiel (1) de Peréire, à l'aide duquel il est parvenu à faire articuler aux sourds et muets un assez grand nombre de voyelles et de consonnes pour proférer des mots et des discours suivis.

Pour apprendre au sourd et muet comment se prononcent les lettres de ce nouvel alphabet, on

---

(1) *Voyez* sa Grammaire à l'usage des sourds et muets, utile à ceux qui entendent et parlent.

lui fait étudier les mouvemens des lèvres (1) et ceux du larynx; et changeant, par une combinaison savante, son corps entier en instrument d'harmonie, on se sert de son bras pour régler les inflexions fortes ou foibles de certains sons, de la même manière qu'on emploie l'action des pédales pour modifier les touches du forte-piano.

Mais c'est principalement par l'organe de la vue que l'instruction arrive aux sourds et muets de naissance : un alphabet manuel, c'est-à-dire dont on exprime les lettres en les dessinant par la position variée des doigts, est le moyen que l'on emploie le plus volontiers pour s'en faire entendre. Par ce procédé *dactyologique*, la transmission des idées s'opère avec une rapidité qui étonne ceux qui, pour la première fois, sont témoins de son exécution.

Pour terminer ce chapitre, il me reste à parler d'un phénomène bien digne, par sa singularité, de l'attention des physiologistes. Il est connu sous le nom d'*engastrimysme*, et l'on appelle *ventriloques* ceux qui le présentent, parce que leur voix, toujours foible et peu sonore, paroît sortir de l'estomac. Il existoit naguère au Palais-Royal, dans

---

(1) On sait que les vieillards devenus sourds par les progrès de l'âge portent beaucoup d'attention aux mouvemens des lèvres, aux diverses expressions de la physionomie, et, par cette observation attentive, devinent en quelque sorte la pensée.

le café de la Grotte, un homme qui pouvoit dialoguer avec une telle vérité, que l'on croyoit assister à la conversation de deux personnes placées à une certaine distance l'une de l'autre, et dont l'accent et la voix auroient été tout-à-fait différens. J'ai observé qu'il n'inspiroit point lorsqu'il parloit du *ventre*, mais que l'air sortoit en moins grande quantité par la bouche et par les narines que dans le parler ordinaire. Chaque fois qu'il exerçoit ce rare talent, il éprouvoit un gonflement dans la région épigastrique; quelquefois même il sentoit des vents rouler plus bas, et ne pouvoit long-temps, sans fatigue, continuer cet exercice.

J'avois d'abord conjecturé que, dans ce sujet, une grande portion de l'air chassé par l'expiration ne sortoit point par la bouche et les fosses nasales, mais qu'avalé et porté dans l'estomac, il alloit se réfléchir dans quelques portions du tube digestif, et donner naissance à un écho véritable; mais ayant depuis observé, avec le plus grand soin, ce curieux phénomène sur M. Fitz-James, qui le présentoit dans sa plus grande perfection, j'ai pu me convaincre que le nom d'*engastrimysme* ne lui convient nullement, puisque tout son mécanisme consiste dans une expiration lente, graduée, filée, en quelque sorte, soit que, pour la ralentir, l'artiste use de l'empire qu'exerce la volonté sur les muscles des parois de la poitrine, soit qu'il tienne l'épiglotte légèrement abaissée au moyen de la base de la langue, dont il n'a

vance guère la pointe au delà des arcades dentaires.

Il fait toujours précéder cette longue expiration par une forte inspiration, au moyen de laquelle il introduit dans ses poumons une grande masse d'air, dont il ménage ensuite la sortie. Aussi l'état de réplétion de l'estomac gênoit-il considérablement le jeu de M. Fitz-James, en empêchant le diaphragme de s'abaisser assez pour que la poitrine se dilate en raison de la quantité d'air que les poumons doivent recevoir.

En accélérant ou en retardant la sortie de cet air, il pouvoit imiter différentes voix, faire croire que les interlocuteurs d'un discours, qu'il tenoit lui seul, étoient placés à différentes distances, et produire une illusion d'autant plus complète que son talent étoit mieux formé. Personne autant que M. Fitz-James ne possédoit l'art de tromper sur ce point les personnes les moins sujettes à se laisser prévenir. Aujourd'hui M. Comte s'en montre le digne successeur.

Il jouissait de la faculté de monter son organe sur cinq à six tons, tous différens, de passer rapidement de l'un à l'autre, comme il le faisoit lorsqu'il représentoit une discussion fort animée, au sein d'une société populaire, d'imiter le son d'une cloche, et de tenir à lui seul une conversation à laquelle on auroit pu croire que prenoient part plusieurs personnes d'âge et de sexe différens. Mais ce qui rend l'illusion plus complète, et distingue spé-

cialement l'art du ventriloque de celui du mime, qui ne sait que contrefaire, consiste dans le pouvoir de moduler tellement la voix, qu'on est trompé sur la distance où se trouve celui qui parle; de telle sorte qu'une voix vient de la rue, l'autre d'un appartement voisin, celle-là d'une personne qui auroit grimpé sur les toits, etc., etc. On devine sans peine quel parti on eût pu tirer d'un semblable talent dans les temps des oracles.

Il existe sur le phénomène que nous venons d'étudier un ouvrage intitulé *le Ventriloque* ou *l'Engastromythe*, par l'abbé de La Chapelle (1). Ce livre est surtout remarquable, en ce qu'il renferme une lettre dans laquelle un homme instruit, qui possédoit ce singulier talent, rend compte lui-même des moyens dont il faisoit usage : « Je « presse, dit M. le baron de Mengen (c'est ainsi « que se nommoit ce ventriloque), je presse for- « tement la langue contre les dents et la joue « gauche, et la voix articulée se forme réellement « entre les dents et la joue gauche. Pour cela, j'ai « la précaution de tenir en réserve, dans le go- « sier, une portion d'air suffisante, soit pour « chanter, soit pour parler à l'ordinaire; et c'est « uniquement avec cette portion d'air en réserve, « modérée, retenue et échappée avec effort, que « je produis la voix que j'ai dessein de faire en-

(1) Deux vol. in-12. Paris, 1772.

« tendre. » Haller paroît avoir adopté cette explication; car, dans sa Bibliothéque anatomique, en parlant du livre qui la contient : « Cet art, dit-il, « exige une grande force dans les muscles de la « gorge pour que l'engastromythe la ferme et « parle, de l'air étant tenu en réserve dans la partie « postérieure (1) » On conçoit que le voile du palais, relevé et tendu par l'action des muscles péristaphylins, joue un grand rôle dans la production des sons que rend le ventriloque, en empêchant la voix de passer par les fosses nasales, et de se renforcer dans leurs anfractuosités.

---

(1) *Robur in musculis faucium hæc ars requirit, quo engastromythus eas claudat et vocem edat, aere reservato in posteriore parte oris.* Bibl. anat., t. II, p. 693.

DEUXIÈME CLASSE.

FONCTIONS DE REPRODUCTION.

CHAPITRE X.

De la Génération.

CXCV. *Différences des sexes.* Les fonctions qui font l'objet de ce chapitre ne sont point nécessaires à la vie de l'individu ; mais sans elles l'espèce humaine périroit bientôt, privée de la faculté de se reproduire; et, comme la perpétuité des espèces vivantes semble être le but principal de la nature, il suit que les phénomènes de reproduction sont pour le moins égaux en importance à ceux qui jusqu'ici ont fait l'objet de notre étude. Bien plus, si, négligeant l'enchaînement et la succession naturelle des fonctions, on les envisageoit sous cet unique point de vue, l'histoire des fonctions de reproduction devroit suivre immédiatement celle des fonctions nutritives. En effet, les phénomènes de relation, les sensations, les mouvemens et la voix existent comme surajoutés; leurs organes manquent aux végétaux et dans une multitude d'espèces d'animaux, qui tous jouissent nécessaire-

ment de la double faculté de se nourrir et de se reproduire. Aussi mon savant collègue, M. le professeur Duméril, dans son cours de physiologie, donné à la Faculté de médecine de Paris, commence par les fonctions nutritives, traite à la suite de la reproduction, et termine par les phénomènes de relation; méthode d'enseignement sans contredit préférable à l'ordre adopté dans certains livres élémentaires, où les fonctions sensoriales et intellectuelles commencent l'histoire de la vie, à l'existence de laquelle elles ne sont point indispensablement liées, et dont, quoique choses très-nécessaires, elles peuvent pour ainsi dire être regardées comme le superflu. C'est à mettre l'individu en état de satisfaire aux besoins résultant des fonctions nutritives et reproductices, que celles de rélation sont principalement destinées chez les êtres pourvus d'appareils sensoriaux, vocaux et locomoteurs (1). Les fonctions conservatrices de l'espèce sont confiées à deux ordres d'organes appartenant aux deux sexes, dont ils constituent la principale, mais non pas l'unique différence.

La femme, en effet, ne diffère pas seulement de l'homme par ses organes génitaux, mais encore par sa taille moins élevée, par la délicatesse de son organisation, par la prédominance du système lymphatique et cellulaire, qui efface les saillies

(1) *Voyez* Prolégomènes, pages 155 - 174.

des muscles, et donne à tous ses membres ces formes arrondies et gracieuses dont la Vénus de Médicis nous offre l'inimitable modèle. Elle s'en distingue encore par une sensibilité plus vive, jointe à une force moindre et à une plus grande mobilité. Son squelette lui-même présente des différences assez tranchées pour qu'on le distingue aisément de celui de l'homme. Les aspérités des os sont bien moins prononcées ; la clavicule est moins courbée, la poitrine moins longue, mais plus évasée ; le sternum plus court, mais plus large ; le bassin plus ample ; les fémurs sont plus obliques, etc. (1). Dans un discours sur le beau physique, prononcé par Camper à l'Académie de dessin d'Amsterdam, ce célèbre physiologiste a fait voir qu'en traçant les figures du corps de la femme et de celui de l'homme, dans deux aires elliptiques, dont la grandeur seroit la même pour tous deux, le bassin de la femme seroit en dehors de l'ellipse, et ses épaules en dedans, tandis que ces dernières parties dépasseroient, dans l'homme, les limites de la figure, et qu'au contraire son bassin y resteroit renfermé.

Les caractères généraux des sexes sont tellement prononcés que l'on distingueroit un mâle en voyant une seule partie de son corps à nu,

---

(1) Comparez les belles planches qu'ont données Albinus et Sœmmering, des squelettes de l'homme et de la femme.

lors même que cette partie ne seroit point couverte de poils, et n'offriroit aucun des principaux attributs de la virilité. Doit-on attribuer cette variété d'organisation et de caractères à l'influence qu'exercent les organes sexuels sur le reste du corps? L'utérus imprime-t-il au sexe toutes ses modifications distinctives, et doit-on dire, avec Vanhelmont: *Propter solum uterum, mulier est id quod est* (C'est par la matrice seule que la femme est ce qu'elle est)? Quoique ce viscère réagisse sur tout le système féminin d'une manière bien évidente, et semble soumettre à son empire la somme presque entière des actions et des affections de la femme, nous pensons qu'il n'est pas, à beaucoup près, la cause unique des caractères qui la spécifient, puisque ces caractères sont déjà reconnaissables dès les premiers temps de la vie, lorsque le système utérin est loin encore d'être en activité. Une observation (1) très-curieuse, consignée par le professeur Caillot dans le second volume des Mémoires de la Société médicale de Paris, prouve mieux que tous les raisonnemens qu'on pourroit accumuler, jusqu'à quel point les caractères du sexe sont indépendans de l'influence de l'utérus. Une femme naît, croît et s'élève avec toutes les

---

(1) On trouve dans les OEuvres de La Métrie, *Système d'Épicure*, § 14, une observation analogue et non moins intéressante.

apparences extérieures de son sexe. Arrivée à l'âge de vingt à vingt-un ans, elle veut obéir au penchant qui l'entraîne : vains désirs ! efforts superflus ! Elle n'avoit rien au delà de la vulve, d'ailleurs bien conformée. Un petit canal, dont l'orifice n'offroit que deux lignes à deux lignes et demie de diamètre, tenoit la place du vagin, et se terminoit en cul-de-sac, à un pouce de profondeur. Les perquisitions les plus exactes, faites en introduisant une algalie dans la vessie urinaire, et le doigt indicateur dans le rectum, ne purent faire rencontrer l'utérus. Le doigt, introduit dans l'intestin, sentoit distinctement la convexité de la sonde placée dans la vessie, de manière qu'il étoit évident qu'aucun organe analogue à l'utérus ne séparoit le bas-fond de ce viscère de la paroi antérieure du rectum. La jeune personne n'avoit jamais été sujette à l'évacuation périodique, qui accompagne ou précède l'époque de la puberté, Aucune hémorragie ne suppléoit à cette excrétion ; elle n'éprouvoit aucune des indispositions qu'occasione la non-apparition des règles ; elle jouissoit au contraire d'une santé florissante : rien ne lui manquoit des autres caractères de son sexe ; seulement son sein étoit peu développé. Parvenue à l'âge de vingt-six à vingt-sept ans, elle est devenue sujette à des pissemens de sang assez fréquens. Cette hématurie, dont les attaques sont irrégulières, ne peut-elle point être regardée comme un moyen par lequel la nature supplée à l'éva-

cuation menstruelle ? La vessie rempliroit dans ce cas les fonctions de la matrice, et ses vaisseaux capillaires devroient être extrêmement développés.

La reproduction de l'espèce est, pour la femme, l'objet le plus important de la vie; c'est presque la seule destination à laquelle la nature semble l'avoir appelée, et le seul devoir qu'elle ait à remplir dans la société humaine : partout où la terre fertile fournit abondamment à l'homme de quoi pourvoir à ses besoins, il n'appelle pas la femme à son secours pour en arracher sa subsistance, il la décharge du fardeau des obligations sociales. L'Asiatique ne demande aux femmes oisives qu'il rassemble dans son sérail que des plaisirs, et des enfans qui perpétuent sa race; le plaisir et les devoirs de la maternité sont l'unique affaire des Otahitiennes. Chez quelques peuplades sauvages de l'Amérique, le sexe mâle, abusant du droit odieux de la force, tyrannise il est vrai la femme, et, se réservant tous les avantages de la société, lui en fait supporter toutes les charges; mais cette exception ne détruit point la règle générale déduite de l'observation de tous les peuples. Tout ce qui éloigne la femme de cette destination primitive, tout ce qui la détourne de cet objet, est à son désavantage; c'est à ce but que toutes ses actions, toutes ses habitudes se rapportent, comme dans son organisation physique tout y est évidemment relatif. De toutes les passions, l'amour

est chez la femme la passion la plus dominante; on a même été jusqu'à dire l'unique passion. Il est vrai que toutes les autres en prennent quelque chose, en reçoivent une teinte particulière, qui les distingue de ce qu'elles sont chez l'homme (1).

Nous ne pousserons pas plus loin l'examen des différences générales qui caractérisent les deux sexes : personne n'a autant approfondi ce sujet et ne l'a traité d'une manière plus piquante que Roussel, dans l'ouvrage intitulé : *Système physique et moral de la femme.*

CXCVI. *Hermaphrodisme.* L'hermaphrodisme, ou la réunion des deux sexes chez le même individu, est impossible dans l'homme et dans la grande famille des animaux à sang rouge. Les recueils d'observations n'en présentent aucun exemple avéré; et tous les hermaphrodites que l'on a pu voir jusqu'ici n'étoient que des êtres mal conformés, dont les organes mâles, imparfaitement ébauchés, ou l'appareil féminin trop développé, rendoient le sexe équivoque. Aucun ne s'est mon-

---

(1) Fontenelle disoit de la dévotion de certaines femmes: *On voit que l'amour a passé par là.* On a dit, à l'occasion de sainte Thérèse : *Aimer Dieu, c'est encore aimer.* Thomas prétend que, *pour les femmes, un homme est plus qu'une nation. L'amour n'est qu'un épisode dans la vie de l'homme, c'est l'histoire tout entière de la vie de la femme.* (Madame de Stael.)

tré capable d'engendrer à lui seul un être semblable à lui-même : le plus grand nombre étoit inhabile à la reproduction ; l'imperfection ou la vicieuse conformation des organes qui y servent les condamnoient à la stérilité. Tel étoit l'hermaphrodite dont parle Petit de Namur, dans les Mémoires de l'Académie des sciences ; celui dont Maret donne l'histoire dans ceux de l'Académie de Dijon, et tous ceux dont l'observation se trouve dans les Mémoires de la Société médicale, qui, de tous les recueils, est le plus riche en faits de cette espèce.

Mais si, dans l'homme et dans tous les êtres dont l'organisation est la plus analogue à la sienne, l'hermaphrodisme complet n'a jamais existé, on en trouve de nombreux exemples chez les animaux à sang blanc, et surtout parmi les plantes qui occupent la partie la plus inférieure de l'échelle organisée. Les polypes, plusieurs vers, les huîtres et les limaçons sont dans ce cas. Le dernier de ces animaux présente même une variété particulière d'hermaphrodisme, en cela que les organes mâles et femelles se trouvant réunis sur le même individu, il n'est cependant pas susceptible d'une génération solitaire, mais a besoin de s'accoupler avec un autre individu également hermaphrodite, afin de s'exciter par les frottemens et divers autres moyens d'irritation à l'acte qui doit le reproduire.

L'immense tribu des plantes monoïques pré-

sente les organes mâles et femelles rassemblés sur la même tige, et le plus souvent sur la même fleur. Les étamines nombreuses environnent un ou plusieurs pistils, répandent sur le stigmate leur poussière fécondante (*pollen*), qui, portée par le canal du style jusqu'à l'ovaire, va féconder les graines à l'aide desquelles les espèces se perpétuent. Quelquefois la même espèce végétale contenant des individus mâles et des individus femelles, les sexes peuvent être séparés par de grandes distances : alors la poussière séminale est portée, du mâle à la femelle, sur l'aile des zéphirs; tels sont les palmiers, sur lesquels Gleditsch a fait ses premières observations touchant la génération des plantes, le chanvre, l'épinard, la mercuriale, etc.

CXCVII. L'homme présente cela de particulier qu'il n'est point assujetti à l'influence des saisons dans l'exercice de ses fonctions génitales. Les animaux au contraire se rassemblent à des époques fixes, s'accouplent dans certains temps de l'année, et paroissent ensuite oublier les plaisirs de l'amour pour satisfaire à d'autres besoins. Ainsi les loups et les renards se réunissent au milieu de l'hiver, les cerfs en automne, le plus grand nombre des oiseaux au printemps, etc. L'homme seul s'approche dans tous les temps de sa compagne, et la féconde sous toutes les latitudes et dans toutes les températures. Cette prérogative tient moins peut-être à sa nature particulière qu'au parti qu'il tire de son industrie. Garanti par les abris qu'il a su

se construire contre les rigueurs des saisons et les variations de l'atmosphère, pouvant toujours satisfaire à ses besoins physiques, à l'aide des provisions que sa prévoyance tient accumulées, il peut également se livrer en tout temps aux jouissances de l'amour. Les animaux domestiques, que nous avons soustraits en partie aux influence extérieures, produisent presque indifféremment dans toutes les saisons. Pour prouver mieux encore que c'est en neutralisant, par les ressources de son industrie, la puissance de la nature, que l'homme est parvenu à ne point obéir à l'influence des saisons dans l'acte reproducteur de son espèce, on peut dire que cette influence de la température est d'autant plus prononcée que les animaux s'éloignent davantage de l'homme ; qu'ainsi le frai des poissons et des grenouilles se trouve accéléré ou retardé suivant que la saison est plus ou moins précoce ou tardive, et qu'un grand nombre d'insectes a besoin, pour naître ou pour produire, des chaleurs dont l'absence les empêche d'exister.

CXCVIII. *Organes de la génération de l'homme.* Aristote, Galien, et leurs verbeux commentateurs ont exprimé l'analogie qui existe entre les parties génitales de l'un et de l'autre sexe, en disant qu'elles ne différoient que par leur position, extérieure chez l'homme, et intérieure dans la femme. On trouve en effet une ressemblance assez exacte entre les ovaires et les testicules, les trompes de

Fallope et les conduits déférens, la matrice et les vésicules séminales, le vagin, les parties extérieures de la génération de la femme, et le membre viril; les premiers sécrètent la liqueur séminale, et fournissent, soit dans l'homme, soit dans la femme, une matière essentielle à la génération (*ovaires* et *testicules*). Les trompes de Fallope, comme les canaux déférens, portent cette matière dans les réservoirs où elle doit séjourner (*utérus* et *vésicules*). Ces poches contractiles, qui servent de réservoir à la semence ou à son produit, s'en débarrassent quand ils y ont fait un assez long séjour; enfin le vagin et la verge servent à cette élimination. Quelque heureux que paroissent de tels rapprochemens, on sera loin d'en conclure une similitude parfaite entre les appareils génitaux des deux sexes. Chacun d'eux remplit dans l'acte reproducteur des fonctions parfaitement distinctes, quoique réciproquement nécessaires (1).

CXCIX. La liqueur prolifique est préparée par les testicules, organes pairs, recouverts de plusieurs enveloppes, dont l'une, formée par la peau, et connue sous le nom de *scrotum*, représente une poche commune à toutes deux, se resserre par le froid, se relâche par la chaleur, et jouit d'une contractilité plus évidente que les autres

(1) « *Ut virilia ad dandum, sic muliebria ad recipiendum à natura apta sunt*, etc. » Ch. Crève.

parties du tissu cutané. Le *dartos* forme une seconde enveloppe celluleuse propre à chaque testicule. La *tunique vaginale*, membrane séreuse, les recouvre immédiatement, et, se réfléchissant à leur surface, se comporte à leur égard comme le péritoine par rapport aux viscères abdominaux, c'est-à-dire ne les contient point dans sa propre cavité. Enfin les testicules sont revêtus d'une membrane fibreuse, blanche, épaisse et très-consistante, qui fait partie de leur substance; c'est la tunique *albuginée*, de l'intérieur de laquelle partent en grand nombre des lames membraneuses, qui, se croisant dans sa cavité, forment un certain nombre de cellules remplies par une substance vasculaire jaunâtre. Cette matière filamenteuse, renfermée dans la coque albuginée, a si peu de consistance qu'elle se dissoudroit bientôt si le testicule étoit privé de son enveloppe extérieure. Elle est formée par les tuyaux *séminifères*, petits tubes vraiment capillaires, singulièrement repliés, entortillés sur eux-mêmes, naissant probablement des extrémités des artères spermatiques, se dirigeant tous vers le bord supérieur de l'ovule que les testicules représentent, se réunissant dans cet endroit, et formant dix à douze tuyaux, qui, rassemblés, constituent un cordon placé dans l'épaisseur de la tunique albuginée, et que l'on nomme *corps d'Hygmore*. Les dix à douze conduits qui, réunis en faisceau, forment ce cordon, percent la membrane dans le tissu de la-

quelle ils étoient contenus, se réunissent en un seul canal, qui se contourne sur lui-même, et forme une éminence appelée tête de l'*épididyme*. Ce canal, résultant de la réunion des conduits du corps d'Hygmore, d'abord contourné sur lui-même, devient de moins en moins flexueux à mesure qu'il s'approche de l'extrémité inférieure du testicule; là, il se recourbe sur lui-même, et remonte, sous le nom de *canal déférent*, le long du cordon des vaisseaux spermatiques jusqu'à l'anneau inguinal, par lequel il entre dans la cavité abdominale. Les conduits déférens, quoique d'une grosseur égale à celle d'un tuyau de plume, ont néanmoins une cavité très-étroite; et il est difficile de dire pourquoi un conduit capillaire a des parois aussi épaisses, et d'une dureté presque cartilagineuse.

La semence préparée par les testicules est séparée du sang que leur apportent les artères spermatiques, longues, grêles, très-flexueuses, et naissant de l'aorte sous un angle très-aigu. Ce liquide se filtre à travers les conduits séminifères, passe dans ceux du corps d'Hygmore, et par suite dans les canaux déférens, qui, entrés dans l'abdomen, viennent se terminer dans les vésicules séminales, et y déposer le liquide spermatique. La délicatesse de l'organisation du testicule, la ténuité des filières que parcourt la semence, expliquent la facilité de ses engorgemens et la difficulté de les résoudre.

La liqueur spermatique passe des conduits déférens dans les vésicules, malgré l'angle rétrograde sous lequel ils s'y rendent. Il en est, à cet égard, des poches destinées à servir de réservoirs à la semence comme de la vésicule du fiel. Malgré l'angle défavorable sous lequel les conduits se rencontrent avec les cols des vésicules, ce fluide passe de ceux-ci dans celles-là; la bile, parce que le canal cholédoque est singulièrement rétréci dans son extrémité duodénale; le sperme, parce que le conduit éjaculateur traversant la prostate et s'ouvrant dans l'urètre par un orifice très-étroit, ce liquide reflue plus aisément dans la vésicule séminale qu'il ne passe du conduit déférent dans l'éjaculateur.

Les *vésicules séminales* forment deux poches membraneuses de capacité différente dans les divers individus, plus grandes dans la jeunesse et chez les adultes que dans l'enfance et chez les vieillards. Elles diffèrent notablement de la vésicule du fiel en ce qu'elles sont formées par les canaux déférens élargis, amincis et contournés sur eux-mêmes à la manière des intestins, de telle sorte qu'on peut, avec de l'adresse et de la patience, les déployer en un long canal flexueux. C'est à raison de cette structure que leur intérieur semble partagé en plusieurs cellulosités ou alvéoles; une membrane muqueuse les tapisse et sécrète en quantité considérable une humeur glaireuse qui se mêle au sperme, en forme la plus grande partie et lui sert de véhicule. La position des vésicules séminales entre le rectum,

les releveurs de l'anus et le bas-fond de la vessie, fait que leur excrétion, principalement due à l'action tonique de leurs parois, peut encore être favorisée par la douce compression qu'exercent sur elles les releveurs de l'anus, convulsés au moment de l'éjaculation. Les animaux privés de ce réservoir séminal, les chiens, par exemple, restent plus long-temps accouplés, la liqueur prolifique nécessaire à la fécondation devant être préparée pendant le temps de la copulation, et ne pouvant couler que goutte à goutte.

Les *conduits éjaculateurs* qui résultent de la réunion des vésicules avec les canaux déférens traversent la *prostate* et s'ouvrent séparément dans l'urètre, au fond d'une lacune appelée *verumontanum*. Le corps glanduleux dans lequel ils sont renfermés, et qui soutient également le col de la vessie et le commencement de l'urètre, n'existe pas chez la femme. Dix à douze conduits portent, dans l'urètre, le liquide muqueux et blanchâtre que la prostate sécrète. Cette liqueur prostatique se mêle à la semence, augmente sa quantité; peut-être même éjaculée la première, elle lubrifie l'intérieur du canal, et prépare la voie au fluide séminal, en rendant la surface intérieure de l'urètre plus glissante.

L'urètre a non-seulement pour usage de porter la semence au dehors, il sert en même temps de conduit excréteur aux urines, et fait partie de la verge. Celle-ci, chargée de porter la liqueur pro-

lifique dans les parties génitales de la femme, doit être en érection pour remplir convenablement cet usage. L'érection devant être considérée comme un phénomène de structure, nous n'exposerons celle de la verge qu'après avoir décrit les parties génitales de la femme.

CC. *Organes de la génération dans la femme.* Nous n'adopterons point l'ordre anatomique généralement suivi dans cette description; mais, rangeant sous une triple division les diverses parties qui, dans la femme, servent aux fonctions génitales, nous parlerons d'abord des ovaires et des trompes de Falloppe, puis de la matrice, et en dernier lieu du vagin et des parties extérieures.

L'*ovaire*, placé dans le bassin de la femme, tenant à la matrice par un ligament, reçoit les vaisseaux et les nerfs qui, dans l'homme, vont se rendre au testicule; il a la même forme que ce dernier organe, quoiqu'il soit en général un peu moins volumineux. L'ovaire sécrète-t-il une liqueur dont le mélange avec la semence du mâle produit le nouvel être? ou bien s'en détache-t-il, au moment de la conception, un œuf que le sperme vivifie? Quelque parti que l'on prenne dans cette discussion, on sera forcé de convenir que l'ovaire prépare une matière essentielle à la génération, puisque son ablation rend les femelles infécondes.

C'est sûrement aussi par les conduits membraneux, appelés *trompes de Fallope*, que cette ma-

tière, quelle qu'elle soit, fournie par les ovaires, passe dans la matrice, à laquelle ces trompes aboutissent par une de leurs extrémités, tandis que l'autre, large, évasée, frangée dans son contour, flotte dans la cavité du bassin, soutenue par une petite duplicature du péritoine, mais se redresse sur elle-même, s'applique à l'ovaire pendant le temps du coït, et établit alors un canal non interrompu entre cet organe et l'intérieur de la matrice. On a trouvé l'orifice externe de la trompe de Fallope, ou le *morceau frangé*, embrassant ainsi l'ovaire dans certaines femelles ouvertes immédiatement après la copulation. Il peut arriver que, par un vice organique, la trompe de Fallope ne puisse se porter sur l'ovaire. En disséquant le cadavre d'une femme stérile, je trouvai les morceaux frangés ou les extrémités évasées des trompes, adhérens aux parties latérales du détroit supérieur du bassin, de telle manière qu'il étoit impossible qu'elles pussent exécuter les mouvemens nécessaires à la fécondation.

La *matrice*, placée dans le bassin entre le rectum et la vessie, est un viscère creux dans lequel le produit de la conception s'accroît et se développe jusqu'à l'époque de l'accouchement. On a trouvé sa cavité intérieure partagée en deux cavités, qui tantôt s'ouvroient dans le même vagin, tantôt avoient chacune un vagin séparé; d'autres fois aboutissoient à un vagin qui n'étoit double que dans la partie la plus voisine de l'utérus. Enfin

Valisnieri rapporte l'observation d'une femme qui présentoit deux matrices, dont l'une s'ouvroit, comme de coutume, dans le vagin, tandis que l'autre communiquoit avec le rectum. Quoique la nature musculaire des parois de la matrice se prononce manifestement, à mesure qu'elle se développe pendant la grossesse, on peut dire que ce muscle creux diffère des organes de cette espèce par l'arrangement de ses fibres, qu'il est difficile d'apercevoir quand sa cavité est vide, et impossible de bien démêler, lors même qu'elle est remplie par le fœtus; mais elle s'en distingue surtout par la propriété singulière dont elle jouit de se dilater, de s'étendre en augmentant d'épaisseur, au lieu de devenir plus mince.

Le *vagin* n'a rien de remarquable que la structure molle, rugueuse et dilatable de ses parois. L'extrémité supérieure de ce canal oblique, tournée en arrière et en haut, embrasse le col de la matrice, tandis que l'orifice inférieur est environné par un corps spongieux, dont les cellules se remplissent et se vident de sang, comme celles des corps caverneux du clitoris et de la verge. On le nomme *plexus rétiforme* : son gonflement dans l'érection peut rétrécir l'entrée du vagin; les contractions du muscle *constricteur*, qui, tenant la place des *bulbo caverneux* de l'homme, est couché sur le plexus rétiforme, et environne comme lui l'entrée du vagin, peuvent également rendre l'entrée de ce canal plus étroite.

En outre, cet orifice extérieur est garni, chez les femmes qui n'ont souffert l'approche d'aucun homme, d'un repli membraneux plus ou moins large, ordinairement demi-circulaire, connu sous le nom d'*hymen*. Son existence est donnée, par plusieurs, comme le signe le plus certain de la virginité physique; mais tous les caractères à l'aide desquels on a cru pouvoir s'assurer de cette qualité, que les hommes convoitent avec tant d'ardeur, n'offrent rien que de très-équivoque (1). La laxité des parties baignées par des mucosités abondantes, chez une femme sujette aux flueurs blanches, ou par le sang des règles pendant la menstruation, peut faire que l'hymen ait cédé sans se rompre, et qu'une femme vraiment déflorée paraisse encore vierge, tandis qu'une autre, parfaitement intacte, aura perdu l'hymen dans une maladie, etc. Enfin il est des individus chez lesquels ce repli membraneux est si peu prononcé que plusieurs anatomistes ont été jusqu'à révoquer en doute son existence. Elle est constante néanmoins, mais sa grandeur est infiniment variable. On l'a vu, chez certaines filles, boucher complétement l'orifice du vagin, et, dans ce cas, produire la rétention des menstrues. D'autres fois l'oblitération n'étant pas entière, la fécondation a pu s'opérer à la faveur d'une très-

---

(1) « *Attamen prima venus debet esse cruenta.* »

« Cependant, en général, les premières approches doivent être sanglantes. » (M. DE HALLER.)

petite ouverture et sans introduction ; mais, au moment d'accoucher, la tête de l'enfant fait de vains efforts pour surmonter la résistance que la membrane lui oppose (2). Chez les femelles de certains animaux, celle du cabiais ou cochon d'Inde, par exemple (*cavia cobaya*), l'orifice du vagin reste fermé, et ne s'ouvre que par les efforts de l'accouplement, pour se refermer ensuite jusqu'à l'époque de l'acconchement, après lequel il se ferme de nouveau par le recollement de ses bords; en sorte que les femelles de ces animaux jouissent de l'heureux privilége de conserver les apparences de la virginité, même après de nombreux accouchemens.

Les parties génitales extérieures, faciles à apercevoir sans le secours de la dissection, ne peuvent point être regardées comme de simples agrémens; toutes, ainsi qu'on va le voir, remplissent un but utile. Les replis de la peau, qui forment les grandes et les petites lèvres, se déploient au moment de l'accouchement, et facilitent la dilatation nécessaire à l'expulsion du fœtus. Ces duplicatures non-seulement se dédoublent, mais encore s'étendent dans leur tissu, plus abreuvé, plus mou et plus extensible que celui de la peau. Le mont de Vénus, les poils qui l'ombragent, le clitoris, qui figure une verge imparfaite, semblent n'être que

(1) Baudelocque, Art des accouchemens.

des organes de volupté; mais le plaisir n'entre-t-il pas lui-même comme élément dans l'acte par lequel l'espèce humaine se perpétue?

CCI. *Conception.* Lorsqu'une irritation chimique, mécanique ou mentale, sollicite l'action des organes génitaux, la verge s'allonge, se gonfle et se roidit par l'accumulation du sang dans les cellules des corps caverneux et dans les mailles du tissu spongieux de l'urètre (1). La turgescence de ces deux parties du pénis doit être simultanée pour que l'érection soit parfaite. On a cru pouvoir expliquer ce phénomène par la compression des veines honteuses, qui, dit-on, se trouvent placées entre la symphyse des pubis et la racine de la verge, pressée, tant que l'érection dure, contre ces os, par les muscles qui la relèvent. Mais, bien loin d'élever la verge, les muscles du périnée, et principalement les *ischio-caverneux*, tendent à l'abaisser. Le sang qui gonfle les tissus caverneux de la verge et spongieux de l'urètre et du gland, qui n'est lui-même que l'extrémité épanouie de ce dernier canal, ne stagne point dans leurs cellules, seulement il s'y trouve en plus grande abondance que de coutume, l'irritation augmentant d'une manière remarquable l'action des artères qui l'y versent. L'érection, toujours proportionnée à la

(1) « *Penis adest, ita constructus, ut, stimulo corporeo sive « mentali irritatus, turgeat et obrigescat, seque erigat, posteà « detumescat et collabatur.* » (Crève.)

vivacité du stimulus, cesse lorsque la cause irritante n'agit plus sur la verge, de la même manière qu'une tumeur inflammatoire se dissipe ou se résout quand sa cause déterminante est enlevée (1). Dans cette dilatation voluptueuse, l'urètre se redresse, tiraillé par la verge qui s'allonge; ses courbures s'effacent, l'irritation se propage de l'extérieur à l'intérieur, jusqu'aux vésicules séminales et aux testicules. Ceux-ci se gonflent et sécrètent davantage : doucement agités par l'action tonique du scrotum, qui se ride et les remonte vers l'abdomen, et par les contractions des fibres du crémaster, dont l'épanouissement forme, entre la tunique vaginale et le dartos, ce qu'on a improprement nommé *tunique érythroïde ;* ils se vident avec plus de facilité par les canaux déférens, qui diminuent eux-mêmes de longueur par l'ascension des testicules, et participent aux secousses qui sont imprimées à ces organes.

Les secousses favorables qu'imprime l'action du crémaster, soit aux testicules eux-mêmes, soit aux canaux déférens, contribuent à la sécrétion et à l'excrétion de la semence, d'une manière tellement utile, que ce petit muscle existe dans les animaux

---

(1) La chaleur animale éprouve une augmentation légère dans l'érection comme dans l'état inflammatoire. La température des fleurs de l'*arum*, ou pied de veau, s'élève de plusieurs degrés au-dessus de celle de l'atmosphère, au moment de la fécondation.

chez lesquels le testicule ne sort jamais de l'abdomen, et demeure dans cette cavité, placé sur les côtés de la colonne lombaire, comme Hunter l'a observé sur le hérisson et chez le belier. Ce fait d'anatomie comparée prouve que les usages des crémasters ne sont point bornés à soutenir les testicules, qui leur sont en quelque sorte suspendus comme une marmite à sa crémaillère, ainsi que l'indique le nom sous lequel on les connoît; puisque, chez les animaux dont on vient de parler, ils rentrent dans l'abdomen, et remontent pour aller vers l'organe qu'ils doivent ébranler.

Lorsque l'irritation est portée à un certain degré, elle se fait ressentir dans les vésicules séminales : celles-ci agissent sur le liquide qui remplit leur cavité, et s'en débarrassent par la contraction spasmodique de leurs tuyaux membraneux, aidées dans cette excrétion par les releveurs de l'anus (CXCIX). La prostate et les glandes muqueuses de l'urètre fournissent un enduit visqueux propre à favoriser l'écoulement de la liqueur séminale, dardée par jets plus ou moins rapides.

CCII. Le sperme humain ne sort jamais pur, c'est-à-dire tel qu'il a été préparé par les testicules. On conjecture même que la liqueur muqueuse des vésicules en forme la plus grande partie. C'est ce mucus que les eunuques rendent en quantité assez considérable. La liqueur de la prostate et celle que fournissent les glandes mu-

queuses de l'urètre l'altèrent également par leur mélange.

Reçu dans un vase, il exhale une odeur particulière, analogue à celle que répandent les poussières séminales d'un grand nombre de végétaux, le chaton du châtaignier, par exemple. Il est formé de deux parties, dont l'une est épaisse et grumeleuse, tandis que l'autre est visqueuse, blanche et plus fluide. La proportion de la partie fluide à la portion demi-concrète est d'autant plus grande que l'individu est moins vigoureux, et que l'émission de la semence est plus fréquemment répétée. Bientôt il se liquéfie, en perdant de son poids, toujours supérieur à celui de l'eau commune, dans laquelle il devient dissoluble; tandis qu'auparavant il ne pouvoit s'y dissoudre. Analysé par M. Vauquelin, il a offert : eau, 90 centièmes, mucilage animal, 6; phosphate de chaux, 3; soude, 1. C'est à la présence de cet alkali qu'il doit la propriété de verdir le sirop de violettes. Le mucilage animal n'est point de l'albumine pure; c'est plutôt un mucus gélatineux, duquel paroissent spécialement dépendre les qualités du sperme, telles que son indissolubilité dans l'eau, son odeur et sa liquéfaction spontanée.

Examinée au microscope, la semence offre de petits animalcules, ayant une tête arrondie, une queue effilée, et se mouvant avec célérité. Est-ce à leurs mouvemens que seroit due la liquéfaction des parties gluantes et filamenteuses du sperme?

Ces animalcules microscopiques ne se voient dans le liquide séminal qu'à l'époque de la puberté; et, chez les oiseaux, ils ne se montrent dans le sperme qu'aux époques de l'accouplement. Étudiés de nouveau par MM. Prevost et Dumas, de Genève, les animalcules spermatiques ont paru tellement essentiels à la fécondation que, tués par l'explosion suffisamment répétée d'une bouteille de Leyde, la liqueur spermatique, dont on avoit constaté auparavant la puissance fécondante, en a été complétement privée. Il en a été de même lorsqu'on la dépouilloit des animalcules par cinq filtrations successives. Comme ces animalcules meurent au bout de vingt heures, dans le sperme abandonné à lui-même, ce liquide perd au bout de ce temps sa vertu prolifique. Enfin les animalcules restent vivans et mouvans dans les cornes de la matrice des mammifères, jusqu'à la descente de l'ovule dans cet organe. On ne les trouve point dans la semence des individus atteints de la syphilis, suivant les observations que m'a communiquées M. le docteur Carré. La pratique de la médecine m'a fourni de nombreuses occasions de me convaincre que la stérilité doit être souvent attribuée à l'existence de la maladie vénérienne, lors même qu'elle ne se manifeste par aucun symptôme apparent; et si ce n'étoit la discrétion que mon état m'impose, je rapporterois ici plusieurs exemples de personnes mariées depuis long-temps, et qui n'ont eu postérité qu'à la suite d'un traite-

ment mercuriel des plus complets. La syphilis me paroît surtout être un obstacle puissant à la fécondité, lorsque l'homme et la femme en sont à la fois atteints. Si l'un des deux seulement est malade, la conception a lieu, et il en résulte un produit entaché de quelque vice héréditaire. Je pourrois appuyer cette vérité importante d'un certain nombre d'observations faites avec soin; mais, je le répète, en semblable matière, un devoir rigoureux m'oblige au silence.

On a cru remarquer que les animalcules spermatiques fuyoient la lumière, et on a décrit leurs mœurs, leurs habitudes et jusqu'à leurs maladies. L'imagination a eu beaucoup de part dans tout ce qu'ont cru observer sur ces petits animaux les naturalistes, qui s'en sont servis pour expliquer le mécanisme de la reproduction. Toutes les humeurs animales, les sucs d'un grand nombre de plantes, présentent, en plus ou moins grand nombre, ces animalcules infusoires à l'œil armé du microscope : mais il est vrai de dire que ces animalcules diffèrent essentiellement de ceux contenus dans le sperme, autant du moins que l'on peut en juger par des observations dans lesquelles l'illusion et l'erreur se glissent avec tant de facilité.

Non-seulement les organes de la génération se contractent spasmodiquement pour effectuer l'expulsion de la semence, tout le corps participe à cet état convulsif, et l'instant de l'éjaculation est marqué par des secousses plus ou moins violentes

de toutes les parties ; de façon qu'il semble, dit Bordeu, que, dans cet instant, la nature ait oublié toute autre fonction, et ne soit occupée qu'à rassembler ses forces et à les diriger vers le même organe. A cette convulsion générale, à cet accès comme épileptique, succède un abattement universel ; au sentiment de lassitude physique se joint un fond de tristesse et de mélancolie qui a bien ses douceurs. Cette sensation particulière qui, selon Lucrèce (1), mêle le chagrin au plaisir le plus vif que nous puissions goûter, tient-elle à la fatigue des organes, ou bien, comme l'ont pensé quelques métaphysiciens, à la notion confuse et éloignée que prend l'individu de sa destruction?

Le membre viril n'entre point dans la matrice, quoique la semence y pénètre. Le museau de tanche présente une fente trop peu étendue, et dont les bords épais sont en contact. Il seroit même difficile de concevoir que cette étroite ouverture puisse donner passage au liquide séminal, si l'on ne savoit qu'au moment de la copulation la matrice irritée se roule sur elle-même, et attire à elle, par une véritable aspiration, la semence dont elle est avide. Platon comparoit cet organe à un animal vivant dans un autre animal, maîtrisant toutes les actions de l'économie vivante, brûlant de se re-

(1) Lucrèce, *de Naturâ rerum.*

paître de la liqueur du mâle, et la digérant pour en former un nouvel individu (1).

La grande épaisseur du col de la matrice a fait raisonnablement douter que son orifice pût se dilater assez pour admettre une liqueur aussi épaisse que la semence. Quelques-uns ont donc cru que ce n'étoit point ce liquide lui-même qui pénétroit dans la cavité de l'utérus, mais sa partie la plus subtile, la plus spiritualisée, une vapeur prolifique qu'ils ont appelée *aura seminalis;* mais, outre qu'on a trouvé la semence contenue dans la matrice des femelles d'animaux ouvertes immédiatement après la copulation, Spallanzani, dans ses expériences sur la fécondation des grenouilles, des salamandres et des crapauds, a vu que, pour donner aux œufs de ces reptiles la faculté d'éclore il ne suffisoit pas de les exposer à la vapeur qui s'élève de la liqueur séminale du mâle; qu'il étoit au contraire indispensable que la semence liquide les touchât immédiatement, quelque petite que fût sa quantité.

On a dit que l'utérus, dilaté pour recevoir le sperme, se resserre pour le retenir, et que cette contraction spasmodique de l'utérus, ressentie, au rapport de Galien, par des femmes qui avoient

(1) « De même aux femmes le leur, comme un animal glou-« ton et avide, auquel, si l'on refuse les alimens en sa saison, « il forcène, impatient de délai, etc. » (*Essais de Michel « Montaigne*, liv. III.

conservé assez de sang-froid pour s'observer dans une telle circonstance, étoit le signe le plus certain que l'on pût acquérir sur la fécondité de la copulation. C'est sans doute pour décider cette rétention que l'on est dans la coutume de jeter de l'eau froide sur certaines femelles d'animaux domestiques, qui se prêtent avec trop d'ardeur aux approches du mâle. Le spasme que l'impression du froid occasione dans l'organe cutané se répète sur la matrice, et empêche l'écoulement de la semence qui a été lancée dans sa cavité.

On a également cru observer que les femmes concevoient plus aisément dans les temps qui suivent l'écoulement des règles; époque à laquelle le col de la matrice est moins exactement fermé que de coutume.

La liqueur séminale, lancée dans la cavité de l'utérus, se porte le long des trompes de Fallope jusqu'aux ovaires. Elle ne s'épanche point dans la cavité de l'abdomen, parce que le conduit membraneux saisit l'ovaire qui lui correspond, l'embrasse étroitement, et établit un canal non interrompu de cet organe à la matrice. L'ovaire, arrosé par la semence, irrité par son contact, laisse échapper une liqueur, ou bien un petit œuf, qui coule dans la matrice par la même voie qui a permis à la semence d'arriver jusqu'à lui. Tout ce qui nous reste à dire touchant le mécanisme de la génération, ne peut point être donné comme certain, mais seulement comme vraisemblable, tant la na-

ture s'est plu à multiplier ses voiles dans une opération qui pique si vivement notre curiosité.

Après avoir distingué le vrai du vraisemblable, ce qui est indispensable dans toute science de faits et d'observations, comme l'est la physiologie, nous allons émettre l'hypothèse qui nous paroît la plus probable sur la manière dont les deux sexes concourent à la production du nouvel être.

CCIII. Les fœtus préexistent dans l'ovaire des femelles, non qu'ils s'y trouvent depuis la création du monde, comme c'étoit le sentiment de Bonnet et de tous ceux qui, avec ce naturaliste métaphysicien, ont adopté le système de l'*emboîtement* des germes; mais les œufs qui contiennent ces germes se forment par l'action propre de l'ovaire qui les sécrète; preuve nouvelle que tous les phénomènes offerts par les corps organisés, soit qu'ils aient pour but la conservation des espèces ou celle des individus, s'opèrent par la voie des sécrétions. Cet œuf, produit de l'élaboration du sang qu'apportent les vaisseaux spermatiques aux ovaires, contient les linéamens du nouvel être; mais ce n'en est, en quelque façon, que le dessin ou le cadavre, si l'on peut employer cette expression pour un corps qui n'a jamais vécu. Il est besoin que l'esprit séminal vienne le sortir de cet état d'inactivité, et lui donner d'une manière en quelque sorte électrique l'éveil de la vie. Les œufs pondus par une poule vierge n'éclôront jamais,

quoiqu'ils contiennent les rudimens du petit animal. Les œufs d'une grenouille qu'on a tenue éloignée du mâle pendant tout le temps de son *frai* se putréfient dans le vase d'eau où on les conserve; si le mâle, au contraire, les a arrosés de sa semence au moment de leur sortie, ils ne tarderont pas à se développer. On préviendra leur putréfaction et on les animera en versant sur eux la liqueur spermatique recueillie par les procédés que Spallanzani mettoit en usage dans ses admirables expériences sur les fécondations artificielles.

C'est surtout aux travaux de cet habile observateur que l'on doit ce qui a été dévoilé sur le mystère de la génération, et sur la part qu'a chaque sexe dans cette fonction importante. Il est à peu près prouvé que le mâle n'y coopère qu'en fournissant le principe vivifiant qui doit animer les individus dont la femelle fournit les germes; qu'ainsi il y sert d'une manière moins essentielle. Il n'est pas si difficile qu'on le pense d'expliquer, dans ce système, les ressemblances frappantes qui existent si souvent entre les pères et les fils. L'embryon imperceptible a tout au plus la consistance d'une glu légèrement visqueuse. Un corps si peu consistant doit être très-perméable, et la semence du mâle, appliquée à sa surface, doit lui imprimer de puissantes modifications. Il en est de l'action de cette liqueur sur l'embryon encore tendre, comme de celle d'un cachet gravé sur la cire molle qui conserve son empreinte. L'impres-

sion est d'autant plus profonde, la ressemblance d'autant plus frappante, que le mâle s'est porté à l'acte de la reproduction avec plus de vigueur et d'énergie.

La liqueur séminale du mâle peut non-seulement agir à la surface du germe gélatineux, presque fluide, et modifier son extérieur; mais encore elle le pénètre à raison de son extrême mollesse, et imprime des changemens à ses parties intérieures. De ces changemens le plus notable et le plus important est sans doute celui que le cœur éprouve. Cet organe, d'autant plus fort dans l'embryon que celui-ci est plus voisin de l'époque de la conception, passe de l'état d'inactivité au mouvement, lorsque le sperme du mâle, pénétrant jusqu'à lui, l'influence de la même manière que le fait chez l'adulte la puissance nerveuse, dont cette liqueur peut être regardée comme une émanation (1). Il résulte de tout ce qui précède que l'on peut expliquer non-seulement les ressemblances entre les pères et les fils, mais encore les maladies héréditaires, ou qui se transmettent par voie de génération. Cependant l'intérieur paroît

(1) L'affoiblissement intellectuel et physique qu'occasione toujours l'émission trop répétée du sperme, la vertu prolifique du mâle toujours subordonnée à son état de force et de vigueur, tout porte à croire que le principe fécondant du sperme est analogue à celui qui constitue la puissance nerveuse.

surtout fourni par les femelles, tandis que les parties extérieures sont spécialement influencées par les mâles; car, dans l'accouplement de deux animaux appartenant à deux espèces différentes, le *mulet*, qui provient de cette union, ressemble au mâle par le dehors, et à la femelle par les parties intérieures. Il est difficile d'assigner la raison de l'impossibilité dans laquelle sont les mulets de reproduire des individus semblables à eux. Pourquoi leurs parties sexuelles, si bien développées, sont-elles complétement stériles? quel vice caché neutralise leur action? pourquoi certains mulets, parmi les oiseaux, jouissent-ils du pouvoir de perpétuer leur race, avantage que la nature a également accordé aux plantes hybrides, qui sont de véritables métis parmi les végétaux, tandis qu'elle le refuse le plus souvent aux quadrupèdes?

Après avoir exposé les idées qui nous paroissent les plus vraisemblables touchant le mécanisme de la génération, nous nous garderons bien de grossir cet ouvrage de l'histoire des nombreuses hypothèses imaginées pour expliquer cette opération mystérieuse. Toutefois nous croyons devoir rapporter la plus récente : elle est due à MM. Prevost et Dumas, de Genève, dont tout le monde connoît l'habileté dans les recherches microscopiques. Selon ces expérimentateurs, il faudroit revenir à l'ancien système des animalcules : l'un de ceux que contient le sperme, se logeant dans l'o-

vule fourni par la femme y devient la base du nouvel individu : il en représente le système nerveux ; la femme fournit l'élément cellulo-vasculaire ; en sorte que la vésicule détachée de l'ovaire doit être regardée comme une sorte de gangue celluleuse dans laquelle se forme l'embryon.

Dans cette hypothèse, une très-grande quantité d'animalcules existent à pure perte dans le sperme humain ; mais l'on peut répondre que la nature offre de nombreux exemples de cette prodigalité.

Quoi qu'il en soit, il est vraisemblable que le germe, vivant quoique amorphe dans son origine, passe successivement par toutes les formes et tous les degrés de l'organisation et de la vie ; que d'abord simple matière gélatineuse, à demi-fluide, et soumis au procédé mystérieux de la fécondation, il revet graduellement la forme, la composition et l'apparence d'un ver vésiculaire ; que cette hydatide s'élève par degrés à l'état d'insecte, de crustacé, de poisson, de reptile, c'est-à-dire qu'aux diverses époques de son existence embryonaire et fœtale il en présente l'organisation, et qu'enfin parvenu au dernier terme de composition ou de complication, il s'élève à l'organisation caractéristique de son espèce. Les monstruosités observées à diverses époques de l'existence de l'embryon et du fœtus présentent des preuves nombreuses et irréfragables de ces gradations successives dans sa composition organique.

La fécondation de l'œuf s'opère dans l'ovaire lui-même, auquel la semence est portée, comme il a été dit précédemment. Ébranlé par l'action de la semence et de la trompe de Fallope, l'œuf se détache de l'organe qui le produit, et descend dans la matrice par les contractions péristaltiques de la trompe de Fallope. Ce canal est susceptible d'un mouvement rétrograde. On en concevra la possibilité, si l'on fait attention que, s'étant allongé par une véritable érection, pour conduire la semence jusqu'à l'ovaire, il doit, en revenant sur lui-même, faire couler le liquide dans sa cavité, suivant un sens parfaitement inverse. Ce mouvement rétrograde, comme Nisbet l'observe, est favorisé par l'espèce de *collapsus* qui succède à l'excitation que le coït occasione; car les expériences de Darwin prouvent que la faiblesse des vaisseaux est la cause de ce mode d'action dans leurs parois. Spongieuse comme l'urètre de l'homme, la trompe de Fallope ramène donc l'œuf de l'ovaire à la matrice. Les grossesses extra-utérines fournissent la preuve que les choses se passent comme on vient de le dire. Si l'on a trouvé des fœtus développés dans l'ovaire, dans la trompe de Fallope, ou même dans la cavité de l'abdomen, lorsque l'œuf détaché échappe à l'action préhensive du pavillon de ce canal (1), on sera bien forcé d'admettre qu'il

(1) Dans les conceptions extra-utérines abdominales, l'œuf, que la trompe n'a pu retenir ou saisir, roule dans le bas-

parcourt le trajet qu'on a décrit. C'est au huitième jour que dans la chienne MM. Prevost et Dumas ont vu se faire le passage de l'ovule dans l'utérus. Comme dans ces animaux ils sont multiples, chaque ovule passe successivement, en sorte que

---

ventre, et va contracter des adhérences avec un point quelconque du péritoine. On le voit s'attacher au mésentère, au colon, au rectum, à l'extérieur de la matrice, y croître et s'y développer, au moyen de la communication vasculaire qui s'établit dans le lieu de l'adhérence; mais les vaisseaux du péritoine ne suffisent point à l'entier développement du fœtus, qui meurt, faute de nourriture, dans les premiers mois de la grossesse. L'adhérence de l'ovule au péritoine s'explique aisément par l'irritation qu'il occasione; il peut être considéré comme un corps étranger dont la présence détermine l'inflammation de la membrane avec laquelle il est en contact, et qui s'unit à elle parce qu'il fournit, dans cet acte, son contingent de vitalité, sa part d'action nécessaire. C'est véritablement une union entre deux parties vivantes, assez analogue à celle qui s'opère entre les lèvres saignantes d'une plaie, entre la plèvre pulmonaire et la plèvre costale, etc.

Mais comme les membranes séreuses contiennent dans leur tissu des capillaires si déliés, que dans l'état naturel le sang n'y manifeste point sa couleur, leurs vaisseaux ne se développent jamais assez pour transmettre à l'œuf qui s'y est uni une assez grande quantité de ce fluide. Les membranes muqueuses, recevant plus de sang, sont en état de fournir davantage; mais jamais le placenta n'y prend attache dans les conceptions extra-utérines. La membrane qui tapisse l'intérieur de la trompe appartient en effet autant aux membranes séreuses qu'aux muqueuses; elle établit, comme on sait, le seul point de communication qui existe entre les unes et les autres.

tous ne sont descendus dans la matrice qu'au bout de trois ou quatre jours. Ils y sont d'abord libres et flottans, vésiculaires, offrant sur le côté une cicatricule ou tache blanchâtre; mais bientôt ils grossissent, et dès le douzième jour on peut y reconnoître le fœtus.

Le travail qui se fait dans les ovaires, travail apparent dans l'heure qui suit l'accouplement de la brebis (Haller), n'apparoît dans la chienne que le deuxième jour après la fécondation. Plusieurs vésicules augmentent de dimensions, puis se rompent et laissent échapper un ovule souvent inaperçu, car il n'a qu'un demi-millimètre de diamètre; mais avec le secours du microscope MM. Prevost et Dumas l'ont parfaitement distingué, aussi bien que la fente sanglante par laquelle il s'est échappé de la vésicule vide et déchirée.

Les ovaires, comme les testicules, se gonflent et prennent de l'accroissement à l'époque de la puberté. Ils se rapetissent, diminuent de volume, et se flétrissent en quelque sorte lorsque la femme n'est plus apte à concevoir. Examiné peu de jours après la conception, l'un des ovaires, plus gros que l'autre, présente une petite vésicule jaunâtre, qui se dessèche pendant le temps de la grossesse, de manière que, vers sa fin, il n'existe plus dans le lieu qu'elle occupoit qu'une très-petite cicatrice. Cette vésicule est l'enveloppe la plus extérieure du petit œuf dans lequel le germe est renfermé, et qui s'est déchirée pour permettre son écoule-

ment. Les observations de Haller prouvent que le corps jaune est formé par les débris d'une vésicule qui s'est rompue au moment de la conception, et a laissé échapper la liqueur qu'elle contenoit. Dans une brebis ouverte quelques minutes après l'accouplement, on voit sur l'un des ovaires une vésicule plus grande que les autres ; déchirée par une petite plaie dont les lèvres sont sanglantes. L'inflammation s'établit dans les parois déchirées de la petite poche ; les bourgeons charnus s'en élèvent, puis s'affaissent, et une cicatricule indique l'endroit qu'elle occupoit. Le nombre de ces cicatrices est proportionné à celui des fœtus. On ignore combien de temps le germe détaché de l'ovaire emploie pour parcourir la trompe de Fallope, et arriver dans la cavité de la matrice. Valisnieri et Haller n'ont jamais pu l'apercevoir distinctement qu'au dix-septième jour, dans ce dernier viscère.

Il paroîtroit, d'après les observations d'Haigton et de Home, en Angleterre, que la formation de l'ovule a lieu dans l'ovaire en vertu d'un travail propre à cet organe, et indépendamment de l'influence du sperme ; que chez les femelles des animaux, au temps du rut, et chez la femme, à des époques indéterminées, des vésicules se forment préparées à l'avance pour les fécondations à venir, et prêtes à laisser échapper l'ovule qu'elles renferment, selon qu'elles sont plus ou moins avancées vers une sorte de maturité. Haigton ayant, à

l'exemple de Nuk, lié et coupé l'une des trompes pour empêcher la fécondation, n'en a pas moins trouvé des vésicules ou corps jaunes, il est vrai sans déchirure, sur l'ovaire isolé par la ligature.

L'obstruction des trompes peut, aussi bien que le défaut ou l'altération morbifique des ovaires, occasioner la stérilité. Morgagni parle, à ce sujet, de quelques courtisanes chez lesquelles les trompes étoient entièrement oblitérées par l'épaississement de leurs parois; suite évidente de l'orgasme habituel dans lequel elles avoient été entretenues par des excitations trop fréquentes. La structure de ces parois doit rendre les obstructions des trompes de Fallope très-faciles. Leur tissu est spongieux, vasculaire, et paroît susceptible d'érection, comme les corps caverneux de la verge et du clitoris. Leur tunique interne (point d'union entre la membrane séreuse qui tapisse l'abdomen, et la muqueuse qui se trouve à l'intérieur de la matrice) participe aux inflammations de l'une et de l'autre. J'ai été plusieurs fois consulté par de jeunes femmes sur la cause de la stérilité dont elles étoient affligées. En recherchant avec soin ce qui pouvoit y donner lieu, j'ai toujours appris qu'elles avoient essuyé, à différentes époques, des inflammations du bas-ventre. Une jeune personne, après la cessation opiniâtre des règles, offrit tous les symptômes de l'inflammation du péritoine; mariée un an environ après cette époque, elle ne put se réjouir d'une grossesse ardemment souhaitée. Une femme avoit

échappé aux accidens de la fièvre puerpérale, survenue à la suite d'un premier accouchement qui fut très-laborieux. Depuis lors, malgré les apparences de la santé la plus robuste, elle n'a pu venir mère.

Les deux testicules et les deux ovaires renferment-ils les germes séparés des mâles et des femelles? Celles-ci, comme on l'a prétendu, sont-elles contenues dans l'ovaire gauche, tandis que les mâles existent dans l'ovaire droit? Et peut-on procréer les sexes à volonté, en variant la posture dans laquelle se fait l'accouplement? Cette vieille opinion, naguère renouvelée, outre qu'elle ne porte sur aucun fondement, est encore démentie formellement par les faits; rien de plus commun que de voir les hommes qui ont accidentellement perdu l'un des deux testicules procréer indifféremment les deux sexes. Des femmes dont un ovaire manquoit, ou chez lesquelles la trompe étoit oblitérée d'un seul côté, ont produit, tantôt des garçons, et d'autre fois des filles. Le docteur Jadelot a présenté à la Société de l'École de Médecine de Paris une matrice qui manquoit de la trompe et de l'ovaire droits; rien n'indiquoit que ces parties eussent jamais existé. Des renseignemens pris sur la femme dont le cadavre avoit fourni cette pièce anatomique, il résultoit qu'elle étoit accouchée d'un garçon et de deux filles; Haller cite des cas analogues. La cause qui décide la formation des sexes échappe donc complétement à nos recher-

ches. Celui des deux individus qui se porte à l'acte de la reproduction avec le plus de chaleur imprimeroit-il son sexe au produit qui doit en naître? Je l'ignore; toutefois j'ai cru observer que, du mariage des personnes peu avancées en âge, et brûlant toutes deux des feux de l'amour et de la jeunesse, naissent le plus souvent des filles, tandis que les mâles résultent plus ordinairement de l'union d'un homme d'un âge mur, ou même d'un vieillard avec une femme plus jeune. L'opinion populaire, que les filles ressemblent généralement au père, tandis que les enfans mâles offrent le plus souvent les traits de leur mère, porte sur un trop grand nombre de faits pour qu'il soit possible de la regarder comme tout-à-fait fausse. Est-ce la raison pour laquelle tant d'hommes illustres par leur génie et par de nombreux succès dans les sciences et dans les lettres, ont transmis leur nom à des fils incapables d'en soutenir l'éclat?

CCIV. *Système sur la génération.* L'ancien système du mélange des semences dans la cavité de la matrice exposé dans les écrits d'Hippocrate et de Galien, est encore celui de plusieurs physiologistes. Dans ce système, les liqueurs mêlées peuvent être regardées comme un extrait de toutes les parties du corps, soit mâle, soit femelle. Une faculté génératrice les dispose convenablement pour la formation du nouvel individu. Mais la femme n'excrète point, au moment de la copulation, une semence véritable. L'humidité qui

mouille et quelquefois baigne la vulve consiste en de simples mucosités mêlées à l'humeur que sécrètent ces deux petits corps glanduleux, voisins de l'orifice du vagin, que connoissoit Thomas Bartholin qui leur donna le nom de prostates de la femme, et dont M. Amussat vient d'injecter récemment les réservoirs vésiculaires.

M. de Buffon a particularisé davantage les faits que cette hypothèse suppose, et l'a rendue moins vraisemblable. Selon cet éloquent naturaliste, chaque partie fournit des molécules qu'il appelle organiques, et ces molécules, provenues des yeux, des oreilles, etc., de l'homme et de la femme, s'arrangent autour d'un moule intérieur dont il admet l'existence, lequel moule forme la base de l'édifice, et provient probablement du mâle, si c'est un garçon, et de la femelle, si c'est une fille. La raison répugne à admettre une théorie dans laquelle on n'explique point la formation du placenta et des enveloppes du fœtus; elle se trouve d'ailleurs formellement contredite par la bonne conformation des enfans nés de parens qui, manquant de plusieurs organes et de plusieurs membres, ne peuvent fournir aucune molécule pour former les parties qui les représentent. La force de formation, qui, selon Blumembach (1), préside à la génération, ne diffère pas

(1) Institut. physiol., § 49; et Comment. societ. sc. Gotting., t. 8.

essentiellement, quoi qu'en dise cet auteur, des forces plastiques imaginées par les anciens; c'est un mot et non point une idée. La production de l'homme et des animaux s'opère-t-elle par cristallisation? du mélange des semences résulte-t-il un cristal en étoile, dont deux branches correspondent aux pédoncules du cerveau, deux aux pédoncules du cervelet, tandis que de la cinquième branche prolongée naîtra la moelle de l'épine, et que le nœud médullaire central se prononcera dans le milieu de la figure, à l'endroit où ses cinq branches se réunissent!!!

Le système des ovaristes, qui jouit aujourd'hui de la plus grande faveur, compte parmi ses partisans, Harvey, Stenon, Malpighi, Valisnièri, Duhamel, Nuk, Littre, Swammerdam, Haller, Spallanzani, Bonnet, etc. Ceux-là n'admettent la distinction des animaux en ovipares et en vivipares qu'en ce sens seulement que les derniers éclosent au dedans, et déchirent leur enveloppe avant de paroître à la lumière. Enfin Leuvenhoëk, Hartsoëker, Boërhaave, Mery, Werheyen, Cowper, etc., ont ajouté à l'opinion des ovaristes, que la semence du mâle contient une multitude d'animalcules spermatiques, tous capables de devenir, en se développant, des êtres semblables à celui qui les fournit. Ces animalcules se dirigent ensemble, par les trompes, sur les ovaires, et là ils se livrent un combat à outrance, dans lequel tous perdent la vie, à l'exception d'un seul qui,

maître du champ de bataille, se niche dans l'œuf destiné à le recevoir. Ce dernier système, très-peu vraisemblable, donne aux hommes la plus grande part dans la génération, puisque, selon ces auteurs, la femelle ne fournit que l'enveloppe du fœtus. On a pu voir, par ce que nous avons dit précédemment que MM. Prevost et Dumas, de Genève, viennent de rajeunir et de reproduire l'hypothèse des animalcules, qui, s'il faut les en croire, existent exclusivement dans le sperme, et seulement aux époques où l'homme et les animaux jouissent de la vertu fécondante. La seule différence qui existe maintenant dans l'opinion hypothétique des physiologistes, consiste en ceci, que selon les uns l'ovule renferme le rudiment du nouvel individu, auquel, selon eux, le sperme communique la puissance vitale; tandis que, suivant les autres, l'ovule est seulement destiné à recevoir ce germe émané du mâle, et provenant exclusivement de lui.

Il seroit superflu d'exposer avec plus d'étendue les opinions émises sur un sujet aussi obscur; ce que nous en avons dit est suffisant pour prouver que les choses qui se refusent le plus obstinément à notre curiosité, et qui donnent le plus de prise à l'imagination, sont celles que l'on croit le mieux connoître, et dont on parle avec le plus de confiance et de prolixité : tant il est vrai, comme le remarque Condillac, qu'on n'a jamais tant de choses à dire que lorsqu'on part de faux principes.

CCV. *Grossesse.* Du moment qu'elle a conçu, la femme éprouve, dans le mouvement de ses solides, et dans la composition de ses humeurs, une altération profonde. Le changement qui s'est opéré en elle se fait apercevoir dans toutes ses fonctions; elle exhale une odeur particulière; les enfans qu'elle allaite refusent la mamelle, ou ne la prennent qu'avec répugnance, et dépérissent bientôt, si on les laisse entre les mains d'une telle nourrice.

La nature, attentive à son travail, semble tout oublier pour le conduire à la perfection. On a observé que dans les lieux où sévit la peste, où règnent d'autres maladies contagieuses, les femmes enceintes y sont le moins exposées; mais qu'aussi, lorsqu'elles sont atteintes d'affections qui, dans d'autres personnes et dans d'autres temps seroient sans danger, elles y succombent, parce que ces maladies, d'abord très-légères, revêtent aisément le caractère de malignité. La marche des maladies mortelles est retardée; et telle femme phthisique, qui n'avoit plus que quelques mois à vivre, prolonge sa carrière de toute la durée de sa gestation. La consolidation des fractures ne se fait pas plus long-temps attendre, quoique Fabrice de Hilden ait prétendu que l'état de grossesse l'empêchoit totalement.

Je n'ai jamais pu apercevoir de différence sensible dans la durée de la formation du cal, comparé chez les femmes enceintes et chez celles qui

ne le sont pas. Parmi les auteurs qui ont avancé que les fractures ne pouvoient se consolider durant la grossesse, les uns ont dit que cela dépend de ce que la nature, occupée à diriger les humeurs vers la matrice, oublie en quelque sorte toute autre fonction, et néglige d'établir l'appareil morbifique nécessaire à la guérison. Mais, comme nous le verrons, quelle que soit l'importance de la matrice, chargée du produit de la conception pendant la grossesse, le fœtus n'est qu'un organe ajouté aux organes de la mère, et s'assimilant ce qui lui convient des sucs qu'apportent les vaisseaux utérins. Il n'empêche point les autres parties de prendre de la nourriture; toutes continuent de vivre et de s'approprier les sucs nécessaires à leur existence. Haller attribue la difficulté avec laquelle les fragmens se réunissent chez les personnes enceintes, à la quantité considérable de matière terreuse dont le fœtus dépouille la mère. Cette opinion ne peut être admise; car, comme nous l'avons vu dans les Prolégomènes, le phosphate calcaire ne paroît jouer qu'un rôle peu important dans le travail de la réunion, principalement due aux changemens qu'éprouve la partie de l'os véritablement organisée. D'ailleurs, il devroit arriver, dans cette hypothèse, que la consolidation seroit également difficile chez les nourrices dont le lait entraîne une grande quantité de phosphate de chaux. Cependant on n'a point observé que la formation du cal fût plus difficile pendant la lac-

tation. Enfin ici, comme en toute chose, l'expérience vaut mieux que le raisonnement : or, elle prouve que le temps pendant lequel s'accomplit la formation du cal, chez les femmes enceintes, n'est pas sensiblement plus long que lorsque l'état de grossesse n'existe pas.

Cependant la matrice, pénétrée par la liqueur prolifique, se gonfle, pour me servir de l'expression de Harvey, comme une lèvre qu'auroit piquée une abeille : elle devient un centre de fluxion vers lequel les humeurs se portent de tous côtés. Le diamètre de ses vaisseaux augmente avec l'épaisseur de ses parois : celles-ci se ramollissent; leur nature musculaire se prononce. Les mêmes changemens arriveroient-ils à chaque époque de la menstruation, si l'écoulement du sang des règles n'empêchoit la métamorphose? Telle est l'opinion de M. Lobstein. Suivant ce physiologiste, l'utérus, dans l'état de grossesse, est analogue à un organe frappé de phlegmasie chronique. Jusqu'à la fin du troisième mois, on ne s'est aperçu de la grossesse que par la cessation du flux menstruel : la matrice, dont le col n'a encore éprouvé aucun changement, est concentrée derrière les pubis; mais bientôt elle s'élève au-dessus du détroit supérieur du bassin, repoussant en haut le paquet intestinal et les autres viscères de l'abdomen. Vers la fin de la grossesse, elle dépasse l'ombilic : son fond touche à l'arc de colon, quelquefois même s'étend dans l'épigastre. La compression qu'elle exerce sur

les organes de la digestion explique les dégoûts, les nausées que la femme éprouve. Le dérangement de la sensibilité, par l'affection des grands sympathiques, rend également raison de ces goûts dépravés, de ces appétits bizarres auxquels le vulgaire croit qu'il est important d'obéir. Lorsque le terme de la grossesse approche, la respiration est gênée; le diaphragme, refoulé en haut par les viscères abdominaux, s'abaisse difficilement; aussi la nature a-t-elle, autant qu'elle a pu, retardé cet instant de gêne, en donnant au bas-ventre une grande capacité, aux dépends de la poitrine, qui dans la femme est bien plus courte que dans l'autre sexe.

Si l'accroissement du fœtus, sa grosseur, la quantité des eaux, le développement de la matrice, étoient toujours égaux, on pourroit fixer la hauteur à laquelle ce dernier organe s'élève, à une époque donnée de la grossesse; mais ces conditions varient tellement dans chaque individu, que les termes que l'on voudroit assigner ne conviendroient qu'à un petit nombre; il nous suffira donc d'avoir parlé des extrêmes. La matrice tend à s'élever dans une direction verticale : tant qu'elle est renfermée dans le bassin, elle conserve cette direction; mais aussitôt qu'elle a dépassé le détroit supérieur, elle cesse d'être soutenue et s'incline en avant, en arrière ou sur les côtés. Ces inclinaisons, portées à un certain degré, constituent les vices de situation que les accoucheurs nomment

obliquités de la matrice. Le sens dans lequel elles ont lieu est déterminé par la disposition des parties, ainsi c'est presque toujours en avant qu'elles s'effectuent, soit parce que le détroit supérieur du bassin est naturellement incliné dans ce sens; et forme avec l'horizon un angle de 45 degrés, soit parce que la colonne lombaire, convexe, pousse la matrice, qui ne peut la déprimer, sur la paroi antérieure, qui cède avec d'autant plus de facilité, que la femme a éprouvé plusieurs grossesses.

La dilatation de l'utérus n'est pas l'effet d'une simple distension de ses parois, puisque celles-ci, loin de s'amincir à mesure que le viscère croît en capacité, augmentent au contraire d'épaisseur par la dilatation des vaisseaux de toute espèce et l'affluence des liquides. Dans cette espèce de végétation, la matrice est vraiment active, et ne cède point aux efforts que le fœtus pourroit exercer sur elle. Le col de ce viscère, qui, à raison de sa plus grande consistance, avoit d'abord résisté à la dilatation, finit par céder à l'effort que les fibres du fond exercent sur le contour du museau de tanche: les bords de cette ouverture s'amincissent, le col s'efface, l'orifice s'agrandit; et l'on sent, à travers le fœtus plongé au milieu des eaux que contiennent ses membranes.

A la fin de la grossesse, le besoin de rendre les urines est plus fréquent, la vessie comprimée ne pouvant les contenir en grande quantité; les ex-

trémités inférieures s'œdématient, les veines des jambes deviennent variqueuses; les femmes sont aussi plus exposées aux hémorrhoïdes, et ces effets dépendent de la compression des vaisseaux qui rapportent le sang et la lymphe des parties inférieures; comme les crampes que les femmes enceintes ressentent, tiennent à celle qu'éprouvent les nerfs sacrés. Les aines sont également douloureuses, et les femmes y éprouvent des tiraillemens qui doivent être attribués à l'engorgement des ligamens ronds de la matrice. Ces ligamens, comme la matrice, manifestent, au moment de la grossesse, leur nature musculaire; leurs vaisseaux se dilatent, et leurs fibres deviennent plus apparentes, ainsi que M. Jules Cloquet l'a constaté bien des fois sur le cadavre des femmes mortes peu de temps après l'accouchement (1). Enfin, la peau de la paroi antérieure du bas-ventre, distendue outre mesure, se gerce et se fendille lorsque celle des parties voisines a prêté autant qu'elle a pu.

Avant de dire comment la matrice se débarrasse du fœtus et de ses enveloppes, au terme de la grossesse, donnons quelque attention à ce produit de la conception; étudions son développement, examinons la nature des relations qu'il entretient avec sa mère.

---

(1) Ces deux cordons charnus n'ont-ils pas alors pour usage d'agir sur la matrice, d'en déprimer le fond, et de ramener ce viscère dans la ligne de l'axe du détroit supérieur du bassin?

CCVI. *Histoire du fœtus et de ses enveloppes.* L'intérieur de la matrice, examiné pendant les premiers temps qui suivent l'instant de la conception, n'offre rien qui décèle l'existence de son produit. Mais au bout de quelques jours on aperçoit, au milieu d'une masse tomenteuse, semblable à un caillot de sang fibrineux, une vésicule membraneuse transparente, remplie par une gelée liquide et tremblante, dans laquelle on ne voit aucune trace d'organisation et de vie. Cependant ce petit œuf prend de l'accroissement; certaines parties du liquide gélatineux acquièrent une consistance plus grande; en même temps leur transparence diminue: on peut alors distinguer les premiers linéamens des parties, apercevoir l'ébauche de la tête, du tronc et des membres. L'ovule, d'abord libre dans la cavité de l'utérus (de Graaf), contracte des adhérences avec ce viscère; toute sa surface extérieure devient velue, cotonneuse; et cette sorte de végétation n'est en aucun endroit plus marquée que dans celui où doit se trouver le placenta. Cependant, vers le dix-septième jour, les parties qui n'offroient qu'une masse homogène, similaire et demi-transparente, manifestent une structure mieux décidée. Un point rouge paroît dans le lieu qui correspond au cœur : c'est cet organe lui-même, reconnoissable aux battemens de ses cavités et aux mouvemens des molécules du liquide rouge qui les remplit. De ce que le cœur est le point saillant (*punctum saliens*),

on ne doit point inférer qu'il jouit le premier de la vie (*primum vivens*); que, formé le premier, il préexiste à tous les autres organes. Toutes nos parties ne se forment point en même temps, toutes ne sont point *coævales*, comme l'a dit Charles Bonnet; selon ce philosophe naturaliste, les parties de l'embryon se montrent plus tôt ou plus tard à l'œil de l'observateur, suivant que, par la nature de leur organisation, elles sont plus ou moins propres à réfléchir la lumière.

Cette opinion erronée est celle de tous les physiologistes qui croient à la préexistence des germes. Selon eux, il y a simplement *évolution*, c'est-à-dire développement successif des organes préconçus ou préformés. Les travaux récens des anatomistes tendent à ruiner complétement cette hypothèse. En effet si, avec le docteur Pander, on suit pas à pas, c'est-à-dire heure par heure le développement du germe de l'œuf du poulet, on voit la cicatricule, petite membrane qui se détache sur l'un des points du jaune; on voit, dis-je, dans les premiers jours de l'incubation cette pellicule se plisser régulièrement, et les organes naître successivement et pièce à pièce dans l'intervalle de ces plis. Chez les mammifères, au cordon ombilical, produit primitif de la conception, se joignent bientôt quelqnes fragmens du tube intestinal, qui d'abord séparés et distincts, s'étendent et se rejoignent. Les parois des cavités se forment plus tard, de manière que

les viscères contenus existent avant que les cavités ou parties contenantes soient fermées par le complet développement de leurs parois. Dans cette formation successive des organes, l'embryon parcourt tous les degrés de l'échelle animale : d'abord simple bourgeon vésiculaire analogue aux vers les plus simples, aux hydatides, il passe graduellement, par une suite admirable de métamorphoses, à des degrés d'organisation plus relevés ; et toutes les phases qu'il parcourt répondent à des états permanens dans le règne animal.

Les animaux se forment de la circonférence au centre : assemblage de parties d'abord isolées, mais qui en croissant se rejoignent et s'unissent pour former un tout dans lequel se retrouvent long-temps les traces subsistantes de la séparation primitive. L'animal ne procède point, comme on l'a cru jusqu'ici, du centre à la périphérie : cette erreur capitale frappe d'un vice radical tout ce que les physiologistes ont jusqu'à présent imaginé touchant la formation des organes et de l'individu résultant de leur assemblage. Quel que soit le viscère dont on étudie la formation, toujours on verra ses parties latérales paroître les premières, puis se développer, croître et s'unir enfin sur la ligne médiane par laquelle, dans tous les cas, se termine l'accroissement. Le tissu artériel préexiste aux autres systèmes, et les précède dans leur formation. L'os, le lobe cérébral, les muscles se dé-

veloppent à la suite et autour de l'artère qui fournit les matériaux de cette sécrétion nutritive, en vertu de laquelle s'effectue l'organogénésie.

Le corps humain se forme donc de la circonférence au centre, et non point du centre à la circonférence, comme on l'a cru jusqu'au commencement du siècle. Cette marche suivie par la nature dans la formation des animaux est uniforme et constante. Tous les organes, tous les systèmes d'organes sont assujettis aux mêmes lois de formation : toujours l'organogénésie s'achève par la conjugaison des parties latérales des organes, d'abord développées, et qui finissent par se réunir sur la ligne médiane, par où se termine la composition de l'individu et de chacune de ses parties.

Les organes centraux et symétriques, le cœur par exemple, simple d'abord dans l'homme comme dans les espèces inférieures, est d'abord une espèce d'intestin ouvert par les deux extrémités. L'une d'elles se ferme ; c'est alors une poche unique, ouverte par le haut ; plus tard une cloison verticale s'élève de sa pointe, et cette sorte de diaphragme établit la séparation des deux ventricules ; plus tard encore une cloison horizontale vient les séparer des oreillettes, qui d'abord confondues se séparent enfin. C'est ainsi que par une suite d'évolutions et de changemens successifs, cet organe central parvient à la structure compliquée qu'il présente chez les oiseaux et les mammifères. C'est par lui que s'achève le développement de la

machine circulaire dont il étoit l'origine suivant Harvey, Stenon, Malpighi, Haller, partisans de l'hypothèse du développement central des organes.

Il en est absolument de même du cerveau, de la moelle de l'épine, de l'aorte, des intestins, de la trachée-artère : des lames latérales se rapprochent, s'unissent, et par une véritable conjugaison constituent un canal de la même manière que dans le développement du système osseux on voit les canaux et les ouvertures résulter de l'union ou de la conjugaison des pièces osseuses qui constituent les os dans leur état primitif.

Cependant des lignes rouges partant du cœur dessinent le trajet des plus gros vaisseaux, et paroissent agitées par l'action de ces conduits, dont les parois sont encore demi-transparentes : à mesure que le sang, ou plutôt sa partie rouge, s'étend du centre à la circonférence ; les formes se prononcent, les parties se développent et s'accroissent avec rapidité ; des points parfaitement opaques se manifestent, et l'on peut juger de la figure du fœtus. Recourbé sur lui-même, il ressemble assez bien à une fève de haricot suspendue par le cordon ombilical, qui, comme nous le dirons tout à l'heure, formé avec le fœtus et ses enveloppes, se développe avec eux ; il nage au milieu des eaux de l'amnios, change de position avec d'autant plus de facilité que l'espace dans lequel il est enfermé est très-grand, si on le compare à son petit vo-

lume. A mesure qu'il prend de l'accroissement, il s'étend un peu, sans cesser pour cela de paroître roulé sur lui-même (CLXIV) : la tête forme la plus grande partie de son corps; les membres supérieurs, semblables à de petits bourgeons, pullulent les premiers, puis les membres inférieurs; les pieds et les mains semblent immédiatement attachés au tronc; les doigts et les orteils paroissent sous la forme de petites papilles. De tous les organes des sens, les yeux sont les premiers qui deviennent apparens; on les distingue, sous la forme de petits points noirs, dès la fin du premier mois de la vie de l'embryon; les paupières naissent et les couvrent, etc. La bouche, d'abord béante, se ferme par le rapprochement des lèvres, vers la fin du troisième mois. Durant le quatrième, une graisse rougeâtre commence à se déposer dans les cellules du tissu muqueux, et les muscles exercent déjà quelques mouvemens. L'accroissement est d'autant plus rapide, que le fœtus approche davantage de terme de sa naissance. Il est impossible de déterminer le poids et la longueur du fœtus, suivant les différentes époques de la grossesse, puisque le temps précis de la conception n'est jamais bien sûr, et que l'accroissement suivant une marche inégale dans les différens individus; un fœtus de six mois peut être aussi gros qu'un autre fœtus à terme. Néanmoins, au moment de son expulsion, le corps a assez ordinairement de seize à dix-sept pouces de longueur, et pèse six à sept livres.

Les plus petits fœtus ne pèsent pas moins d'une livre, et les plus gros vont jusqu'à dix. 3 fœtus, sur 7,077, s'élevoient à ce dernier poids. (BAUDELOQUE.)

La sécrétion de la bile, comme celle de la graisse, paroît s'établir vers le milieu de la grossesse, et colore en jaune le méconium, mucosité auparavant sans couleur, qui remplit le tube digestif. Peu de temps après, les cheveux croissent. Les ongles se forment du sixième au septième mois; une membrane très-mince, qui fermoit la pupille, se déchire par la rétraction des anses vasculaires qui se retirent (1) vers son contour, et cette ouverture apparoît. Les reins d'abord multiples, c'est-à-dire formés chacun de quinze à dix-huit noyaux glanduleux séparés, se réunissent, et ne forment de chaque côté qu'un seul viscère. Enfin les testicules, d'abord placés sur les côtés de la colonne lombaire et de l'aorte, près la naissance des artères et des veines spermatiques, puis descendus le long des vaisseaux iliaques jusqu'à l'anneau inguinal, dirigés par un cordon cellulaire, appelé par Hunter leur gouvernail (*gubernaculum testis*), franchissent cette ouverture, entraînant avec eux non-seulement la portion du péritoine qui doit former leur tunique vaginale, mais encore les fibres inférieures du muscle petit oblique.

---

(1) J. Cloquet, *Mémoire sur la membrane pupillaire du fœtus.*

L'enveloppe des testicules, fournie par le péritoine, recouvre non-seulement ces organes, et se réfléchit sur eux, mais encore monte, dans les adultes, à un demi-pouce environ de hauteur, sur la partie inférieure du cordon spermatique. Si elle ne va point, dit-on, jusqu'à l'anneau inguinal, c'est que toute la portion qui, après la naissance, s'étendoit depuis cette ouverture jusque près du testicule, s'est décomposée, et se trouve réduite en tissu cellulaire. En réfléchissant sur les causes de la décomposition spontanée d'une portion de ce prolongement péritonéal, j'ai reconnu que rien n'étoit moins prouvé et plus invraisemblable. En effet, dans les premiers temps de la vie, les testicules, sortis de l'abdomen par l'anneau inguinal, sont très-peu éloignés de cette ouverture. La portion de tunique vaginale qui se continue sur le cordon des vaisseaux spermatiques monte jusqu'à l'anneau, et même se prolonge au delà, communiquant avec le péritoine, comme on le voit quelquefois dans les bubonocèles congéniaux. Ce n'est qu'à mesure qu'on avance en âge que les testicules descendent dans les bourses, en s'éloignant de l'ouverture qui leur a donné passage; de manière que, chez les adultes, le prolongement, qui d'abord couvroit la totalité du cordon, lequel avoit, après la naissance, seulement quelques lignes de longueur, se trouve n'en plus recouvrir que la partie inférieure, lorsqu'il s'est allongé de plusieurs pouces, sans qu'il s'ef-

fectue de décomposition; phénomène aussi difficile à concevoir qu'à expliquer. Cette opinion, émise pour la première fois dans la première édition de cet ouvrage, est aujourd'hui presque généralement adoptée.

Dans sa descente, ou plutôt, à raison de la situation du fœtus, dans son ascension vers les bourses, le testicule est donc entraîné et comme dirigé par un cordon qui a reçu le nom de son gouvernail. Cette espèce de ligament enveloppé d'une gaîne peritonéale qui dans la suite sera la tunique vaginale, contient quelques fibres musculaires, véritable rudiment du crémaster. A cet égard le fœtus ressemble aux animaux dont les testicules restent enfermés dans l'abdomen, et sont néanmoins pourvus de ce muscle.

Les ovaires, chez la femme, éprouvent des changemens analogues. D'abord situés au-dessous des reins, qu'ils égalent en grosseur, ils descendent avec l'utérus et ses annexes, dirigés par les ligamens ronds ou sus-pubiens, cordons fibreux enveloppés par un prolongement du péritoine, et présentant avec le cordon recteur du testicule (*gubernaculum*) la plus frappante analogie.

Le sexe du fœtus ne se prononce que vers la quatorzième semaine; ce qui a fait dire à certains physiologistes que primitivement il étoit neutre; et à Tiedeman que, d'abord femelle, il devenoit mâle, à moins que dans son développement il ne se trouvât arrêté à un degré inférieur d'organisa-

tion. Quoi qu'il en soit, l'utérus présente d'abord, comme chez les quadrupèdes, deux cornes auxquelles aboutissent le ligament de l'ovaire, ainsi que le ligament rond.

CCVII. *De la circulation dans le fœtus.* La principale différence qui existe entre le fœtus et l'enfant nouveau-né, outre l'inactivité des sens et le repos des muscles soumis à l'empire de la volonté, se tire de la manière dont la circulation s'exécute. Trop foible pour assimiler à sa propre substance des substances étrangères, le fœtus reçoit de sa mère ses alimens tout préparés. Les artères de la matrice apportent à cet organe une grande quantité de sang; ce liquide n'est point tout employé à la nourriture du viscère, mais passe en grande partie de la mère à l'enfant, versé par les vaisseaux utérins à la surface et dans les cellules d'un gâteau spongieux adhérent, d'une part, à la matrice, et de l'autre, à l'œuf qui contient le fœtus.

Ce corps cellulo-vasculaire, connu sous le nom de *placenta*, est, aussi bien que les enveloppes du fœtus, et le fœtus lui-même, un produit de l'acte générateur. Quoiqu'il adhère le plus souvent au fond de la matrice, il peut tenir à quelque autre point de ses parois; quelquefois même il est placé sur son orifice, circonstance qui rend toujours l'accouchement difficile. Le côté par lequel il est uni à la face interne de l'utérus est chez certains animaux inégal, raboteux, surmonté d'éminences mamelonnées (*cotylédons*), qui s'enfoncent dans

des cellulosités correspondantes des parois de la matrice, dont l'intérieur perd, à mesure qu'elle se développe, la forme lisse qu'il présente dans l'état de vacuité, se creuse d'enfoncemens (*sinus utérins*) destinés à recevoir les lobes du placenta, et se hérisse d'éminences qui s'engagent dans les cellules de ce corps (*sinus du placenta*). Mais dans l'espèce humaine l'état des choses est différent, et si l'on fait attention que chez certains mammifères, tels que le cochon domestique et le cheval, il n'y a pas, à proprement parler, de placenta, on sera forcé d'admettre une extrême diversité pour le mode de communication entre les mères et les fœtus, dans les différentes espèces.

Le placenta de l'homme appartient évidemment au fœtus; son parenchyme est surtout formé par les divisions extrêmement multipliées de la veine et des artères ombilicales, réunies par un tissu spongieux dans lequel elles sont comme plongées. C'est dans ce tissu gorgé de sang, que l'une absorbe et que les autres déposent le sang qui va au fœtus ou revient du côté de la mère.

La face utérine du placenta est assez lisse; et si l'on examine de chaque côté cette adhérence autour de laquelle l'épichorion se réfléchit à peu près comme le péritoine autour de l'adhérence celluleuse connue sous le nom de ligament coronaire ou suspenseur du foie, on voit du côté de la matrice des orifices dans lesquels on peut introduire des tuyaux de plume : ce sont les sinus uté-

rins. Ils correspondent à des ouvertures de même diamètre dont est percée la face utérine du placenta; en sorte que le passage du sang de la mère à l'enfant se fait de la manière suivante. Le sang artériel venant de la mère, versé dans les sinus utérins, coule de là dans les ouvertures correspondantes du placenta; et répandu dans le tissu cellulaire spongieux de cet organe, il est absorbé par les radicules de la veine ombilicale.

Les artères utérines, peut-être même les vaisseaux lymphatiques, si gros et si nombreux dans la matrice chargée du produit de la conception, que Cruyskank, qui est parvenu à les injecter, les compare à de gros tuyaux de plume, laissent donc pleuvoir dans le tissu spongieux du placenta le sang artériel de la mère, selon quelques-uns, seulement la partie séreuse de ce liquide; enfin, suivant d'autres, une humeur chyleuse (1), lympha-

---

(1) Un médecin allemand, Schréger, a émis une opinion ingénieuse sur la manière dont la circulation se fait de la mère à l'enfant. Selon lui, les artères utérines ne versent que de la sérosité dans les cellules du placenta. Cette sérosité est absorbée par les vaisseaux lymphatiques, qu'il suppose, par analogie, dans cet organe et dans le cordon ombilical, où on n'a pu jusqu'à présent les injecter. Ces vaisseaux la portent au canal thoracique; celui-ci la verse dans la veine sous-clavière gauche; elle va de là au cœur, qui la fait passer dans l'aorte. Elle revient au placenta, au moyen des artères ombilicales, *hématosée* par l'action des organes du fœtus. Cette sérosité, sanguifiée, retourne dans son corps par la veine

tique, blanchâtre ou lactescente. Épanchées dans les cellules du placenta, ces humeurs sont absorbées par les nombreux radicules de la veine ombilicale, qui, se réunissant successivement, forment le tronc de ce vaisseau.

La veine ombilicale, née dans l'intérieur du placenta, par des rameaux absorbans, se détache de ce gâteau, se porte vers l'ombilic du fœtus, entre dans son corps par cette ouverture, là, rencontre le foie, se plonge dans l'extrémité antérieure du sil-

---

ombilicale, et, suivant le trajet connu et décrit, sert à la nourriture de ses organes. Les rameaux des artères et de la veine ombilicale, ramifiés dans le placenta, et communiquant ensemble dans ce tissu spongieux, laissent échapper, par leurs pores latéraux, ce qui ne peut plus servir à la nourriture du fœtus. Ce résidu de la nutrition, déposé dans les cellules du placenta, est absorbé par les lymphatiques de l'utérus, qui le reportent dans le torrent des humeurs de la mère. Outre l'impossibilité de démontrer l'existence des vaisseaux lymphatiques, soit dans le placenta, soit dans le cordon ombilical, l'hypothèse de Schréger présente deux difficultés. Pourquoi le fluide nourricier venant de la mère, et poussé par l'aorte du fœtus dans toutes les parties de son corps, retourne-t-il au placenta pour revenir par la veine ombilicale? L'absorption est presque nulle chez le fœtus; l'enduit gras dont son corps est couvert empêche cette fonction à la surface de la peau; elle n'est guère plus active dans l'intérieur; les sécrétions excrémentitielles existent à peine avant la naissance; tout ce qui vient au fœtus est utilement employé pour le développement de ses organes, et voilà la raison pour laquelle son accroissement est si rapide.

lon antéro-postérieur de ce viscère, parcourt la moitié antérieure de cette scissure, en jetant, dans les lobes et surtout dans le lobe gauche, un grand nombre de rameaux ; arrivée à l'extrémité droite du sillon transversal, endroit où ce sillon se rencontre avec l'antéro-postérieur, elle s'unit en partie avec le sinus de la veine-porte hépathique, tandis que le reste, sous le nom de *canal veineux*, suit la direction primitive, et va s'ouvrir dans la veine-cave ascendante ou inférieure, très-près de l'endroit où cette veine se dégorge dans l'oreillette droite du cœur.

CCVIII. Le sang artériel qui coule dans la veine ombilicale s'est rapproché du sang veineux, s'est chargé d'hydrogène et de carbone, et a perdu en partie ses qualités vivifiantes en parcourant les vaisseaux de la mère, et les routes tortueuses du placenta. Il se dépouille de ces principes, et se revivifie, en quelque sorte, en traversant le foie, qui, à cette époque de la vie, remplit les fonctions dont les poumons doivent être chargés après la naissance. Aussi le foie forme-t-il avec le cerveau la plus grande partie du poids d'un enfant qui vient de naître. Il remplit à lui seul la plus grande partie de la cavité abdominale : acquerroit-il cette grosseur en s'appropriant l'hydrogène et le carbone du sang ombilical? sa substance est grasse, huileuse, et contient ces deux principes en très-grande proportion. La sécrétion de la bile et celle de la graisse, les seules qui s'opèrent bien

manifestement chez le fœtus, peuvent d'ailleurs très-bien suppléer au défaut de la respiration.

L'importance du foie chez le fœtus est plus grande que chez l'adulte : on peut la mesurer à son volume relatif, très-considérable à cette époque de la vie. Plusieurs le regardent comme l'organe destiné à remplacer alors le poumon dans l'hématose ou sanguification ; mais, par suite des changemens considérables que le cours du sang éprouve au moment de la naissance, son importance diminue, la peau du nouveau-né se teint d'un rouge jaunâtre (1) ; état tellement ordinaire, que les sages-femmes et les nourrices s'étonnent de ne le point observer sur quelques enfans.

---

(1) Cette coloration de la surface de la peau pourroit bien tenir chez l'enfant nouveau-né, comme chez l'adulte, à toute autre chose qu'au passage dans le sang de la bile en entier, ou seulement de sa partie colorante. Nous l'observons en effet à la suite des ecchymoses produites par des contusions considérables ou par des fractures des membres. La bile est alors assurément tout-à-fait étrangère au phénomène. La couleur jaune paroît, dans ces cas, dépendre de la résolution de l'ecchymose ; le sang, en partie absorbé, perd sa couleur, le noir devient graduellement moins foncé, la peau jaunit par degrés : ce n'est plus qu'un phénomène d'optique. Je crois que, dans le plus grand nombre des cas, l'ictère des nouveau-nés n'est autre chose que ce passage du rouge de la peau au moment de la naissance, à la couleur blanche qu'elle doit conserver. Cet état intermédiaire n'est que la dégradation de la couleur rouge primitive.

Le sang versé par l'ombilicale dans la veine-cave inférieure, et porté par cette veine dans l'oreillette droite, ne s'y mêle point avec celui que la veine-cave descendante rapporte des parties supérieures; car, comme nous l'avons dit ailleurs, les orifices de ces deux vaisseaux n'étant point directement opposés l'un à l'autre, les colonnes de sang qui y coulent ne se heurtent point mutuellement. Celui que la veine-cave inférieure apporte traverse le trou de Botal, vers lequel l'ouverture de cette veine est dirigée; il passe ainsi dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule du même côté, sans traverser l'organe pulmonaire, qui, privé d'air, compacte et dur, n'eût pu lui livrer passage; les contractions du ventricule gauche le poussent dans l'aorte; sa force d'impulsion va se briser contre la grande courbure de cette artère; il entre dans les vaisseaux qui s'en élèvent, et le portent directement au cerveau et aux parties supérieures. Ce sang est le plus pur, le plus oxigéné, celui qui vient le plus immédiatement du placenta; il n'a point encore circulé dans le corps du fœtus, si l'on en excepte une très-petite portion rapportée par la veine-cave du bassin et des parties inférieures; car le sang qui vient des viscères abdominaux s'épure en traversant le foie. Les autres parties du corps ne reçoivent, au contraire, qu'un sang très-peu oxigéné, puisque la quantité peu considérable de celui que les contractions du ventricule gauche et de l'aorte n'ont point fait passer dans les bran-

ches qui naissent de la crosse de ce vaisseau, se mêle bientôt au sang veineux qu'y verse le *canal artériel*, immédiatement au-dessous de cette courbure : aussi l'accroissement toujours relatif, non-seulement à la quantité, mais encore aux qualités plus ou moins vivifiantes du sang artériel, est-il bien plus rapide avant la naissance, dans les parties supérieures, de manière que le cerveau forme à lui seul la plus grande partie du corps, et que les épaules, la poitrine et les extrémités supérieures sont plus développées que l'abdomen, et surtout que le bassin et les membres inférieurs.

Le sang que la veine-cave descendante rapporte des parties supérieures du fœtus passe dans le ventricule droit : celui-ci le chasse par l'artère pulmonaire, qui n'envoie aux poumons que deux foibles rameaux, et va, sous le nom de *canal artiréel*, s'ouvrir dans l'aorte, immédiatement au-dessous de la naissance de l'artère sous-clavière gauche. Le commencement de l'aorte est donc rempli d'un sang artériel, chassé vers les parties supérieures par la contraction du ventricule gauche, tandis que le reste de cette artère contient un sang veineux, poussé par la force réunie des deux ventricules.

On ne peut méconnoître dans cette disposition admirable un but d'utilité bien évidente. En effet, si toutes les forces du cœur se fussent réunies pour lancer le sang vers le cerveau, la texture délicate de ce viscère en eût été altérée ; il étoit

besoin, au contraire, de l'action combinée des deux ventricules pour faire parcourir au liquide les routes non moins longues que tortueuses du conduit ombilical et du placenta. L'artère aorte, arrivée vis-à-vis le corps de la quatrième ou de la cinquième vertèbre des lombes, se divise, et forme, par cette bifurcation, les deux artères ombilicales. Celles-ci fournissent au bassin et aux parties inférieures de foibles rameaux qui ne leur portent qu'un sang très-peu oxigéné, puis se recourbent sur les côtés de la vessie, s'inclinent en dedans, s'approchent de l'ouraque, sortent de l'abdomen par l'ombilic, et, se joignant à la veine ombilicale qui avoit pénétré par la même ouverture dans le corps du fœtus, forment avec elle le *cordon des vaisseaux ombilicaux.*

Suivant quelques physiologistes, on ne voit point entre le sang artériel et veineux du fœtus les différences frappantes qui caractérisent ces deux fluides après la naissance. Haller avoit déjà remarqué (1) que le sang du fœtus est d'une couleur très-foncée. Hunter a observé la même chose; et Autenrieth (2) a trouvé que le sang artériel du fœtus est aussi noir que le sang veineux de la mère. Il a également reconnu que la chaleur du fœtus est

---

(1) *Element physiolog.*, t. VIII, p. 255.

(2) *Dissertatio sistens experimenta circa calorem fœtus et sanguinem ipsius instituta.* Tubingæ, 1799.

moindre d'environ trois degrés, suivant le thermomètre de Réaumur. Ces observations, répétées sur des chiennes et des femelles de lapin prêtes à mettre bas, ne m'ont point semblé exactes. La veine ombilicale est remplie d'un sang d'un rouge vif. La couleur du sang qui coule dans les deux artères est brunâtre, et cette différence ne tient point à l'épaisseur diverse des parois vasculaires, car on l'aperçoit en ouvrant les vaisseaux. Il est bien vrai que, fréquemment, par l'effet du trouble que l'expérience apporte dans la circulation du fœtus, en dérangeant ses rapports avec la mère, le sang de la veine ombilicale noircit, et alors on ne peut apercevoir aucune différence de couleur; mais cet effet tient évidemment à l'embarras momentané que cause l'expérience. Les auteurs qui ont cru à l'identité de couleur entre le sang artériel et le sang veineux du fœtus, l'avoient examiné sur des individus retirés avec le placenta du sein de la mère, et par conséquent chez lesquels l'ordre habituel des fonctions étoit entièrement interverti.

CCIX. La longueur ordinaire du cordon ombilical, mesurée de l'ombilic au placenta, est de 20 à 24 pouces, ou 6 décimètres 4 centimètres et 9 millimètres. Elle peut n'être que de 6 pouces, comme elle peut aller bien au delà, ainsi qu'il conste par une observation de M. Baudelocque, dans laquelle le cordon avoit 57 pouces de longueur, et faisoit sept tours sur le cou de l'enfant : dernière circonstance qui prouve que le fœtus exécute des mou-

vemens dans le sein de sa mère. Enfin, on a vu à l'hospice de la Maternité un fœtus dont l'abdomen adhéroit immédiatement au placenta, en sorte qu'il n'existoit point de cordon ombilical visible entre ce gâteau spongio-vasculaire et le corps du fœtus. Des trois vaisseaux qui forment le cordon, deux plus petits ont une structure artérielle, quoique charriant un sang réellement veineux, tandis que la veine ombilicale porte au fœtus un sang artériel. Les artères ombilicales, arrivées au placenta, se divisent et se perdent dans son épaisseur par un grand nombre de rameaux dont les dernières extrémités déposent dans les aréoles de son tissu le sang qui vient du fœtus et qui doit retourner à la mère. Le passage de l'injection de la veine dans les artères ombilicales prouve-t-il des anastomoses entre les extrémités de ces vaisseaux ?

C'est par le cordon ombilical et le placenta que le fœtus tient à la mère. Les veines et les vaisseaux lymphatiques de la matrice, et peut-être les unes et les autres, reprennent, à la surface du placenta, le sang qui a servi à la nourriture du fœtus, et le reportent à la mère, pour que, modifié par l'action de ces organes, et surtout par celle de l'air atmosphérique, dans la circulation pulmonaire, il redevienne propre à la nourriture et à l'entretien du fœtus. Soit que l'on injecte les vaisseaux utérins, soit que l'on pousse l'injection par les artères ou par la veine ombilicale, elle passe du placenta à l'utérus, et pénètre de l'utérus dans le placenta;

car les veines et les artères de la matrice, dilatées au point que leur calibre surpasse celui d'un tuyau de plume d'oie, s'abouchent avec les orifices ouverts à la surface, du placenta, sans se continuer immédiatement avec eux, comme l'enseignoit M. le professeur Antoine Dubois, décrivant ces communications sous le nom de vaisseaux *utero-placentaux*.

Les vaisseaux de la mère ne s'anastomosent donc point avec ceux du fœtus dans l'épaisseur du placenta, la circulation ne se continue pas immédiatement de l'une à l'autre. Si la communication étoit immédiate, les battemens du pouls de l'enfant seroient isochrones aux battemens du pouls de la mère, tandis qu'ils sont bien plus fréquens, comme on peut s'en assurer au moment de la naissance, avant la section du cordon ombilical. Si l'on ouvre les veines d'une chienne près de mettre bas, l'animal périt d'hémorragie et meurt exsangue. Cependant le placenta n'est vide que dans la portion adhérente à la matrice; l'autre partie de ce gâteau est, ainsi que le fœtus, remplie de sang, comme dans l'état ordinaire. On conçoit que si les vaisseaux de l'utérus se fussent continués sans intermédiaire avec ceux du placenta, l'accouchement n'eût pu avoir lieu sans leur déchirement; il en eût résulté des hémorragies inquiétantes, l'inflammation, et même la suppuration de l'organe qui auroit souffert. Enfin la force avec laquelle le cœur et les artères de la mère font couler le sang

dans ses vaisseaux eût altéré les organes du fœtus, trop mous pour soutenir sans dommage un choc aussi violent. Quoique le placenta et le cordon ombilical soient le lien qui unit l'enfant à la mère, ils appartiennent plutôt au premier ; ils n'en sont qu'un prolongement.

CCX. L'existence du fœtus est purement végétative; il puise continuellement dans les sucs que les vaisseaux de la mère envoient au placenta, ce qui doit servir à son accroissement et à sa nourriture. Il peut être considéré comme un nouvel organe produit de la conception, participant à la vie générale, mais ayant sa vie particulière, et, jusqu'à un certain point, indépendante de celle de la mère. Replié sur lui-même de manière à n'occuper que le moindre espace possible et s'accommoder à la figure ovoïde de l'utérus, il ne peut point être regardé comme un homme endormi; car non-seulement les organes des sens et des mouvemens volontaires sont dans un parfait repos, mais encore plusieurs des fonctions assimilatrices ne s'exercent en aucune manière, telles la digestion, la respiration et le plus grand nombre des sécrétions. Le fœtus exécute, au milieu des eaux de l'amnios, des mouvemens spontanés, que les accoucheurs regardent avec raison comme le signe le plus certain de la grossesse. On a voulu nier l'existence de ces phénomènes, et attribuer à un simple ballottement les déplacemens que le produit de la conception éprouve. On se fondoit sur

les connexions intimes qui existent entre la respiration et le mouvement musculaire : l'on disoit que le sang du fœtus, ne s'imprégnant point d'oxigène dans son passage à travers les poumons, ne pouvoit entretenir la contractilité ; mais outre qu'un fait n'est pas moins certain, pour se prêter difficilement aux explications, on peut répondre que la mère remplit cet office à l'égard du fœtus, et lui envoie un sang artériel propre à déterminer la contraction des muscles.

Comme nous n'exerçons aucun mouvement qu'en vertu d'impressions antérieurement reçues, et que les organes des sens du fœtus sont dans une inactivité complète, il paroît difficile de dire pourquoi il agit dans le sein de sa mère. Mais le toucher s'exerce lorsqu'une partie quelconque de la surface de son corps vient heurter l'intérieur du sac qui le contient : enfin les impressions intérieures déterminent des mouvemens chez le fœtus comme chez l'adulte qui dort d'un profond sommeil.

Le fœtus se nourrit, comme tout autre organe, en s'appropriant ce qui lui convient dans le sang que lui apportent les vaisseaux de la matrice. Analogue aux plantes parasites, il se nourrit aux dépens du tronc sur lequel il est enté : il vit aux frais de la mère, comme l'un des membres de cette dernière, différant néanmoins de ceux-ci, en ce qu'il possède tous les organes nécessaires à son existence séparée, après qu'ils auront ac-

quis un certain degré de développement et de force.

On demande si la liqueur de l'amnios sert à la nutrition du fœtus, dont la bouche est fermée, la tête penchée sur la poitrine, et le conduit intestinal plein d'un liquide différent de celui dans lequel son corps est plongé. L'enduit gras qui recouvre la surface de la peau ne s'oppose-t-il pas à l'absorption qui pourroit avoir lieu par la surface extérieure?

S'il étoit vrai que le cordon ombilical a manqué dans certaines occasions, on seroit bien forcé d'admettre l'opinion de Boërhaave (1), et de croire avec lui que le fœtus se nourrit des eaux de l'amnios; mais les auteurs qui prétendent avoir constaté l'absence du cordon ombilical ne méritent aucune confiance. Stalpart Vanderviel (2), par exemple, curieux de recueillir des *cas rares*, rapporte une observation de défaut du cordon, faite sur un enfant de quinze mois. D'autres observations semblables existent dans les journaux du dix-septième siècle, dans les Éphémérides des curieux de la Nature, collections périodiques, alors comme aujourd'hui dégoûtantes d'inepties et de mensonges. Deux observations plus récentes, faites

---

(1) *Institutiones médicæ*, § 382.

(2) *Observationum rariorum centuria posterior, pars* 1, *observat.* 32.

par Osiander, et rapportées par M. Lobstein dans son Essai sur la nutrition du fœtus (3), n'ont pas plus d'authenticité; et l'on est surpris qu'un esprit aussi judicieux leur ait accordé quelque créance.

D'un autre côté, on a des faits avérés qui prouvent que des enfans sont venus au monde avec la bouche et les narines fermées, les autres absolument sans tête, et cependant l'estomac et les intestins étoient remplis du méconium accoutumé. Des fœtus ont continué de vivre dans la matrice long-temps après l'écoulement des eaux de l'amnios. La doctrine d'Hippocrate, d'Aristote, de Galien, touchant la nutrition du fœtus par le cordon ombilical, est donc plus probable que l'opinion de Boërhaave.

Cependant comme l'existence d'un sac membraneux rempli d'eau est constante dans les animaux à sang chaud, et même dans ceux à sang froid, chez lesquels il n'existe ni placenta, ni cordon ombilical; que la liqueur de l'amnios, abondante dans les premiers temps de la grossesse, diminue à mesure que le fœtus s'accroît, Haller, et avec lui plusieurs physiologistes, ont adopté une opinion mixte, et admis que le fœtus se nourrissoit à la fois au moyen du cordon om-

---

(3) Essai sur la nutrition du fœtus. Strasbourg, 1802, page 100.

bilical et des eaux de l'amnios. Le fœtus avale-t-il celle-ci par une véritable déglutition; pénètre-t-elle par la bouche dans les voies digestives; ou l'absorbe-t-il par sa surface extérieure? on ne peut énoncer ici que de simples probabilités.

Les embryons se nourrissent à une époque où la bouche et les organes gastriques ne sont point encore formés. Plusieurs fœtus ont offert l'imperforation de la bouche et des narines. Heister a vu, l'eau de l'amnios étant gélée dans l'œuf de la vache, un glaçon se continuer de la bouche jusqu'à l'estomac. On trouve dans le méconium des poils semblables à ceux que contient l'amnios : il est vrai que l'origine des poils étant inconnue, ils peuvent se former dans le méconium comme dans l'amnios. M. Béclard (1), pour prouver l'introduction de l'eau dans les voies digestives, cite un fait qui me paroît entièrement opposé à cette opinion. « J'ai disséqué, dit-il, le cadavre d'un fœtus dont « l'intestin présentoit une oblitération; la partie « supérieure contenoit seule du méconium; l'in- « férieure, très-étroite, ne contenoit qu'une mu- « cosité douceâtre, incolore. » Rien assurément n'établit moins l'introduction de l'eau de l'amnios. Cette liqueur douceâtre, qui remplissoit la partie inférieure de l'intestin, étoit le résultat des sécrétions muqueuses plus abondantes chez le fœtus

(1) Thèse inaugurale. Paris, août 1813.

que chez l'adulte, comme l'a très-bien observé M. Lobstein : elle ne différoit du méconium contenu dans la partie supérieure, que parce que la bile n'avoit pu s'y mêler.

Il paroît donc probable que c'est principalement par le moyen du cordon ombilical que s'opère la nutrition du fœtus : si l'eau de l'amnios y contribue, elle pénètre par voie d'absorption. La surface du corps est éminemment absorbante; c'est seulement vers la fin de la grossesse qu'elle se couvre de cet enduit gras qui doit en boucher les pores. Cette matière caséeuse est formée par les glandes sébacées de la peau, très-développées à cette époque de la vie.

L'eau de l'amnios peut, en certains cas, s'introduire dans le corps du fœtus, non que cela arrive aussi constamment que l'ont pensé certains physiologistes. Lorsque l'on ouvre une chienne prête à mettre bas, on voit à travers la membrane de l'amnios, après avoir incisé l'utérus (1), les

---

(1) Expériences faites à l'École d'accouchemens de Copenhague, par MM. Hérold et Abilgaard, et à l'École de Médecine de Paris.

Il est remarquable que ces observations aient été faites dans un grand détail par Vésale, comme le prouve le passage suivant, trop curieux pour que le lecteur nous sache mauvais gré de l'avoir transcrit en son entier :

« Verùm in fœtuum vivâ administratione jucundum est « spectare, qualiter simulatque fœtus aërem ambientem con-

petits fœtus respirer les eaux dans lesquelles ils sont plongés.

Mais cette introduction de l'eau de l'amnios, qui a certainement lieu lorsque la circulation avec la mère éprouve des obstacles, n'est point habituelle. Si ce phénomène existoit, la respiration du fœtus ressembleroit, jusqu'à un certain point, à celle des poissons : il resteroit à voir si les eaux de l'amnios contiennent un air assez riche en oxigène pour agir sur le sang qui traverse les poumons.

---

tingit, respirare nititur. Atque hæc sectiò opportunè in cane aut sue obitur, quùm non multò post sus est paritura. Si enim ipsius abdomen ad peritonei usque cavitatem diviseris, atque dum uterum quoque in unius fœtus sede aperueris, ac secundina ab utero liberata fœtum mensæ imposueris, cernes per pellucidas membranaceasque ipsius tunicas, *qualiter is frustrà respirare conatur*, et veluti suffocatus moritur. Si verò fœtus involucra pertuderis, ipsiusque caput illis liberaveris, mox illum veluti reviviscere, et eleganter respirare cernes. Atque quùm id in uno fœtu indagaveris, alium aggredieris : quem ab utero non liberabis, verùm apertum ex dictâ jam fœtus administratione, uterum tantisper invertes, et prius factæ sectionis labia extrorsum reflectes, dum alterius proximiqne fœtus infima involucrorum pars sedesve appareat, et hanc ad eam usque regionem ab utero detegas, quà is exteriori fœtus involucro connascitur : et quà ampla ea lienis substantiæ similis caro habetur, quæ vasa ex utero in exterius fœtus involucrum intertexit. »

ANDREAS VESALIUS, *de Corporis humani fabricâ*, lib. VII, cap. 19, cui titulus : *de Vivorum sectione nonnullâ.*

On a long-temps pensé que le fœtus étoit dans une situation droite pendant les premiers mois de sa vie, mais que vers la fin de la grossesse il la quittoit pour prendre une position renversée, en faisant la *culbute*. Cette erreur, accréditée par son antiquité et par la foi qu'y avoient ajoutée plusieurs physiologistes, se trouve victorieusement réfutée dans le Traité du professeur Baudelocque, sur l'Art des accouchemens. Il suffit, pour reconnoître l'absurdité d'une telle hypothèse, de faire attention que la tête de l'embryon, en étant toujours la partie la plus volumineuse et la plus pesante, doit nécessairement occuper l'endroit le plus déclive.

L'embonpoint, la force du fœtus, ne sont point relatifs à la vigueur de la mère. On voit des femmes grasses et puissantes donner le jour à des enfans chétifs, tandis que d'autres, maigres, épuisées, les mettent au monde gras et bien portans. Ce ne sont cependant que des exceptions à la règle qui enseigne que, toutes choses égales d'ailleurs, le bon état du fœtus se mesure par celui de la mère. L'altération des liquides de celle-ci influe manifestement sur la santé du fœtus; peut-être même est-ce la voie par laquelle se transmettent les maladies héréditaires, attribuées par d'autres à certaines altérations de la semence.

Le fœtus est sujet à des affections de diverses espèces, soit qu'elles naissent en lui-même, soit qu'il en reçoive le germe. Souvent on a vu des

cicatrices qui prouvoient évidemment des solutions de continuité de diverses espèces. Assez fréquemment l'enfant qui vient au monde privé de quelque membre, l'a perdu à la suite d'une affection éprouvée dans le sein de sa mère. Hippocrate (1) fait mention de diverses espèces de luxations de la cuisse et du bras qui peuvent survenir au fœtus dans le sein de sa mère. Le professeur Chaussier, appelé dans un cas de cette espèce, trouva la main et une portion de l'avant-bras au milieu des *secondines*.

On doit au même professeur deux observations curieuses sur les fractures survenues à des fœtus encore contenus dans la matrice, et faussemant attribuées à l'imagination de la mère (2). Dans le premier de ces deux cas, la grossesse ayant été heureuse et l'accouchement facile, le nouveau-né offrit quarante-trois fractures très-distinctes, les unes récentes, les autres dans un état de consolidation plus ou moins avancé. Dans le second cas, la mère étant également bien portante, et la grossesse n'ayant été traversée par aucun accident, l'accouchement à terme donna naissance à un enfant femelle qui mourut au bout de vingt-quatre heures, et dont le corps offrit cent treize fractures, les unes déjà consolidées, et les autres non réu-

(1) *De Articulis.*

(2) Bulletin de la faculté de Médecine de Paris, n° 3. 1813.

nies. Un esprit prévenu n'eût pas manqué, à l'exemple de Muys et d'Arnaud, de chercher la cause de cet accident dans l'influence prétendue de l'imagination de la mère; mais comme ces auteurs, notre savant collègue n'a point été séduit par l'autorité de Malebranche. Ce philosophe raconte dans son traité de la Recherche de la vérité (1), qu'il y a environ sept ou huit ans l'on « voyoit aux Incurables un jeune homme qui étoit « né fou, et dont le corps étoit tout rompu dans « les mêmes endroits dans lesquels on rompt les « criminels; il a vécu plus de vingt ans en cet état; « plusieurs personnes l'y ont vu, et la feue reine-« mère étant allée visiter cet hospice, eut la cu-« riosité de le voir, et même de toucher les bras « et les jambes de ce jeune homme aux endroits « où étoit la facture. » Plus de quarante ans après, un médecin hollandais, Hartzoëker (2), en rapportant le cas de Malebranche, ajoute qu'une femme de qualité de Paris, ayant également assisté à l'exécution d'un criminel condamné au supplice de la roue, quelques mois après mit au monde une fille toute rompue. Cette fille vécut, mais demeuroit couchée, et ne faisoit autre chose que pousser de temps à autre une voix plaintive : la chose est sûre; l'auteur la tenoit *d'un laquais de*

---

(1) Liv. II, chap. 7. Paris, 1674.

(2) Suite des conjectures physiques. Amsterdam, 1708.

la maison où cette fille étoit gardée, mais secrètement.

Il est étonnant, comme l'observe M. ssier, que des faits semblables aient été admis sur de simples ouï-dire, et que dans le siècle éclairé où vivoit Malebranche, temps où l'on avoit tant de goût pour le merveilleux et tant de facilité pour écrire, aucun anatomiste, aucun médecin n'eût constaté d'une manière positive le cas qu'il ne fait qu'indiquer; mais alors, comme aujourd'hui, le vulgaire crédule adoptoit, sans examiner, les fables les plus absurdes. Les vrais savans dédaignoient de combattre des impostures aussi grossières, et l'erreur, en veillissant, devenoit respectable. Quel savant, écrivant, et tenant pour certains tous les faits apocryphes dont les journaux bercent notre crédulité, n'exerceroit point notre foi par des faits aussi invraisemblables que celui rapporté par Malebranche? Mais, grâces aux progrès de la raison humaine, aucun fait n'est maintenant admis dans la science sans avoir été d'abord soumis à l'examen d'une critique sévère; les gens du monde et les demi-savans continuent seuls à puiser leur instruction et leurs croyances dans ces archives de la sottise et du mensonge.

CCXI. *Des monstres.* Comme il est utile d'étudier la nature jusque dans ses écarts, nous allons dire deux mots sur les monstres, en les réduisant à trois classes, d'après M. de Buffon, qui nomme ceux de la première, monstres par excès; ceux

la seconde, monstres par défaut, et met dans la troisième ceux qui le sont par le renversement ou la fausse position des organes. Dans la première, on range ceux qui ont des membres ou des doigts surnuméraires, ou même deux corps unis ensemble de diverses manières. Dans la seconde, se trouvent les enfans qui viennent au monde avec un bec-de-lièvre, ou manquent d'une partie quelconque. Enfin, on place parmi ceux de la troisième non-seulement les individus qui présentent une transposition générale des organes, de manière que le cœur, la rate et l'S iliaque du colon se trouvent à droite, tandis que le foie et le cæcum sont à gauche, mais encore ceux qui naissent avec des hernies de toute espèce. On doit joindre à ces trois sortes de monstruosités les taches de la peau, dont la couleur est toujours celle de quelqu'une de nos humeurs, mais dont les formes extrêmement variées n'ont aucun motif, quoique, d'après un ancien préjugé, on s'efforce d'y trouver des ressemblances plus ou moins frappantes avec les choses convoitées par les femmes enceintes livrées aux goûts bizarres et aux appétits déréglés qui accompagnent si souvent la grossesse.

Parmi ceux qui ont essayé de remonter aux causes de ces conformations vicieuses, les uns, comme Malebranche, les ont attribuées au pouvoir de l'imagination de la mère sur le fœtus renfermé dans son sein; les autres, comme Maupertuis, ont pensé que, les passions dont elle est agitée

imprimant à ses humeurs des mouvemens désordonnés, celles-ci heurtoient avec violence le corps si tendre et si délicat des embryons et des fœtus, et en dérangeoient la structure. Les maladies qui les affligent pendant la durée de leur séjour dans la matrice en sont des causes bien plus probables (1). En outre, comme la machine animale au lieu d'être constituée, pour ainsi dire d'un seul jet, se forme progressivement et s'organise, à proprement parler, pièce à pièce, le plus grand nombre des monstres sont des individus arrêtés dans leur développement normal, et présentant des êtres incomplets, dont on peut trouver les analogues dans les espèces inférieures. Le fœtus humain paroît parcourir toute l'échelle de l'animalité avant d'arriver au complément d'organisation qui l'élève au-dessus des embryons et des fœtus des autres espèces, comme si, dans la production des êtres vivans, la nature partoit toujours d'un point fondamental, duquel les différens animaux s'éloignent en subissant un nombre plus ou moins grand de métamorphoses successives.

L'observation attentive des monstruosités, ou vices de conformation, que les enfans apportent en naissant, a, comme l'observe très-bien M. le professeur Béclard (2), contribué à faire découvrir

---

(1) *Voyez* Erreurs populaires relatives à la médecine, ch. 1, in-8°. Paris, 1812.

(2) Élémens d'Anatomie générale, Introduction, p. 3.

une des lois les plus importantes du développement et de l'organisation. Le plus souvent le vice de conformation offre la permanence d'un état temporaire; c'est ainsi que le bec-de-lièvre, le spina-bifida, etc., résultent de la persistance de cette fente qui sépare les deux moitiés de l'individu dans les premiers temps de son existence. Les monstruosités dépendantes d'un retard dans l'organogénésie se rencontrent presque toujours sur la ligne médiane. C'est ainsi que les hernies du cervelet et du cerveau se voient le plus souvent vis-à-vis la partie moyenne de l'occiput, des pariétaux et du frontal, endroits par lesquels leur ossification s'achève. La conjonction des yeux chez les fœtus cyclopes tient au défaut de développement de l'ethmoïde. Le bec-de-lièvre, les fentes de la voûte palatine, de la luette, tiennent à la même cause. C'est sur la ligne médiane qu'existent les éventrations congéniales, la disjonction des parties, l'extrophie vésicale, l'hypospadias, les fissures du périnée, d'où naissent des apparences d'hermaphrosisme. C'est par la ligne médiane que l'évolution organique se termine; les deux moitiés du corps, par lesquelles le développement commence, se rapprochent; l'homme droit et l'homme gauche s'unissent. Voilà la raison par laquelle l'enfant qui naît avec un vice de conformation présente les parties latérales de son corps et de ses organes complétement développées, tandis que les parties occupant la ligne médiane sont à peine ébauchées ou manquent entièrement.

Si deux fœtus contenus dans le même œuf sont placés dos à dos, et que les surfaces par lesquelles ils se touchent viennent à s'enflammer, on conçoit comment s'effectuera leur union. Si l'on met dans un vase étroit les œufs fécondés d'une tanche ou de tout autre poisson, les petits nombreux qui en naissent, n'ayant point assez d'espace pour se développer, se collent les uns aux autres, et de là naissent des poissons vraiment monstrueux.

Lorsque, par l'effet d'une maladie, ou par un vice de conformation primitive, le corps du fœtus manque de quelqu'une de ses parties, les autres se nourrissent mieux, et atteignent un développement plus considérable. C'est ainsi que, dans les acéphales, le manque de cerveau fait que, le sang qui devrait se distribuer à ce viscère se portant à la face, celle-ci acquiert une grosseur remarquable.

Parmi les monstruosités qui tiennent à un vice primitif dans l'organisation des germes, il n'en est pas de plus curieuse que celle qui fut envoyée, il y a quelques années, par le ministre de l'intérieur à l'École de Médecine de Paris.

Un jeune homme, âgé de treize ans, s'étoit plaint dès sa plus tendre enfance d'une douleur dans le côté gauche du bas-ventre. Ce côté s'étoit élevé, et avoit présenté une tumeur dès les premières années de sa vie. A l'âge de treize ans, la fièvre le saisit tout à coup, sa tumeur augmenta de volume et devint très-douloureuse. Quelques

jours après il évacua par les selles des matières puriformes et fétides. Au bout de trois mois, réduit au marasme, il rendit par les selles un peloton de poils, et quelques semaines après il mourut dans un état de consomption très-avancé.

A l'ouverture du corps on trouva, dans une poche adossée au colon transverse et communiquant avec lui, quelques pelotons de poils et une masse organisée. Le kyste, situé dans le mésocolon transverse, au voisinage du colon et hors des voies de la digestion, communiquoit avec l'intestin; mais cette communication étoit récente, accidentelle, et l'on voyoit manifestement les restes de la cloison qui séparoit ces deux cavités. La masse organisée présentoit, dans ses formes, un grand nombre de traits de ressemblance avec le fœtus humain. La dissection ne permit pas de douter de sa nature. On y découvrit la trace de quelques organes des sens; un cerveau, une moelle de l'épine, des nerfs très-volumineux, des muscles dégénérés en une sorte de matière fibreuse, un squelette composé d'une colonne vertébrale, d'une tête, d'un bassin et de l'ébauche de presque tous les membres; enfin, dans un cordon ombilical très-court et inséré au mésocolon transverse, hors de la cavité de l'intestin, une artère et une veine ramifiées par chacune de leurs extrémités du côté du fœtus et du côté de l'individu auquel il tenoit. Cela suffisoit certainement pour établir l'indivi-

dualité de cette masse organisée, quoique d'ailleurs elle fût dépourvue des organes de la digestion, de la respiration, de la secrétion des urines et de la génération; seulement l'absence d'un grand nombre d'organes nécessaires à l'entretien de la vie devoit la faire regarder comme un de ces fœtus monstrueux condamnés à périr au moment de leur naissance. Ce fœtus étoit évidemment contemporain de l'individu auquel il étoit attaché; analogue au produit des conceptions extra-utérines, il vivoit aux dépens de celui qu'on doit regarder comme son frère, et dont le germe avoit primitivement enveloppé le sien. Pendant les treize premières années de la vie de Bissieu (c'est ainsi que l'on nommoit l'enfant qui offroit cet étrange phénomène), la masse organisée puisoit dans le mésocolon, au moyen de vaisseaux propres, le sang nécessaire à son existence; ce sang, chassé par les organes de la circulation dans le corps du fœtus, retournoit ensuite au mésocolon de celui qui lui a si long-temps servi de mère. Enfin le terme marqué par la nature pour l'expulsion étant arrivé, et cette expulsion ne pouvant avoir lieu, le kyste s'est enflammé, l'inflammation s'est étendue à l'instestin, la cloison qui séparoit ces deux cavités a été détruite; le kyste a communiqué dans le colon; du pus et des poils ont été rendus par les selles, et une véritable phthisie abdominale a fait périr le malade. Des dessins faits sur toutes les parties du corps du fœtus, par MM. Cuvier et Jadelot, ne laissent

rien à désirer sur ce fait aussi rare qu'intéressant (1).

Il ne faut point ajouter une trop ferme croyance à tout ce que contiennent d'extraordinaire sur ce sujet les écrivains de l'antiquité, et même ceux des derniers siècles. En lisant les recueils périodiques publiés pendant le dix-septième, et même au commencement du dix-huitième siècle ; tels que les Éphémérides des curieux de la nature, le Journal des savans, etc., on est surpris de la quantité de choses extraordinaires qui s'y trouvent racontées. Dans l'un, c'est une fille venue au monde avec une tête de porc ; dans l'autre, c'est une femme accouchée d'un animal qui ne différoit en rien d'un brochet. Il fut un temps, dit à ce sujet un philosophe, où toute la philosophie consistoit à ne voir dans la nature que des prodiges.

CCXII. *Des enveloppes du fœtus.* On donne le nom d'*arrière-faix* ou de *délivre* aux enveloppes du fœtus, parce qu'elles ne sont expulsées qu'après qu'il est sorti de la matrice, et que l'accouchement n'est terminé qu'après cette expulsion, nommée par les accoucheurs *délivrance.* Le sac ovoïde qui contient le fœtus est formé de deux mem-

---

(1) On trouvera l'histoire de deux faits du même genre, obervés en Angleterre ; elle est consignée dans le recueil intitulé : *Transactions médico-chirurgicales*, tome I.

branes appliquées l'une à l'autre. On nomme *chorion* celle qui, par sa face externe, velue et tomenteuse, adhère à l'intérieur de l'utérus : l'autre membrane, concentrique à la première, moins épaisse qu'elle, et devant être regardée comme l'organe sécrétoire de la liqueur qui remplit l'œuf avec le fœtus, est connue sous le nom d'*amnios*. La troisième enveloppe admise par Hunter, appelée par ce physiologiste membrane caduque (*decidua*), semble être un tissu lanugineux, que présente l'extérieur du chorion lorsqu'on a rompu la multitude des filamens celluleux et vasculaires au moyen desquels l'œuf est attaché à la matrice. Le placenta est-il lui-même autre chose qu'une portion plus épaisse de ce tissu cotonneux dans laquelle les vaisseaux ombilicaux se ramifient? La matrice est aussi plus épaisse dans l'endroit qui corrrespond à ce gâteau spongieux, parce que c'est là que la communication de la mère avec le fœtus est établie. La membrane caduque, véritable *épichorion*, et c'est ainsi que la nomme M. Chaussier, la membrane caduque est le résultat de l'orgasme générateur; elle s'organise à la surface interne de l'utérus, irritée par l'acte d'imprégnation, et sert à unir l'œuf avec l'intérieur de la poche qui doit le contenir; et lors même que cet œuf n'existe point, la membrane caduque ne se développe pas moins à l'intérieur de la matrice. C'est ce que l'on voit manifestement dans les grossesses extra-utérines.

De nouvelles recherches sur le tissu membra-

neux qui fait adhérer l'œuf humain à l'intérieur de la matrice ont démontré à MM. les docteurs Moreau et Velpeau que la caduque de Hunter, appelée *épichorion* par M. le professeur Chaussier, étoit une véritable membrane séreuse, contiguë à elle-même, et adhérant d'une part à l'intérieur de l'utérus; et d'un autre côté à l'extérieur du chorion, enveloppe du fœtus. Ces idées sur le moyen d'union entre le fœtus et la mère, d'après lesquelles l'œuf seroit attaché dans la matrice de la même manière que les viscères dans l'abdomen, paroissent d'autant plus plausibles, qu'outre l'analogie, elles ont en leur faveur plusieurs observations authentiques sur l'existence d'une surface contiguë et humide dans l'épaisseur de la membrane caduque. M. le professeur Désormeaux les a de tous temps enseignées dans ses cours, en faisant la remarque que les belles planches de G. Hunter, sur l'utérus dans l'état de grossesse, expriment parfaitement cette disposition de la membrane caduque, contiguë à elle-même.

La liqueur que sécréte l'*amnios* est un fluide séreux, d'une odeur douce, d'une saveur fade, légèrement troublé par une matière lactescente qu'il tient en suspension, et un peu plus pesant que l'eau distillée, 1,004. Elle est presque entièrement aqueuse, puisque l'albumine, la soude, le muriate de soude et le phosphate de chaux qu'y ont trouvé MM. Buniva et Vauquelin ne s'élè-

vent qu'à 0,012 de la masse totale. Elle verdit la teinture de violettes, et rougit cependant celle de tournesol ; ce qui est vraiment singulier, comme le remarquent les deux observateurs que je viens de citer, et indique la coexistence d'un alkali et d'un acide isolés. Celui-ci est peu abondant, tellement volatil, et si facilement réductible dans l'eau de l'amnios de la femme, qu'on n'a point encore pu l'obtenir séparément, tandis qu'on trouve dans les eaux de l'amnios de la vache un acide particulier, nommé par MM. Buniva et Vauquelin *acide amniotique*. La quantité des eaux de l'amnios est d'autant plus considérable par rapport au fœtus, que celui-ci est plus voisin de l'instant de sa formation : elle est le produit de l'exhalation artérielle qui se fait à l'intérieur de la membrane séreuse. Ses matériaux viennent du sang qu'apportent les vaisseaux de la matrice. Ceci est non-seulement prouvé par l'analogie, mais encore par l'observation des rapports qui existent entre les qualités des eaux de l'amnios et le régime que suit la mère. C'est ainsi qu'elles blanchissoient le cuivre chez une femme qui avoit fait des frictions mercurielles pendant la durée de sa grossesse.

Le sommet de la vessie, dans le fœtus quadrupède, se continue avec un canal dont on trouve un rudiment chez l'homme, et qu'on nomme l'*ouraque*. Ce canal se joint aux vaisseaux du cordon, sort avec eux par l'ombilic, et va se terminer à une poche membraneuse placée entre le chorion

et l'amnios; c'est l'allantoïde toujours existante dans le fœtus des animaux, mais peu marquée dans celui de l'homme. Plusieurs anatomistes disent avoir vu l'ouraque, ordinairement ligamenteux, qui s'élève de la vessie humaine, se terminer à une petite vésicule, que quelques-uns comparent à une graine de melon, tandis que d'autres soutiennent que son volume n'excède point celui d'un grain de chanvre ou de millet. Une vésicule aussi petite, quand elle existe, ne peut certainement servir à aucun usage, l'ouraque formant presque toujours un cordon solide, rarement creusé d'un canal très-étroit dans sa portion la plus voisine du sommet de la vessie. L'existence de ces parties administre une nouvelle preuve de ce que nous avons dit en traitant des usages attribués à la valvule du cæcum; qu'il est dans le corps des animaux des organes qui ne sont d'aucune utilité, et qui n'existent que comme des témoignages du plan auquel la nature s'est assujettie dans la production des êtres, et des gradations qu'elle a constamment suivies en établissant la distinction des espèces (1).

De nouvelles recherches, entreprises et suivies avec autant de patience que de sagacité, ont fait découvrir à M. Dutrochet, l'un des élèves les plus

---

(1) C'est dans la considération plus étendue de ces *rudimens* d'organes que M. Geoffroy de Saint-Hilaire a trouvé les bases de sa *Philosophie anatomique*. Voyez cet ouvrage.

distingués, sortis de l'École de médecine de Paris, que les lois de développement du fœtus des mammifères, et probablement du fœtus humain, sont les mêmes que celles qui, chez les oiseaux et les reptiles, président à la formation de l'embryon et des membranes dont il est enveloppé. D'après ces recherches vérifiées avec soin par M. Cuvier, dans les premiers temps de la formation du nouvel être, la vessie urinaire, développée et sortie de l'abdomen, envelopperoit extérieurement l'amnios, produiroit le chorion et l'allantoïde; et cette poche extérieure finiroit par n'avoir plus de communication avec le reste de l'organe renfermé dans le corps du fœtus, lorsque l'anneau ombilical, venant à se resserrer sur lui-même, étrangle l'ouraque. Ce canal subsiste, converti en ligament, comme pour indiquer ce prolongement primitif de la vessie, et le mode de production des membranes extérieures du fœtus. L'allantoïde n'est, d'après la découverte de M. Dutrochet, que cette portion de la vessie prolongée hors du corps du fœtus enveloppant l'amnios et servant à la nutrition du nouvel être (1).

Il s'en faut bien, au reste, que l'on puisse recevoir comme des vérités palpables et rigoureusement démontrées tout ce que rapportent MM. Cuvier, Dutrochet, Lobstein, Oken, Fleischmann,

---

(1) Recherches sur les enveloppes du fœtus. Mémoires de la Société médicale d'émulation de Paris, tome VIII.

Mekel, Hœchstetter, Emmert, Pander et Bojanus, sur l'œuf humain et les premiers temps de l'embryon. Seulement toutes les probabilités, et même toutes les preuves analogiques se reunissent pour établir la ressemblance de tous les êtres vivans, d'autant plus grande, comme nous l'avons dit il y a bien long-temps (1), qu'on les observe à une époque plus voisine de leur première formation.

CCXIII. *Du terme naturel de la grossesse.* Le fœtus peut se passer de l'influence maternelle, lorsqu'il s'est écoulé un intervalle de sept à huit mois, à compter de l'instant de la conception. Tous les accoucheurs s'accordent pour dire qu'il est *viable* à cette époque, et que, s'il reste deux mois de plus dans l'utérus, c'est pour acquérir plus de force, et résister mieux aux nouvelles impressions qu'il doit éprouver lorsqu'il viendra à la lumière. Lorsque l'œuf se détache avant ce temps de maturité, l'enfant naît mort, ou meurt en naissant. On en a cependant vu survivre dans

---

(1) Dans les Mémoires de la Société médicale d'émulation, année 1799, t. III, p. 176-177, dix ans par conséquent avant la publication de la Philosophie zoologique de M. le professeur Lamark, laquelle a paru en 1809. Ce savant s'est, il est vrai, rendu propre cette idée par les heureux développemens qu'il lui a donnés. Quelque furet scientifique la trouveroit peut-être dans les écrits des anciens, où même dans ceux des modernes. Aussi suis-je bien loin d'attacher une grande importance à l'honneur de la priorité; toutefois, comme le disoit Madame Dacier : *Ma remarque subsiste.*

des accouchemens prématurés, survenus pendant le sixième mois de la grossesse; mais, en général, la vie de l'enfant est d'autant mieux assurée, que l'accouchement se fait à l'époque accoutumée, environ la fin du neuvième mois solaire, ou le milieu du dixième lunaire. On observe que les enfans de sept mois, quelque robustes qu'ils doivent être par la suite, viennent au monde foibles, les yeux fermés, et qu'ils passent dans un état d'extrême débilité et de souffrance les deux mois qu'ils auroient dû rester dans le sein de leur mère: ce qui prouve bien la nécessité d'une gestation prolongée jusqu'à la fin du neuvième mois solaire.

Si le fœtus peut se détacher de sa mère et vivre avant le temps ordinaire, ne peut-il pas également rester plus long-temps, prendre dans l'utérus un accroissement moins rapide, et n'être expulsé que plusieurs jours, plusieurs semaines, et même quelques mois plus tard? et alors, combien n'est-il pas difficile d'assigner un terme précis au delà duquel il ne soit plus permis de croire à la possibilité d'une naissance tardive?

On croit avoir des exemples certains d'enfans nés plus de dix mois après l'acte de la fécondation; et cependant les lois, qui ne peuvent être établies sur des exceptions rares, ne prorogent point jusqu'à cette époque la légitimation des enfans nés après la dissolution civile du mariage.

CCXIV. *De l'accouchement.* Lorsque le fœtus a séjourné assez long-temps dans le sein de sa

mère pour acquérir le degré de force nécessaire à son existence isolée, il s'en sépare, entraînant après lui les parties qui lui servoient d'enveloppes et l'unissoient à l'utérus. C'est à sa sortie de ce viscère que l'on a donné le nom d'*accouchement*. Rien de plus ridicule que ce qu'ont pensé plusieurs auteurs au sujet de ses causes déterminantes. Selon quelques-uns, Fabrice d'Aquapendente, par exemple, c'est le besoin de se rafraîchir par la respiration qui le porte à briser ses membranes; suivant d'autres, il y est déterminé par la nécessité de rendre le méconium; liqueur excrémentitielle qui remplit le conduit intestinal. On a dit encore qu'il y étoit sollicité par le besoin de nourriture, ou bien que l'accouchement dépendoit de la vive réaction des fibres du corps de la matrice, qui, distendues outre mesure vers la fin de la grossesse, reviennent sur elles-mêmes et surmontent la résistance du col aminci et dilaté par degrés. Mais, dans cette dernière hypothèse, la seule qui jouisse encore de quelque faveur, comment une femme dont la matrice a une capacité déterminée n'accouche-t-elle pas à mi-terme, lorsque le part est double; c'est-à-dire, lorsque les deux jumeaux qui avec leurs eaux et leurs membranes remplissent la cavité de l'utérus, lui font éprouver, au milieu de la grossesse, le même degré d'extension que celui qui seroit produit par un seul fœtus parvenu au terme naturel ?

Il est bien vrai que, durant quinze jours, et même

un mois avant l'accouchement, la matrice semble se préparer à l'expulsion du fœtus. C'est au moins ce qu'on peut inférer de la saillie que le toucher du col de la matrice fait quelquefois reconnoître, saillie évidemment produite par la poche des eaux qui s'engage dans l'orifice de l'utérus, lorsque cet organe se contracte, pour s'affaisser et disparoître lorsqu'il tombe dans le relâchement

Il est, pour le produit de la conception, une époque de maturité, c'est-à-dire un terme auquel il peut exister séparé de sa mère. Lorsque cette époque est arrivée, l'œuf qui le renferme se détache de l'utérus par un mécanisme en tout semblable à celui par lequel le pétiole d'un fruit mûr abandonne le rameau auquel ce fruit est suspendu. Alors probablement le fœtus refuse d'admettre le sang que lui apporte la veine ombilicale. Le placenta s'engorge: cette stagnation des sucs s'étend de proche en proche à la matrice et aux parties voisines. Stimulés par leur présence, ces organes entrent en action, la femme ressent des douleurs qui, d'abord vagues, irrégulières, et semblables à des tranchées (*mouches*, ou *fausses douleurs*), changent de caractère, deviennent plus vives, s'accompagnent d'un sentiment de constriction, se dirigent de haut en bas, c'est-a-dire du fond vers le col de la matrice. Alors cette poche contractile, aidée par le diaphragme et par les muscles abdominaux, redouble d'efforts pour se débarrasser. Les douleurs deviennent plus vives et plus

fréquentes; la face est rouge et animée, le pouls plein et rapide; le corps entier paroît partager l'anxiété de la matrice, agitée par les secousses expulsives. La poche des eaux s'engage, en manière de coin, dans l'orifice de l'utérus, dont les bords sont prodigieusement affoiblis; les efforts redoublent, les membranes se déchirent, l'eau de l'amnios s'écoule, la tête de l'enfant s'engage à son tour et franchit l'orifice; les douleurs sont excessives; et le terme barbare de *conquassantes*, sous lequel les accoucheurs les désignent, en exprime toute l'atrocité.

Elles sont surtout intolérables lorsque, le sacrum de la femme étant trop peu concave, les nerfs du plexus crural se trouvent violemment comprimés par la tête du fœtus. Cette partie de son corps se présente presque toujours la première; elle traverse le détroit supérieur du bassin dans une direction oblique, c'est-à-dire l'occiput étant tourné en avant et correspondant à l'une des cavités cotyloïdes, tandis que la face regarde en arrière, placée vis-à-vis l'une des symphyses sacro-iliaques. Elle se présente ainsi au plus grand diamètre de ce passage; mais, en descendant dans le petit bassin, elle exécute un mouvement d'arc de cercle, au moyen duquel elle traverse le détroit inférieur dans le sens de son plus grand diamètre, qui est l'antéro-postérieur. La tête descend à travers le vagin, paroît au-dehors, et se dégage bientôt, suivie par les épaules et les autres parties du corps.

C'est ainsi que la nature, après avoir opéré la fécondation par un acte de plaisir, en chasse le produit au milieu des douleurs.

Pour décrire les phénomènes de l'accouchement, nous avons supposé que l'enfant se présentoit par la tête, l'occiput dirigé en avant, et la face en arrière; c'est aussi le cas le plus ordinaire, puisque, sur douze mille six cent trente-trois enfans nés à l'hospice de la Maternité depuis le 10 décembre 1797 jusqu'au 31 juillet 1806, c'est-à-dire dans l'intervalle d'à peu près dix années, douze mille cent vingt l'ont offert, tandis que, des cinq cent treize restans, soixante-trois sont à la vérité venus par la tête, mais la face tournée en avant; et des autres, cent quatre-vingt-dix-huit se sont présentés par le siége, cent quarante-sept par les pieds, trois par les genoux et dans d'autres positions qui rendoient l'accouchement plus difficile (1).

CCXV. Les conduits qui transmettent le fœtus au-dehors sont trop étroits, dans l'état ordinaire, pour que sa sortie puisse s'effectuer sans déchiremens, si, comme nous allons le voir, la nature n'avoit tout disposé pour rendre l'accouchement facile. En effet, si d'un côté elle a formé le crâne du fœtus de pièces flexibles, séparées par des intervalles non ossifiés et membraneux, qui permettent aux os d'anticiper les uns sur les autres, et à

(1) *Voyez* l'Art des Accouchemens, par J.-L. Baudelocque, quatrième édition, à la fin du second volume.

la tête entière de se réduire et de se filer, en quelque sorte, à travers les détroits du bassin de la femme, elle a assemblé les os de cette dernière partie de manière que leurs articulations se relâchent visiblement lorsque le terme de la grossesse approche. Pendant la durée de cet état, c'est vers le bassin et les organes qu'il renferme que se dirigent de toutes parts les humeurs de la mère : les symphyses ligamento-cartilagineuses du pubis, du sacrum et du coccix, abreuvées de sucs, gonflées par leur abord, unissent moins solidement les os entre lesquels elles sont placées. Ainsi ramollies et tuméfiées, elles ne les écartent pas à la manière d'un coin pour agrandir tous les diamètres; mais elles rendent leur diduction plus facile par la tête de l'enfant, qui fait effort contre eux en traversant les détroits du bassin. C'est sur le relâchement plus ou moins marqué des symphyses pelviennes, à l'époque de l'accouchement, qu'est fondée l'indication de la section de celle du pubis, opérée avec succès par Sigault et le professeur Alphonse Leroy. L'induction analogique, comme l'observe judicieusement Thouret, devoit naturellement conduire à cette opération, de la même manière qu'on avoit été porté à l'invention et à l'emploi du forceps par la considération des moyens qu'avoit employés la nature pour diminuer le volume du crâne pendant l'accouchement; enfin l'enduit caseux dont est couvert le corps du fœtus favorise sa sortie, en rendant le glissement plus facile.

Les nombreux détracteurs de l'opération de la symphyse ont nié avec obstination ce ramollissement des symphyses chez les femmes enceintes; et feu le professeur Baudelocque, partisan déclaré de l'opération césarienne, s'est constamment refusé à l'admettre. Dans le temps où j'enseignois l'anatomie à l'amphithéâtre de l'hôpital de la Charité, je lui montrai inutilement plusieurs exemples du ramollissement des symphyses, tirés des cadavres de femmes mortes en couches; il fut impossible de convaincre son incrédulité : c'étoit, disoit-il, des cas morbifiques. Cependant il est aujourd'hui généralement reconnu que les symphyses du bassin sont relâchées et mobiles chez toutes les femmes vers la fin de la grossesse, et même quelquefois après l'accouchement. Ce ramollissement est moins utile chez la femme dont le bassin est bien conformé que chez les femelles de certains animaux, dont les dimensions sont si peu proportionnées au volume du fœtus, que l'accouchement ne peut avoir lieu sans que les os du bassin n'éprouvent un écartement considérable : telle est la femelle du lapin et celle du cochon d'Inde ou cabiais, dont les os se disjoignent et deviennent très-mobiles au moment de l'accouchement. Les femmes qui accouchent en peu d'instans, et avec beaucoup de facilité, éprouvent, vers le dernier temps de la grossesse, un sentiment douloureux dans l'articulation des pubis. Le doigt, porté sur cette région du corps, sent distincte-

ment que l'espace qui sépare les épines des pubis est augmenté, et qu'en même temps le fibro-cartilage est dans un état manifeste de ramollissement et de tuméfaction.

La prévoyance de la nature ne s'est point bornée à rendre libre et facile le jeu des pièces osseuses du crâne des fœtus et du bassin de la mère; elle a étendu ses soins aux parties molles de celle-ci, abreuvées de mucosités qui relâchent leur tissu plusieurs jours avant l'accouchement, et tellement disposées, comme nous l'avons vu (CXCIX), qu'elles peuvent, sans tiraillemens, sans rupture, et par le simple dédoublement de leur replis, se prêter à un élargissement considérable. Comme l'expulsion du placenta et des membranes ne suit pas immédiatement la sortie du fœtus, on est dans l'usage de les séparer en coupant le cordon assez près de l'ombilic. Il est inutile de lier ce cordon du côté de la mère; toute communication est interceptée entre le placenta et la matrice, de façon qu'il ne peut couler par-là que le sang contenu dans l'arrière-faix. Il n'en est pas de même du côté du fœtus, quoique les changemens qui surviennent dans la circulation au moment où la poitrine se dilate, et permet à l'air de gonfler le tissu pulmonaire, détournent le sang des vaisseaux ombilicaux : cependant ces mutations, dans le mouvement des humeurs, pourroient ne s'opérer que graduellement à cause de la foiblesse du nouveau-né; et il est toujours prudent de prévenir

par la ligature une hémorragie qui l'affoibliroit encore davantage.

Il est bien rare, et toujours dangereux que l'œuf humain se détache tout à la fois, c'est-à-dire que le fœtus soit chassé au-dehors avec ses eaux et ses membranes; la sortie de celles-ci n'arrive naturellement qu'un quart d'heure, une demi-heure, une heure, ou même plus tard, après la sortie du fœtus. Le placenta se détache du corps de la matrice, revenue sur elle-même à la suite des grands efforts de contraction nécessaires à l'expulsion du fœtus. Cette séparation paroît être postérieure à la sortie de celui-ci; car ce seroit vainement qu'on essaieroit de retirer le placenta aussitôt après, en exerçant des tractions sur le cordon ombilical; on courroit risque de rompre le cordon, ou même de produire un renversement de l'utérus. Cependant la matrice, fatiguée de la présence d'un corps qui lui est devenu étranger, entre en action; de nouvelles douleurs indiquent le moment où l'on peut accomplir l'entière délivrance. La matrice s'étant complétement vidée, sa cavité s'efface par le rapprochement de ses parois; l'organe se concentre derrière les pubis, son col se resserre. Ses parois, gorgées de sucs, sont encore plus épaisses que dans l'état naturel; mais elles se dégorgent peu à peu par l'écoulement des lochies, et reviennent à leur épaisseur accoutumée.

Lorsque l'accouchement est terminé, la matrice s'endort en quelque manière, et se repose d'un

travail pénible. Les humeurs cessent de se diriger sur cet organe, vers lequel aucune irritation ne les appelle, pour se porter vers les glandes mammaires, et fournir à la sécrétion de la liqueur qui doit alimenter le nouvel individu.

CCXVI. *Des jumeaux.* Quoique le part soit le plus souvent simple dans l'espèce humaine, c'est-à-dire que chaque acouchement ne produise qu'un individu, il n'est pas rare de voir une femme donner naissance à deux enfans à la fois : on a même calculé que la naissance de ces *jumeaux* étoit aux autres dans la proportion d'un à quatre-vingts. Bien plus on possède des exemples de femmes qui ont fait jusqu'à trois enfans. Haller estime que le nombre de ces dernières est à celui des femmes dont la gestation n'a qu'un produit comme un est à sept mille. Celui des quadrijumeaux est moindre encore, et si les trijumeaux jouissent rarement d'une longue vie, ceux-ci, qui à leur naissance ont le volume d'un embryon de cinq mois, ne sont point viables, et aucun d'eux n'a vécu : on ne possède qu'un ou deux exemples d'un quintuple accouchement. Haller exagère donc visiblement lorsqu'il dit que ces cas sont le millionième des cas ordinaires. Je ne parle point de celles qui en ont mis au monde un bien plus grand nombre, parce que les observations qui le témoignent sont dépourvues d'authenticité. On sait que, dans les cas d'existence de jumeaux, chacun d'eux a son cordon ombilical, aboutissant tantôt à un placenta

séparé, d'autres fois à un placenta unique. Un même chorion les enveloppe; mais chacun d'eux a son amnios distinct, aussi-bien que les eaux dans lesquelles il est plongé. Il seroit curieux d'observer si, dans une femme qui a fait deux jumeaux, l'on trouveroit, comme l'exemple des animaux doit le faire présumer, deux cicatricules, soit qu'elles existassent sur le même ovaire, soit que chacun d'eux en offrît une. Les jumeaux ont ordinairement une grande ressemblance de mœurs, de traits et de caractère.

La multiplicité des fœtus dans la même grossesse tient à ce que quelques femmes ont à la fois plusieurs vésicules prêtes à se détacher des ovaires, mûres par conséquent pour la fécondation. Cette multiplicité sert peu à la multiplication de l'espèce, car les jumeaux sont en général moins forts, moins robustes, moins aptes à se reproduire; ils épuisent d'ailleurs les forces de la mère, et leur naissance lui est souvent funeste. Le nombre des enfans auxquels la même femme peut donner le jour, si elle utilisoit tout le temps qui s'écoule depuis la manifestation de la puberté jusqu'à la cessation des règles, seroit bien plus considérable qu'il ne l'est le plus communément. On en a vu néanmoins qui comptoient vingt-quatre, trente, trente-neuf, et même cinquante-trois enfans. Une femme, qui mourut dans l'Amérique septentrionale, avoit eu cinq cents fils et petits-fils, dont deux cent cinq lui survécurent.

Il est aujourd'hui constant qu'à de légères exceptions près, le nombre des petits garçons qui viennent au monde surpasse en général celui des petites filles; l'excédant est, dans quelques pays, porté à un vingt-deuxième, un quatorzième, un douzième, quelquefois même, mais très-rarement, jusqu'à un tiers. Dans tous les pays de la terre, la polygamie est donc une institution directement opposée au but de la nature, et à la multiplication de l'espèce; ce que l'expérience prouve d'une façon incontestable, par la dépopulation des pays où elle est établie. Les garçons, plus nombreux que les filles, dans le premier âge, appelés dans les âges suivans à supporter les périls de la guerre, les dangers des navigations, à se livrer aux travaux pénibles, à mener une vie plus laborieuse, plus agitée, meurent en plus grand nombre; l'équilibre est bientôt rétabli, et la portion la moins nombreuse de l'espèce humaine, prise au berceau, en forme près des deux tiers à l'époque de la vieillesse, puisqu'on voit constamment plus de femmes que d'hommes parvenir à un âge très-avancé.

CCXVII. *Des superfétations.* On doit retrancher du nombre des superfétations, pour les reporter parmi les conceptions jumelles, les cas de fœtus venus au monde avec des degrés de développement inégaux. Ainsi, de ce que, de deux jumeaux, l'un est un fœtus parfaitement à terme, tandis que l'autre est un embryon dont le volume n'indique qu'un mois d'existence, il ne s'ensuit pas que leur

conception ait eu lieu à des époques éloignées et différentes; mais seulement que, par une cause quelconque, l'un des germes n'a pu s'accroître et se développer.

La question des superfétations se réduit à savoir si une femme qui n'a qu'un seul utérus peut concevoir deux mois après une copulation féconde. Haller pense que le col de la matrice reste toujours ouvert au passage de la semence; mais comment celle-ci pourroit-elle se frayer un passage jusqu'aux ovaires, à travers les adhérences du chorion à l'utérus? La chose paroît plus facile dans les cas où les deux conceptions sont séparées par un court intervalle. C'est ainsi que cette Américaine dont parle Buffon, et qui, dans la même matinée, vit son mari et son esclave nègre, put mettre au jour deux enfans de diverses couleurs. C'est de cette manière que, de deux jumeaux, l'un est quelquefois, par les traits de son visage, le témoignage vivant d'un adultère.

On ne peut point appeler jumeaux deux enfans venus au monde à quelques mois de distance l'un de l'autre, quoiqu'ils aient existé ensemble pendant un certain temps dans le sein de leur mère. La possibilité de ces superfétations est bien prouvée: on les attribue à l'existence des cloisons qui partagent quelquefois la matrice en deux cavités; seulement parce que cette disposition explique jusqu'à un certain point comment deux conceptions peuvent avoir lieu à quelque distance l'une

de l'autre ; car on n'a jamais constaté par l'inspection cadavérique que les femmes, qui ont offert l'exemple des superfétations eussent un double utérus.

CCXVIII. *Allaitement.* Rien n'est plus généralement connu en physiologie que l'étroite sympathie qui unit l'utérus aux mamelles; connexion intime en vertu de laquelle ces deux organes entrent en exercice à la même époque de la vie, se développent ensemble, et cessent en même temps leurs fonctions, lorsque la femme devient incapable de concourir à la reproduction de l'espèce. Nous n'essaierons point d'expliquer cette sympathie par l'influence nerveuse, ni par l'anastomose des artères épigastriques avec les mammaires internes, communication qui n'existe point constamment entre ces vaisseaux (car fréquemment ils se terminent, avant de se réunir, dans l'épaisseur des muscles droits de l'abdomen), et qui, lors même qu'elle auroit lieu d'une façon aussi marquée qu'on le voit sur certains sujets, ne pourroit être apportée en preuve, puisque la matrice et les mamelles ne reçoivent point ou reçoivent seulement de très-petits rameaux des mammaires et des épigastriques. Les mamelles augmentent de volume pendant la grossesse ; mais jamais elles ne sont plus gonflées qu'après l'accouchement.

L'enfant nouveau-né, rapproché de ces organes, applique sa bouche au mamelon qui les surmonte, et, retirant sa langue en même temps qu'avec ses

lèvres il en embrasse exactement le contour, il attire à lui le liquide, dont l'écoulement est facilité par le redressement des conduits mammaires. Ces canaux, au nombre de douze à quinze, non-seulement se déploient lorsque le mamelon, qui en est principalement formé, s'allonge par les tiraillemens que l'enfant excerce, mais encore, excités par ses attouchemens, ils entrent dans une véritable érection, se contractent et dardent au loin le liquide. Cette excrétion, semblable à celle des autres glandes, est favorisée par les attouchemens et les secousses que les petites mains du nourrisson exercent sur le sein de la nourrice. Ces douces compressions ont bien moins pour usage d'exprimer mécaniquement les sucs laiteux, que de monter l'organe au ton convenable à leur excrétion.

L'irritation qu'exerce l'enfant sur le mamelon est la cause la plus puissante de la fluxion laiteuse sur les mamelles ; cette irritation, ou toute autre de la même espèce, suffit pour provoquer la sécrétion du lait hors les temps marqués par la nature. C'est ainsi que des vierges ont pu allaiter l'enfant d'une autre mère ; que des petites filles qui n'avoient pas encore atteint l'âge de la puberté ont offert la secrétion du lait assez bien établie pour fournir une certaine quantité de cette liqueur. On a vu des hommes chez lesquels un chatouillement long-temps continué avoit tellement déterminé l'abord des humeurs sur les mamelles que celles-ci laissoient suinter un liquide

blanc, laiteux, sucré, et peu différent du lait de la femme. La succion qu'exerce le nouveau-né est nécessaire pour entretenir l'abord du lait vers les mamelles. Il cesse de s'y diriger lorsque l'enfant est confié aux soins d'une nourrice étrangère; les mamelles, d'abord gonflées, s'affaissent bientôt, surtout si l'on a la précaution de rappeler les humeurs vers les parties inférieures par l'administration répétée de doux minoratifs.

L'érection des mamelles par les chatouillemens exercés sur le mamelon, leur action spasmodique et comme convulsive, qui suit ce genre d'excitation, peuvent être portées au point qu'elles lancent le liquide par jets à une certaine distance. Pendant que son excrétion dure, les femmes éprouvent dans les seins une sensation qui n'est pas sans volupté: ces parties sont tendues et gonflées; elles sentent, disent-elles, le lait monter; plusieurs éprouvent des tiraillemens qui s'étendent aux creux des aisselles, aux bras et à la poitrine. Toute la masse cellulaire qui environne les mamelles et s'étend aux parties voisines participe à leur activité.

Les mamelles sont elles-mêmes, en grande partie, formées par le tissu cellulaire; une couche graisseuse et lymphatique, plus ou moins considérable, recouvre la glande partagée en plusieurs lobes, et l'ensevelit, en quelque sorte, dans son épaisseur. Elles reçoivent assez de nerfs, mais infiniment peu de vaisseaux sanguins, si on les compare à leur volume.

Leur structure paroît surtout lymphatique; les vaisseaux de cette espèce, après s'être ramifiés dans les glandes voisines, et principalement dans celles qui remplissent le creux de l'aisselle, viennent se rendre aux mamelles, où leur proportion, comparée à celle des vaisseaux sanguins, est comme 8 à 1. Ces vaisseaux lymphatiques, qui, en quantité réellement prodigieuse, entrent dans la composition des mamelles, augmentent beaucoup de calibre chez les femmes qui allaitent, et en les injectant dans cet état, on a pu s'assurer que plusieurs d'entre eux se réunissoient pour former des troncs plus gros, lesquels, se dirigeant vers le mamelon, alloient former ce qu'on nomme les *tuyaux lactifères*. Si les vaisseaux lymphatiques se continuent immédiatement avec les conduits excréteurs des mamelles, on est porté à conclure que c'est par cet ordre de vaisseaux que sont apportés les matériaux de la liqueur qu'elles séparent, surtout si l'on fait attention combien est petit le nombre des artérioles qui se distribuent dans leur tissu, et quelle disproportion existe entre le calibre de ces petits vaisseaux et la quantité de lait que les mamelles peuvent fournir. Prétendre que les vaisseaux lymphatiques apportent aux mamelles les matériaux de la sécrétion laiteuse, ce n'est pas renverser les lois de la circulation lymphatique; ceux qui connoissent ces lois savent que le cours de la lymphe, quoique généralement établi de la circonférence au centre, est naturel-

lement sujet à une multitude d'aberrations ou de déviations favorisées par les innombrables anastomoses de ses vaisseaux.

CCXIX. La structure granulée n'est point aussi apparente dans les mamelles que dans les autres organes glandulaires; aussi ont-elles plus de ressemblances avec les glandes lymphatiques qu'avec les conglomérées. Le lait qui s'y forme a de tout temps été regardé comme très-analogue au chyle dont il a la blancheur, l'odeur suave et la saveur sucrée. Il est, avec lui, la liqueur animale la moins animalisée (CHAPTAL), la plus douce, celle que l'action organique a le moins dénaturée, et qui conserve le plus les qualités tranchantes des alimens qu'a pris la nourrice.

Ne sait-on pas que la médecine des enfans à la mamelle consiste le plus souvent à administrer aux nourrices les préparations qui doivent les rendre à la santé; qu'ainsi le lait acquiert les qualités purgatives, et agit de cette manière sur les intestins du nourrisson, quand on a purgé la femme qui l'allaite, etc.? Le chyle n'est blanc et opaque que dans les animaux qui ont des mamelles, et qui allaitent leurs petits; dans les autres, il est aussi transparent que la lymphe. (CUVIER.)

Enfin, si les artères apportoient aux mamelles les matériaux du lait, ces vaisseaux devroient augmenter de calibre, lorsqu'elles acquièrent un volume double, souvent triple, et quelquefois quadruple de leur grosseur naturelle, de la même

manière que, dans les anciens cancers ulcérés, et autres affections semblables, où l'afflux du sang étant habituellement plus considérable dans une partie, le calibre de ses vaisseaux doit s'y proportionner. Cependant rien de cela n'arrive; quelque énormes que deviennent les mamelles par l'affluence des sucs laiteux, leurs artères conservent leur ténuité presque capillaire, comme je m'en suis assuré par l'injection sur une femme âgée de vingt-neuf ans, morte au deuxième mois de l'allaitement, dont le sein étoit remarquable par son volume, ainsi que par la quantité de lait qu'il pouvoit fournir.

Nonobstant toutes ces raisons, qui m'ont fait partager long-temps l'opinion de ceux qui considèrent le lait comme un extrait immédiat de chyle, j'avoue qu'on ne peut la considérer que comme une hypothèse appuyée d'un certain degré de probabilité. L'impossibilité de démontrer anatomiquement les rameaux qui se porteroient du mésentère aux mamelles sans s'aboucher avec le canal thorachique, donne plus de vraisemblance à l'opinion généralement admise, et suivant laquelle le lait, comme toutes les humeurs sécrétées, à l'exception de la bile, provient du sang apporté par les artères. Le passage des injections des artères dans les conduits lactifères, et réciproquement de ceux-ci dans les vaisseaux artériels; le sang pur que fournit une mamelle épuisée, quand le nourrisson continue à la sucer, l'analogie

enfin, ne permettent point de douter de la véritable source du fluide sécrété par les mamelles. « *Quare nihil viis egemus quæ, legitimo lymphæ* « *itineri contrariæ, à ductu chylifero ad mammas* « *lac darent.* (1) »

Le lait n'est point en tout semblable au chyle, quoiqu'il puisse être regardé comme un extrait des alimens (2) altéré dans la route qu'il a parcourue pour arriver jusqu'à la mamelle par les glandes qu'il a rencontrées sur son passage, et surtout par l'action propre de cet organe. Cette action est si marquée, que, comme Bordeu l'observe, « il y a « des femmes qui ne paroissent presque pas avoir « de lait dans leurs mamelles, qui sont flasques « et vides; mis dès que l'enfant les excite, elles se « *bouffissent*, et le lait vient de lui-même. » On sait encore, et le même auteur l'a bien fait sentir, que la femme, la vache, et les femelles des autres animaux se laissent plus volontiers téter par tel nourrisson qui sait émouvoir leur sensibilité, agacer convenablement le mamelon, tandis qu'elles retiennent le lait lorsqu'il ne sait pas leur procu-

---

(1) Haller, *Elementa physiologiæ*, t. VII, lib. 28. Bien que depuis environ vingt années l'auteur soit revenu à l'opinion commune touchant la sécrétion du lait, personne n'écrit aujourd'hui sur cette matière sans se croire obligé de réfuter une théorie depuis long-temps abandonnée.

(2) « *Lac utilis alimenti est superfluum.* » Gal. *de Usu part.* lib VII, cap. 22.

rer la sensation dans laquelle elles semblent se complaire. On croit dans certains pays que les serpens savent très-bien chatouiller le pis des vaches, et que ces animaux, flattés par cet excitement, se laissent sucer avec complaisance par le reptile.

CCXX. *Propriétés physiques du lait; nature chimique de cette humeur.* Sa quantité est généralement relative à celle des alimens, à leurs qualités plus ou moins nutritives, à leur nature à la fois humide et farineuse. Quoiqu'il fasse du tiers à la moitié du poids des alimens que prend la nourrice, il peut excéder, ou rester en-deça de cette proportion: sa pesanteur est, même dans la femme dont le lait est le plus léger, supérieure à celle de l'eau distillée : elle est toujours proportionnée à sa consistance. Celle-ci, peu cónsidérable dans la femme, va toujours en augmentant dans la vache, la chèvre, la jument, l'ânesse et la brebis. Sa fluidité tient le milieu entre celle des liquides aqueux et huileux; sa couleur, son odeur, sa saveur, ont quelque chose qui n'appartient qu'à lui, et qui le fait aisément reconnoître ; enfin il n'est point exactement le même aux diverses époques de la même traite. C'est ce qu'ont prouvé MM. Deyeux et Parmentier dans leur ouvrage sur le lait, livre plein d'observations précieuses, et qui peut être donné comme l'histoire complète de cette liqueur animale. Ils ont vu que le lait sort d'abord séreux du pis de la vache, que sa consistance augmente

graduellement, et qu'enfin le lait le plus gras est celui qui sort à la fin de la traite; comme si le liquide contenu dans les mamelles obéissoit aux lois de la pesanteur.

Abandonné à lui-même, exposé dans un vase, à l'air libre, le lait, comme le sang, se décompose et se sépare en trois parties : le *sérum*, la partie *caseuse*, et la partie grasse ou *butireuse*. Cette dernière, plus légère que les autres, est toujours placée à la surface du vase, et sa proportion relative dépend non-seulement de la bonté du lait, mais encore de l'étendue des surfaces par lesquelles il est en contact avec l'air; ce qui prouve, comme Fourcroy l'a le premier fait apercevoir, que l'oxigène atmosphérique n'est pas sans influence dans sa séparation. La partie caseuse, spontanément concrescible, paroît être une albumine riche en oxigène. MM. Parmentier et Deyeux la regardent comme la cause de la coloration du lait et de ses propriétés les plus caractéristiques. Enfin le sérum, qui forme à lui seul la plus grande partie de ce liquide, contient, outre un acide particulier qui s'y développe quand on l'abandonne à lui-même (*acide lactique*), un corps sucré que l'on en extrait par l'évaporation, et qui, cristallisé en parallélipipèdes rhomboïdaux, forme le sucre du lait, plus ou moins pur, suivant les soins qu'on apporte à sa préparation. Ce sucre de lait fournit, comme Scheele l'a vu le premier, en cherchant à le changer en acide oxalique par le

nitrique, un acide particulier, blanc, pulvérulent et peu dissoluble, auquel il a donné le nom de *sacchlactique*. Le lait peut être considéré comme un des liquides animaux les plus composés, dont les qualités sont très-variables, et dont les parties n'ont entre elles qu'une très-foible union; de sorte qu'il se décompose spontanément et avec la plus grande facilité. Cette espèce d'émulsion contient assez peu d'azote, de manière qu'elle conserve encore le caractère végétal. L'hydrogène, le carbone et l'oxigène y prédominent; enfin on y trouve plusieurs sels, entre autres, le muriate de soude, le muriate de potasse et le phosphate de chaux.

La présence de ces deux derniers donne lieu aux considérations suivantes. Le muriate de potasse, comme l'a observé Rouelle, n'existe point dans le sang; ce ne seroit donc pas ce liquide qui apporteroit aux mamelles les matériaux du lait, dans lequel ce sel est plus abondant que le muriate de soude. Ces sels de potasse se trouvent au contraire en grande proportion dans le chyle extrait des alimens végétaux: ce qui porteroit à croire que le lait est fourni par le système des vaisseaux lymphatiques. Le phosphate calcaire, qui se trouve en moins vers les urines des nourrices, et se porte tout entier dans les mamelles, étoit indispensable dans la liqueur qui alimente le nouvel individu, pendant le temps où tous les os se durcissent et toutes les parties se solidifient.

Si maintenant nous voulons remonter aux causes

qui rendent l'allaitement nécessaire, et soumettent l'enfant nouveau-né à ce mode particulier de nutrition, nous les trouvons dans la foiblesse générale de ses organes. Ceux de la digestion n'eussent pu extraire des alimens leur partie nutritive, ces substances n'ayant pas subi la trituration préliminaire que le défaut de dents et la débilité des organes masticateurs rendent impossible. Il falloit donc que la mère fût chargée de ce premier travail, et qu'elle lui transmît l'aliment tout digéré (1). Néanmoins on ne doit point croire que le lait passe sans altération dans les vaisseaux de l'enfant; il le digère à sa manière; il en retire, en peu de temps et sans effort, une grande proportion de parties nutritives nécessaires à la rapidité de son accroissement.

Les liens qui unissent l'enfant à sa mère sont donc loin d'être rompus au moment de la naissance; leurs rapports, pour être moins intimes, n'en sont pas moins indispensables. Avant qu'il vînt à la lumière, sa puissance vitale étoit si bornée, qu'il devoit recevoir une liqueur tout animalisée, toute disposée à se prêter à l'action des forces nutritives et assimilatrices. Lorsqu'il a vu le jour, ses forces se sont accrues; il peut être chargé d'une plus grande part dans le travail; il lui suffit que l'aliment ait subi la première élabo-

(1) « *Lac est cibus exactè confectus.* » Galenus, *de Usu part.* lib. VII, cap. 22.

ration qui lui fait éprouver l'appareil digestif; mais ce n'est pas seulement pour la préparation de sa nourriture que l'enfant nouvean-né a besoin des secours de sa mère; ses poumons, délicats et imparfaitement développés, n'oxident point assez le sang qui les traverse; la chaleur animale seroit au-dessous de ce qu'exigent les besoins de la vie, si la mère ne suppléoit à ce défaut en lui transmettant de sa propre chaleur. Elle le presse doucement contre son sein, le réchauffe de son haleine, et, par cette sorte d'incubation maternelle, elle lui continue l'influence calorifique à laquelle elle le soumettoit pleinement pendant le temps qu'il faisoit encore partie d'elle-même. En outre, elle sent pour lui, l'éloigne de tous les dangers, devine ses besoins, se prête à son langage; et cette communication morale, si touchante, qui s'établit entre eux, supplée aux liens relâchés, et non pas détruits, de la communication physique. L'enfant ne se détache donc que par degrés de celle dont il tient le jour, puisque ce n'est qu'à mesure qu'il avance en âge qu'il acquiert les moyens de vivre dans l'indépendance.

L'abord du lait vers les mamelles peut être empêché par l'irritation de l'utérus. Si l'accouchement a été laborieux et difficile, que les parties de la femme aient souffert des lésions plus ou moins graves, l'irritation qu'elles éprouvent empêche les humeurs de se diriger vers les mamelles. Aussi voit-on ces organes s'affaisser quand la fièvre puerpérale

se développe; non point que le lait rentre dans la masse des humeurs et devienne la cause de la maladie, mais parce que l'inflammation de l'utérus empêche les humeurs de suivre leur direction naturelle.

Pendant les premiers jours qui suivent l'accouchement, les parois de la matrice se dégorgent par un flux d'abord sanguinolent, puis roussâtre; et enfin muqueux et blanchâtre, auquel on donne le nom de *lochies*.

CCXXI. L'air ne dilate point toutes les parties du poumon dans les premières inspirations que fait l'enfant après sa naissance. Fréquemment, quelques lobes plus durs, plus compactes, admettent plus tard ce fluide, quelquefois même refusent absolument de s'en laisser pénétrer. Un enfant mourut au vingtième jour : le professeur Boyer fut appelé pour en faire l'ouverture. L'examen des poumons lui fit voir que la partie postérieure de ces organes avoit conservé toute la dureté, toute la compacité qu'elle présente dans le fœtus. La partie antérieure seule étoit gonflée, aérienne, crépitante et plus légère; elle surnageoit à l'eau dans laquelle on la plongeoit. On voulut voir si la structure du cœur était relative à cette différence qui tenoit à la foiblesse des puissances respiratoires. On trouva le trou de Botal conservé de manière que le sang pouvoit passer des cavités droites du cœur dans ses cavités gauches, sans avoir besoin de traverser le tissu pulmonaire. L'enfant

avoit passé dans un état d'abattement et de langueur continuelle tout le temps de sa courte existence : sa peau étoit tantôt pâle, d'autres fois violette. On le réchauffoit difficilement.

L'enfant de madame L..... mourut au neuvième jour de sa naissance; elle avait offert les mêmes phénomènes. Je fis l'ouverture de la poitrine; je trouvai le sommet des deux poumons dur et compacte; le trou de Botal s'étoit parfaitement conservé. Cette ouverture ne se ferme souvent que d'une manière imparfaite, en sorte qu'il reste toujours à la partie supérieure de la fosse ovale un pertuis plus ou moins considérable, par lequel une petite quantité de sang veineux pourroit passer de l'oreillette droite dans la gauche, si ces deux cavités ne se contractoient pas simultanément, et si le liquide qui les remplit n'opposoit pas de chaque côté une égale résistance. On possède plusieurs observations d'individus chez lesquels le trou de Botal s'étoit conservé, et qui néanmoins ne sont morts qu'à un âge assez avancé. Chez eux, le sang, coulant dans les deux oreillettes, se faisoit mutuellement équilibre; en sorte que la valvule de Botal n'étoit point abaissée par le sang du côté de l'oreillette gauche; mais dans plusieurs autres individus la communication étant largement établie entre les oreillettes, ou même entre les deux ventricules, la peau étoit bleuâtre et livide, le corps froid, toutes les facultés physiques et morales foibles et engourdies. Il seroit intéres-

sant de constater par l'ouverture des cadavres si les plongeurs les plus habiles, qui peuvent rester le plus long-temps sous les eaux sans venir respirer à leur surface, n'ont pas le trou de Botal imparfaitement fermé, ou s'il existe chez eux quelque ouverture de communication entre les ventricules. La chose paroît peu vraisemblable : ces vices de conformation sont reconnoissables à des signes extérieurs que ne présentent jamais les hommes en général forts et robustes qui s'adonnent au métier pénible de plonger et de demeurer long-temps sous les eaux (1).

---

(1) De la cyanose, ou *maladie bleue*, Recherches analytiques, par M. Gintrac; thèse inaugurale, présentée à la Faculté de médecine de Paris, le 18 août 1814. L'auteur de ce travail très bien fait, et en tout digne de l'école célèbre à laquelle il a été présenté, a recueilli quarante observations de cyanoses, la plupart avec ouverture des cadavres.

CHAPITRE XI.

Contenant l'histoire des Ages, celle des Tempéramens et des Variétés de l'espèce humaine, de la Mort et de la Putréfaction.

CCXXII. *Enfance.* L'épiderme du nouveau-né s'épaissit, le rouge de sa peau devient moins vif, les rides s'effacent, le duvet cotonneux qui couvroit son visage tombe et disparoît, ses fesses se prononcent et cachent bientôt l'ouverture du rectum. Pendant les premiers mois de sa vie, il semble n'avoir besoin que de nourriture et de sommeil. Cependant son entendement commence à se former, il regarde fixement les objets, et cherche à prendre connoissance de tous les corps qui l'entourent. D'abord, borné aux sensations pénibles qu'il exprime par des pleurs presque continuels, son existence devient moins douloureuse à mesure qu'il s'accoutume aux impressions que les choses extérieures exercent sur ses organes frêles et délicats. Vers le milieu du second mois, il devient accessible aux sentimens agréables. S'il les éprouve avant cette époque, au moins n'est-ce qu'alors qu'il commence à les exprimer par le rire (1).

(1) *At Hercules risus præcox ille et celerrimus, ante quadragesimum diem nulli datur.* (Plin. Hist. nat. Præf. ad lib. viii.)

CCXXIII. *Dentition.* Vers la fin du septième mois (1), les dents incisives moyennes de la mâchoire inférieure percent le tissu des gencives. Peu de temps après, les incisives correspondantes de la mâchoire supérieure paroissent; puis les incisives latérales de la mâchoire inférieure et celles de la supérieure. Les petites molaires succèdent aux incisives, laissant entre elles et ces dernières un espace que rempliront plus tard les canines ou laniaires, dont l'éruption est généralement plus tardive et plus laborieuse. Ces premières petites mo-

---

(1) Il seroit bien difficile de dire pourquoi une fièvre tierce se termine fréquemment d'elle-même lorsqu'elle est arrivée à son septième accès, tandis qu'une fièvre continue se juge par des évacuations critiques, en sept, en quatorze ou en vingt-un jours; que l'accouchement arrive au terme de neuf mois; que la première dentition commence à sept mois; la seconde à sept ans; que la puberté se manifeste vers la quatorzième année, et que la menstruation se répète à des époques déterminées. La nature paroît s'assujettir, dans tous ses actes, à certaines périodes que l'observation peut fixer, sans qu'il soit possible de remonter à la cause de ces phénomènes, si faciles à constater. De ce que leur manifestation est corrélative à certains termes numériques, on ne doit pas, à l'exemple de Pythagore, ajouter foi à la puissance des nombres, et croire que le nombre trois, et les nombres sept et neuf, dont il est le générateur, asservissent toute la nature à leur suprême influence. On trouve des vestiges de cette ancienne erreur dans toutes les sciences, dans toutes les religions, et même dans celles qui se partagent encore le culte et le respect des nations les plus éclairées.

laires sont plus grosses que les dents correspondantes de la seconde dentition. Quand ces vingt dents sont sorties, la première dentition est achevée; la vie des enfans est plus assurée: elle étoit auparavant bien incertaine, puisque les calculs sur les probabilités de la durée de la vie humaine prouvent que le tiers des enfans qui naissent à une époque donnée meurt avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois mois. Les mouvemens convulsifs, les diarrhées séreuses sont les accidens les plus funestes dont s'accompagne la dentition difficile. A ces vingt dents s'ajoutent deux nouvelles molaires à chaque mâchoire, lorsque l'enfant est parvenu à la fin de sa quatrième année. Ces dernières formeront dans la suite les premières grosses molaires. Elles diffèrent des précédentes en ce qu'elles doivent rester toute la vie, au lieu que les dents primitives ou de lait tombent à sept ans, dans l'ordre suivant lequel elles sont sorties des mâchoires, et sont remplacées par de nouvelles dents mieux formées, plus grosses, à l'exception cependant des petites molaires de lait toujours plus grosses que celles de remplacement, et dont les racines sont plus longues et mieux développées. Vers la neuvième année, deux nouvelles grosses molaires naissent au delà des premières. L'enfant a alors vingt-huit dents; la dentition est complète, quoique de dix-huit à trente ans, et quelquefois beaucoup plus tard, les dents tardives ou de sagesse, au nombre de deux à chaque mâchoire, se mon-

trent à la partie la plus reculée des bords alvéolaires.

L'ordre que l'on observe dans l'éruption successive des dents n'est point tellement invariable qu'il ne soit fréquemment interverti : sur un enfant de dix mois que j'ai maintenant sous les yeux, l'éruption des quatre premières petites molaires a précédé celles des canines, et la même chose arrive dans un très-grand nombre de cas. Il en est à cet égard de la dentition comme de tous les actes de l'économie vivante, l'instabilité en forme le principal caractère. Un examen attentif fait bientôt apercevoir avec quelle irrégularité procèdent les phénomènes, soit physiologiques, soit pathologiques, qui paroissent s'assujettir le plus à certaines périodes calculables et déterminées (1).

Cette double rangée de dents qui se succèdent existoit dans les mâchoires du fœtus. Chaque alvéole, à cet âge de vie, renferme deux follicules membraneuses superposées. Celle qui doit former la dent primitive se gonfle la première, une matière calcaire encroûte sa surface, et forme le corps de la dent, qui envahit ainsi la follicule par laquelle est sécrétée la partie osseuse, de manière que, le développement du petit os étant achevé, la vésicule membraneuse, dans les parois de laquelle se

---

(1) *Voyez* Erreurs populaires, seconde édition, chap. 4, *des années climatériques et des jours critiques dans les maladies.*

ramifient les vaisseaux et les nerfs dentaires, se trouve au centre de son corps, et adhère aux parois de sa cavité intérieure. La dent est donc une substance calcaire sécrétée, ou plutôt excrétée par la vésicule dentaire; les vaisseaux ramifiés dans les parois de cette vésicule se prolongent dans la substance osseuse; c'est au moins ce qu'on doit présumer de l'adhérence intime de la membrane avec l'os. La dent participe à la vie et croît par intussusception, quoiqu'elle ne résiste point à l'usure et se détruise par les frottemens. Les germes dentaires primitifs sont liés à ceux desquels doivent naître les dents de la seconde dentition: un prolongement membraneux les unit, et, pour se porter des uns aux autres, sort par de petits trous dont le bord alvéolaire est percé. C'est par ces petites ouvertures, dont Sabatier, Bichat et M. Boyer ne font aucune mention, que sortent les dents secondaires, dont les germes sont en arrière de ceux des dents primitives. Fallope (1) connoissoit cette communication des germes dentaires, et les petits trous, *foraminula* (Sœmmering), qui laissent passer les dents de la seconde dentition: c'est donc à tort que dans ces derniers temps on a voulu s'attribuer leur découverte.

---

(1) G. Fallopii *Observationes anatomicæ, opera omnia.* Francf. 1600, p. 370. Sœmmering, *de corporis humani Fabricâ*, tome I, 1794, p. 196. Hunter, *the natural History of human teeth.* London, 1771.

Il n'est pas difficile de dire pourquoi l'évolution des germes dentaires est successive; pourquoi, dans la septième année, les dents primitives se détachent et sont remplacées par d'autres qui ont resté si long-temps ensevelies dans l'épaisseur des bords alvéolaires. Les mâchoires croissent en tous sens, et par conséquent les arcades alvéolaires augmentent de dimensions avec l'âge, l'arc s'agrandit; en sorte que les dents primitives ne suffiroient plus à le garnir, si la nature ne les remplaçoit par d'autres dents plus grosses et plus nombreuses. Le cochon d'Inde ou cabiais, ce petit animal, si souvent employé dans nos expériences, qu'on pourroit à bon droit le surnommer la victime des physiologistes, présente cette singularité, que ses dents ne sont pas renouvelées, mais poussent et sortent plus grosses de l'alvéole à mesure que le frottement les détruit, de manière qu'elles suffisent toujours à garnir le bord alvéolaire. La même chose s'observe sur les lapins.

Il en est de la dentition comme de tous les autres phénomènes de l'économie animale; elle présente une foule innombrable de variétés relatives à son époque et à sa durée, etc. Ainsi on a vu des dents repousser pour la troisième fois chez des personnes très-avancées en âge. On cite également quelques exemples, fort rares, d'enfans venus au monde avec deux incisives à la mâchoire supérieure. Louis XIV étoit dans ce cas. Baudelocque observe

que l'éruption de quelques dents avant la naissance n'est pas toujours la suite du développement extraordinaire de l'enfant, ni le présage d'une constitution meilleure, et le prouve par plusieurs exemples. Enfin les dents surnuméraires achèvent d'établir que les phénomènes de la dentition sont soumis aux mêmes irrégularités que la plupart des autres phénomènes de la vie, soit physiologiques, soit pathologiques.

CCXXIV. *Ossification.* Le travail qui s'exerce dans le système osseux ne se borne point à l'éruption et au développement des petits os qui garnissent les deux mâchoires. Toutes les autres parties du squelette se durcissent; des noyaux osseux se manifestent au centre des cartilages qui tiennent la place des os courts du carpe et du tarse; l'épaisseur des pièces cartilagineuses qui séparent les épiphyses du corps des os longs diminue; les os larges croissent et se solidifient du centre à la circonférence. Ceux du crâne se rencontrent par leurs bords, leurs fibres s'entrecroisent et forment les sutures; les espaces cartilagineux (*fontanelles*), qui existoient vers la rencontre de leurs bords et de leurs angles, disparoissent. Les urines contiennent infiniment peu de phosphate calcaire, ce sel étant tout entier employé à la solidification des os. Vers le milieu de la seconde année, ces parties ont déjà acquis assez de consistance et de solidité pour soutenir le poids du corps, l'enfant peut se tenir debout et marcher. Avant cette

époque, il seroit dangereux qu'il l'essayât; les colonnes d'appui, trop flexibles, ploieroient sous le fardeau, se courberoient en divers sens, et la direction des membres seroit vicieusement changée. C'est vers la tête que tendent les mouvemens vitaux dans l'enfance; aussi cette partie est-elle le siége principal des maladies propres à cet âge, affections dans lesquelles il est souvent utile de procurer des évacuations locales.

Les organes des sens, ouverts à toutes sortes d'impressions, les reçoivent avec facilité: mais si, dans la première enfance, les sensations sont faciles, elles sont peu durables, sans doute à cause du peu de consistance de l'organe cérébral. A mesure qu'il avance en âge, la mobilité de l'enfant se calme, sans que sa susceptibilité diminue, et c'est pendant les années qui précèdent l'époque orageuse de la puberté, qu'il jouit, au plus haut degré du pouvoir de se rappeler les choses qui l'ont affecté, que sa mémoire est plus nette et plus étendue. Mais bientôt maîtrisée par l'imagination dont une réaction puissante des organes sexuels sur le cerveau a amené l'empire, elle cesse d'avoir la même fidélité.

CCXXV. *Puberté.* Le sexe, le climat, la manière de vivre, ont une grande influence sur la manifestation plus ou moins précoce des phénomènes de la puberté. La femme y arrive un ou deux ans plus tôt que l'homme. Les habitans des pays méridionaux l'atteignent long-temps avant

ceux des contrées septentrionales. Ainsi, dans les climats les plus chauds de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique, les filles sont pubères à dix et même neuf ans, tandis qu'elles ne le sont en France que de la douzième à la quatorzième ou quinzième année, et qu'en Suède, en Russie, en Danemarck, l'écoulement menstruel, signe le plus caractéristique de la puberté, s'établit deux ou trois ans plus tard.

On reconnoît qu'un mâle est capable d'engendrer, qu'il commence à vivre de la *vie de l'espèce*, à l'émission d'une semence prolifique, et au changement de la voix qui devient plus pleine, plus grave et plus sonore; le menton se couvre de barbe, les parties génitales s'ombragent de poils, et arrivent, par un développement rapide, au volume qu'elles doivent conserver : le corps entier s'accroît, les caractères généraux qui distinguent les sexes, et qui sont tellement obscurs avant la puberté, qu'on pourroit s'y méprendre en se contentant d'un examen superficiel, se prononcent d'une manière décidée, et il n'est plus permis de les confondre.

A tous ces signes de force et de virilité, la femme, tourmentée par des désirs qui naissent des besoins, reconnoît celui qui peut les satisfaire. Le changement de la voix est surtout l'indice le plus sûr de l'aptitude acquise à l'acte reproducteur. Il tient, comme le prouvent les observations suivantes, au développement des organes vocaux,

qui accompagne constamment celui des parties sexuelles.

CCXXVI. Un jeune homme, âgé de quatorze ans, mourut, en 1799, à l'hospice de la Charité. En ouvrant le larynx, je fus surpris de sa petitesse, et surtout du peu d'étendue de la glotte, qui n'avoit que cinq lignes dans son diamètre antéro-postérieur, et une ligne et demie environ dans le transversal, à l'endroit où elle a le plus de largeur. Une observation qui ne doit pas être négligée, c'est que la taille de l'individu étoit élevée, mais que le développement de ses parties génitales étoit aussi peu avancé que celui de l'organe vocal. J'ai réitéré la même observation sur des sujets plus éloignés de l'époque de la puberté; j'ai étendu mes recherches à ceux qui l'avoient dépassée, et j'ai obtenu pour résultat général qu'entre le larynx et la glotte d'un enfant âgé de trois ou de douze ans les différences de grandeur sont très-peu remarquables, presque imperceptibles, et ne peuvent point se mesurer par la stature des individus.

Qu'à l'époque de la puberté, l'organe de la voix grossit rapidement, et qu'en moins d'une année l'ouverture de la glotte augmente dans la proportion de cinq à dix; qu'ainsi son étendue est doublée; soit sous le rapport de sa longueur, soit dans le sens de sa largeur.

Que ces changemens sont moins prononcés dans la femme, dont la glotte ne s'agrandit guère que

dans la proportion de 5 à 7; qu'ainsi, sous ce rapport, elle ressemble aux enfans, comme le timbre de sa voix l'avoit déjà fait présumer.

Ces différences de grandeur de la glotte rendent raison du danger qui, dans les enfans, accompagne l'angine laryngée (*croup*). Soit en effet une ouverture d'une ligne et demie de largeur, dont les bords se couvrent d'une lame albumineuse de trois quarts de ligne d'épaisseur, l'ouverture sera entièrement bouchée : elle seroit seulement rétrécie, si sa largeur étoit double; un espace suffisant resteroit libre pour le passage de l'air. Cette supposition, dont je me suis aidé pour me rendre plus intelligible, n'est que l'expression de la vérité, puisque l'inspection anatomique démontre que la glotte a, dans les adultes, une grandeur double de celle qu'elle présente chez les individus impubères.

CCXXVII. *Menstruation.* Les symptômes par lesquels la puberté s'annonce chez les femmes ne sont pas moins remarquables. Le gonflement des parties génitales rend plus étroites les ouvertures et les canaux qui en font partie. Les mamelles s'arrondissent et s'élèvent, en formant au-devant du thorax des saillies bien prononcées. En outre elles deviennent sujettes à un écoulement sanguin, qui a lieu chaque mois par les vaisseaux de la matrice, et que l'on connoît sous le nom de *flux menstruel* ou de *règles*. Cette évacuation périodique s'annonce, dans la plupart des femmes, par tous les

signes qui indiquent la plénitude du système circulatoire, comme lassitudes spontanées, bouffées de chaleur au visage, teint vif et animé, et par d'autres qui manifestent une direction des humeurs vers l'utérus, et la pléthore locale de cet organe, comme les douleurs des reins, un certain prurit dans les parties génitales. La première éruption met fin à cet état, qui, dans un grand nombre, peut être regardé comme une véritable maladie. Un sang pur et vermeil coule en plus ou moins grande abondance pendant quelques jours, la pesanteur générale se dissipe, et la femme se sent soulagée.

Nous ne parlerons point ici des nombreuses déviations que les règles peuvent éprouver, et qui doivent être regardées comme de véritables maladies. Ainsi on a vu l'écoulement utérin suppléé par l'hémorragie nasale, l'hémoptysie, l'hématémèse, le mélæna, quelquefois même par des évacuations sanguines insolites, qui avoient lieu par les yeux, par les oreilles, par le doigt indicateur, par des surfaces ulcérées dans diverses parties du corps.

On conçoit sans peine que les diverses parties du système sanguin puissent se suppléer mutuellement, et que la sécrétion hémorragique, en laquelle le flux menstruel consiste, au défaut de la surface interne de l'utérus, s'effectue par un autre point également pourvu de vaisseaux capillaires; mais que de semblables déviations aient lieu pour

les humeurs sécrétées par les glandes conglomérées, comme les urines, la bile, la salive, c'est ce qu'il est difficile d'admettre, malgré la multitude de témoignages et d'autorités que l'on peut rapporter en faveur de cette opinion.

Les humeurs ne préexistent point au travail sécrétoire, l'urine retenue dans la cavité de la vessie et dans les uretères, la bile arrêtée dans la vésicule du fiel et les canaux hépathiques, après avoir été préparée par l'action propre du foie, peuvent, il est vrai, absorbées par les vaisseaux lymphatiques, être portées dans la masse du sang, y produire une diathèse morbifique urineuse ou bilieuse, occasioner une irritation et un trouble, à la suite desquels l'humeur de la transpiration cutanée et de la sueur, la salive même, offriront quelques-unes des qualités de l'humeur retenue et introduite par les absorbans dans le système circulatoire. Le sang, altéré par le mélange d'une certaine quantité d'urine, peut se dépurer par divers émonctoires, des vomissemens urineux, des transpirations peuvent s'établir; mais que l'urine puisse, à l'instar du sang menstruel, sortir par les yeux, par les oreilles ou le nombril, hormis les cas de fistule urinaire ombilicale; qu'une personne dont rien n'empêche la sortie du liquide par le canal de l'urètre le vomisse spontanément, c'est ce qu'il est impossible de croire pour quiconque a quelque idée saine en physiologie, et ce qui cependant se trouve raconté avec beaucoup de détails dans un

ouvrage récent, où ces erreurs se trouvent mêlées à plusieurs recherches intéressantes sur divers points de chimie physiologique. J'ai vu moi-même cette femme dont les urines ont été si habilement analysées par le D. Nysten, lorsque le professeur de clinique interne de la Faculté de médecine de Paris la soumit à un examen rigoureux, mais nécessaire; et je me suis étonné que des gens instruits aient si long-temps ajouté foi à des impostures aussi grossières. Le lecteur excusera, j'espère, cette longue digression en faveur de son utilité. La critique littéraire est maintenant exercée d'une façon tellement partiale, qu'aucun journaliste, en accordant de justes éloges à ce que renferme de louable l'ouvrage du D. Nysten, n'a signalé la jonglerie dont il a été dupe.

D'abord irrégulier, le flux menstruel se régularise et se répète chaque mois, durant de deux à huit jours, et évacuant de trois onces à une livre de sang chaque fois. Les femmes sanguines, robustes et libidineuses, ne sont pas toujours celles dont les règles durent le plus long-temps et coulent en plus grande abondance. Les femmes qui ont beaucoup d'embonpoint sont en général peu réglées, tandis que les femmes maigres et nerveuses le sont pendant plusieurs jours, et perdent à chaque époque une quantité considérable de sang; pertes énormes, qui expliquent leur pâleur et leur peu d'embonpoint. Le sang qu'elles répandent est rouge, artériel, et n'a, dans une femme

saine, aucune des qualités malfaisantes qu'on s'est plu à lui attribuer.

Pendant tout le temps de la menstruation les femmes sont plus foibles, plus délicates, plus impressionnables; tous leurs organes participent plus ou moins à l'affection de l'utérus; et il n'est pas difficile à un observateur un peu exercé de reconnoître cet état non-seulement au rhythme du pouls, mais encore à l'altération du visage et au son de la voix. La femme exige alors de grands ménagemens. Une saignée indue, un purgatif, ou tout autre médicament administré mal à propos, peuvent supprimer l'écoulement et occasioner les affections les plus graves. Le climat influe manifestement sur la durée des règles et sur la quantité de cette évacuation, puisqu'en Afrique leur écoulement est presque continuel, tandis qu'en Laponie il n'a lieu que deux ou trois fois dans l'année.

Nous ne nous arrêterons point aux diverses explications que l'on a données de ce phénomène. Les uns l'ont attribué à la position déclive de l'utérus, sans faire attention que, dans leur hypothèse, l'évacuation menstruelle devoit se faire par la plante des pieds. Richard Mead a cru qu'elle dépendoit de l'influence qu'exerce la lune sur le système de la femme; mais alors pourquoi n'est-elle point assujettie aux phases lunaires? Ceux qui en ont trouvé la cause dans la pléthore, soit générale, soit locale, n'ont fait, en admettant même cette

explication, que reculer la difficulté; car alors on demandera quelles sont les causes de cette pléthore? Mais si ce sentiment avoit quelque chose de fondé les femmes nerveuses et presque exsangues ne devroient point être réglées, et l'observation apprend qu'elles le sont très-abondamment. Faut-il rapporter la menstruation à l'habitude acquise?

A-t-on résolu le problème en disant que tous les organes sécrétoires de la femme sont trop foibles pour évacuer le superflu de ses humeurs? ce qui rendroit nécessaire l'etablissement d'un nouvel émonctoire. Mais ne prend-on point ici l'effet pour la cause? Cette moindre quantité des liquides émanés du sang ne provient-elle point de ce que ce fluide lui-même peut se purger par la matrice? Remarquons toutefois que l'écoulement périodique des règles paroît soustraire la femme à plusieurs incommodités qui tourmentent notre sexe, telles que la goutte, les affections calculeuses, si rares chez elle, et si fréquentes chez nous. On ne peut non plus s'empêcher de reconnoître dans les règles une utilité relative à la conception : ne semblent-elles pas y disposer l'utérus (1) (CCII)? n'étoit-il pas nécessaire que cet organe fût habitué à recevoir une grande quantité de sang, afin que

(1) La plupart des femelles des animaux quadrupèdes ont les parties sexuelles baignées d'une lymphe rougeâtre au moment où elles sont en chaleur.

l'état de grossesse, qui exige cet afflux, n'entraînât point des changemens nuisibles dans le système entier des fonctions vitales? Mais pourquoi la même sécrétion n'a-t-elle point lieu chez les animaux? Seroit-ce, comme le pense Morgagni, parce que l'espèce humaine est la seule pour laquelle la station soit un état habituel.

L'écoulement menstruel est suspendu pendant la grossesse; il l'est aussi durant les premiers mois de l'allaitement, quoique cette dernière règle souffre d'assez nombreuses exceptions. Il cesse, dans nos climats, de la quarantième à la cinquantième année, quelquefois avant, rarement plus tard, quoique j'aie actuellement sous les yeux l'exemple d'une femme âgée de soixante-dix ans, et qui n'a pas encore cessé d'être réglée; fait qui ne doit pas au surplus étonner davantage que ceux d'une menstruation qui s'établit dès les premières années de la vie. Lorsque les règles sont supprimées, les mamelles se flétrissent, l'embonpoint diminue, la peau se ride, perd sa douceur, son coloris et sa souplesse. Cette cessation est la cause d'un grand nombre de maladies qui se manifestent à cet âge, appelé l'*âge de retour*, et sont funestes à un grand nombre de femmes; mais aussi l'on observe que, cette époque orageuse une fois passée, leur vie est plus assurée, et qu'elles ont l'espoir de la prolonger plus qu'un homme du même âge.

CCXXVIII. *Age viril.* A l'adolescence succède l'âge viril, dont on peut fixer le commencement

de la vingt-unième à la vingt-cinquième année. Alors tout accroissement du corps en hauteur a cessé. Les épiphyses sont complétement soudées au corps des os. Mais si l'homme cesse de croître en longueur, il s'étend dans toutes les autres dimensions. Tous les organes acquièrent un degré remarquable de dureté, de solidité et de consistance. Il en est de même des facultés intellectuelles et morales. A l'empire de l'imagination succède celui du jugement. L'homme est capable de remplir tous les devoirs que comportent la famille et la société. Cette période de sa vie, que l'on désigne par le nom d'*âge mûr*, s'étend jusqu'à la cinquantième ou cinquante-cinquième année pour les hommes ; elle ne va guère au delà de la quarante-cinquième pour les femmes, chez lesquelles elle commence aussi un peu plus tôt. Durant ce long intervalle, les hommes jouissent de toute la plénitude de leur existence.

Quoique communément il ne soit pas difficile de distinguer au premier aspect un homme de vingt-cinq ans de celui qui est parvenu à sa cinquantième année, les différences qui les caractérisent tenant à la quantité et à la couleur des poils, à la force musculaire, ne sont ni bien nombreuses, ni bien essentielles.

Profitons de cet âge pendant lequel les caractères de l'espèce humaine, simplement ébauchés dans l'enfance et dans la jeunesse, se fixent et se prononcent d'une manière moins fugitive pour

dessiner les traits, jusqu'alors indécis et mobiles, des races et des individus.

CCXXIX. *Tempéramens. Idiosyncrasies.* On donne le nom de *tempéramens* à certaines différences physiques et morales que présentent les hommes, et qui dépendent de la diversité des proportions et des rapports entre les parties de leur organisation, ainsi que des degrés différens dans l'énergie relative de certains organes. Il est en outre, pour chaque individu, une manière d'être particulière, qui distingue son tempérament de celui de tout autre, avec lequel il a cependant beaucoup de ressemblance. On désigne par le terme d'idiosyncrasies ces tempéramens individuels, dont la connoissance n'est pas d'une médiocre utilité dans l'exercice de la médecine.

La prédominance de tel ou tel système d'organes modifie l'économie tout entière, imprime des différences frappantes aux résultats de l'organisation, et n'a pas moins d'influence sur les facultés morales et intellectuelles que sur les facultés physiques. Cette prédominance établit le tempérament: elle en est la cause et en constitue l'essence.

Supposons en effet un juste rapport entre tous les organes, et par suite un parfait équilibre entre toutes les actions qui s'exécutent dans l'économie animale (1), il n'y aura point de tempérament,

(1) *Voyez* Erreurs populaires relatives à la médecine, deuxième édition, chapitre 3.

dans l'acception que donnent à ce mot les modernes. Cette constitution qu'admettoient les anciens, et qu'ils désignoient par le nom de *tempérament tempéré, temperamentum ad pondus*, Gal., n'est pas plus réelle que la perfection dans les choses humaines. Tous les tempéramens s'éloignent plus ou moins de ce terme idéal : on ne reconnoît cependant point autant de tempéramens que l'on compte d'organes ou de systèmes d'organes dans la composition du corps de l'homme. La prédominance de l'appareil osseux, par exemple, n'établit point un tempérament particulier; car le rôle que jouent les parties dures dans le mécanisme de la vie est presque entièrement passif, et ces organes exercent sur les autres parties de la machine une influence trop peu marquée. Ce sont donc seulement les différences importantes établies par la prédominance des principaux systèmes organiques que l'on caractérise par le nom de *tempéramens*.

Les différences moins générales et moins importantes, les constitutions individuelles ou idiosyncrasies sont déterminées par des influences secondaires; ainsi l'impétuosité des appétits vénériens chez certains individus, l'extrême voracité de quelques personnes, les irrégularités dans la circulation qu'on observe assez fréquemment, ne constituent point des tempéramens.

Les anciens en admettaient seulement quatre principaux, le sanguin, le bilieux, le mélancolique

et le pituiteux. Tout en reconnoissant la vérité des fondemens sur lesquels cette division est établie, on peut leur reprocher d'avoir trop limité le nombre des différences observables ; aussi pensons-nous que, lors même que l'on regarderoit le tempérament musculaire ou la constitution athlétique comme une modification du tempérament sanguin, l'existence du tempérament que caractérise la prédominance du système nerveux ne sauroit être contestée.

Si le cœur et les vaisseaux qui font circuler le sang dans toutes les parties jouissent d'une activité prédominante, le pouls sera vif, fréquent, régulier, le teint vermeil, la physionomie animée, la taille avantageuse, les formes douces, quoique bien exprimées, les chairs assez consistantes, l'embonpoint médiocre, les cheveux d'un blond tirant sur le châtain; la susceptibilité nerveuse sera assez vive et accompagnée d'une successibilité rapide, c'est-à-dire qu'affectés aisément par les impressions que les objets extérieurs font sur eux, les hommes chez qui cet excès des forces circulatoires s'observe passeront assez rapidement d'une idée à une autre idée ; la conception sera prompte, la mémoire heureuse, l'imagination vive et riante; ils aimeront les plaisirs de la table et de l'amour, jouiront d'une santé rarement interrompue par des maladies ; et toutes ces maladies, peu graves, modifiées par le tempérament, auront principalement leur siége dans le système circulatoire

(*fièvre inflammatoire*, ou *angéioténique ; phlegmasies; hémorrhagies actives*), se termineront, lorsqu'elles seront à un degré modéré, par les seules forces de la nature, et réclameront l'emploi des remèdes appelés *antiphlogistiques*, parmi lesquels la saignée tient le premier rang. Les anciens connoissoient, sous le nom de tempérament *sanguin*, cette disposition du corps; ils la regardoient comme produite par la combinaison du chaud et de l'humide, et avoient très-bien vu qu'elle s'observoit surtout chez les jeunes gens des deux sexes, s'exaltoit au printemps, saison de l'année que l'on a si justement comparée à la jeunesse, en appelant cet âge le printemps de la vie.

Pour que les caractères spécifiques du tempérament que nous venons de décrire se présentent dans toute leur vérité, il faut que le développement modéré du système lymphatique coïncide avec l'énergie du système sanguin de manière que ces deux ordres d'organes vasculaires soient dans un juste équilibre. Les traits physiques de ce tempérament existent dans les belles statues de l'Antinoüs et l'Apollon du Belvédère. Sa physionomie morale se dessine dans les vies de Marc-Antoine et d'Alcibiade. On en trouve dans Bacchus et les formes et le caractère. Mais pourquoi chercher entre les hommes illustres de l'antiquité, ou parmi ses divinités, le modèle du tempérament que nous venons de décrire, tandis qu'il est si facile de le trouver parmi les modernes? Aucun, à mon avis,

n'en présente le type plus parfait que le maréchal duc de Richelieu ; cet homme aimable par excellence, heureux et brave à la guerre, inconstant et léger jusqu'à la fin de sa longue et brillante carrière (1).

L'inconstance et la légèreté sont en effet le principal attribut des hommes de ce tempérament ; une extrême variété semble pour eux un besoin autant qu'une jouissance ; bons, généreux et sensibles, vifs, passionnés, délicats en amour, mais volages, chez eux, le dégoût suit de près la volupté ; méditant l'abandon au milieu des plus enivrantes caresses, ils échappent à la beauté dans l'instant même où elle croyoit les avoir liés par une chaîne durable (2). En vain celui que la nature a doué du tempérament sanguin voudra renoncer aux voluptés des sens, avoir des goûts fixes et durables, atteindre, par des méditations

---

(1) Mémoires du maréchal de Richelieu, 6 vol. in-8°.

Voltaire a supérieurement peint son caractère dans plusieurs pièces de vers qu'il lui adresse :

Rival du conquérant de l'Inde,
Tu bois, tu plais, et tu combats, etc.

(2) L'histoire de Henri IV, de Louis XIV, de Regnard et de Mirabeau, prouve qu'à l'amour extrême du plaisir les hommes sanguins joignent, quand les circonstances l'exigent, une grande élévation dans les sentimens et dans le caractère, et peuvent donner les preuves des talens les plus distingués dans tous les genres.

profondes, aux plus abstraites vérités : dominé par ses dispositions physiques, il sera incessamment ramené aux plaisirs qu'il fuit, à l'inconstance qui fait son partage, plus propre aux productions brillantes de l'esprit qu'aux sublimes conceptions du génie (1). Son sang, qu'un vaste poumon imprègne abondamment de l'oxigène atmosphérique, coule avec aisance dans des canaux très-dilatables, et cette facilité dans le cours et dans la distribution de ses humeurs est en même temps la cause et l'image des heureuses dispositions de son esprit.

CCXXX. Si les hommes de ce tempérament se livrent par circonstance à des travaux qui exercent beaucoup les organes de leurs mouvemens, les muscles, abreuvés de sucs et disposés à acquérir un développement proportionné à celui du système sanguin, augmentent de volume; le tempérament

---

(1) Je viens de lire dans une gazette une assertion au moins singulière. Tout le monde sait, dit le journaliste, que Newton étoit sanguin; et cela prouve bien, ajoute-t-il, que les tempéramens n'ont aucune influence sur les facultés intellectuelles. Je demanderois au journaliste où il a trouvé que Newton étoit sanguin : le peu de détails qu'ont laissés les biographes sur le physique de ce savant illustre porte à croire que son tempérament étoit le mélancolique, que l'on rencontre très-souvent en Angleterre. Je n'oserois prononcer affirmativement sur des objets par rapport auxquels on ne peut arriver qu'à un certain degré de probabilité; mais, si Newton eût été sanguin, il ne fût pas mort vierge, comme on l'assure, à l'âge de quatre-vingts ans.

sanguin éprouve une grande modification, et il en résulte le tempérament *musculaire* ou athlétique, remarquable par tous les signes extérieurs de la vigueur et de la force. La tête est très-petite, le cou renforcé, surtout en arrière, les épaules larges, la poitrine ample, les hanches solides, les intervalles des muscles fortement prononcés. Les mains, les pieds, les genoux, toutes les articulations peu chargées de muscles, paroissent très-petites; les tendons se dessinent à travers la peau qui les recouvre, la susceptibilité est peu considérable; le sentiment obtus, mais difficile à émouvoir; l'athlète entraîne et surmonte toutes les résistances, lorsqu'il est une fois sorti de son calme habituel. L'Hercule Farnèse nous présente le modèle des attributs physiques de cette constitution particulière du corps; et ce que la fabuleuse antiquité nous raconte des exploits de ce demi-dieu nous donne l'idée des dispositions morales qui l'accompagnent. Dans l'histoire de ses douze travaux, sans calcul, sans réflexion et comme par instinct, on le voit courageux parce qu'il est fort, cherchant les obstacles pour les vaincre, certain d'écraser tout ce qui lui résiste, mais joignant à de si grandes forces si peu de finesse, qu'il est trompé par tous les rois qu'il sert, et par toutes les femmes qu'il aime. Il seroit difficile de trouver dans l'histoire l'exemple d'un homme qui ait réuni aux forces physiques que ce tempérament suppose une grande somme de facultés intellectuelles. Pour se

distinguer dans la carrière des sciences et des beaux-arts, il est besoin d'une sensibilité exquise, condition absolument opposée au grand développement des masses musculaires.

CCXXXI. Si la sensibilité est à la fois vive et facile à émouvoir, et qu'à ces dons se joigne la puissance de s'arrêter long-temps sur le même objet; si le pouls est fort, dur et fréquent, les veines sous-cutanées saillantes, la peau d'un brun inclinant vers le jaune, les cheveux noirs, l'embonpoint médiocre, les chairs fermes, les muscles prononcés, les formes durement exprimées, les passions seront violentes, les mouvemens de l'âme souvent brusques et impétueux, le caractère ferme et inflexible. Hardis dans la conception d'un projet, constans et infatigables dans son exécution, c'est parmi les hommes de ce tempérament que se trouvent ceux qui, à diverses époques, ont gouverné les destins du monde: pleins de courage, d'audace et d'activité, tous se sont signalés par de grandes vertus ou par de grands crimes, ont été l'effroi ou l'admiration de l'univers. Tels étoient Alexandre, Jules César, Brutus, Mahomet, Charles XII, le czar Pierre, Cromwel, Sixte V, le cardinal de Richelieu.

Comme l'amour, chez les sanguins, l'ambition est, chez les bilieux, la passion dominante. Observez cet homme qui, né d'une famille obscure, végète long-temps dans les rangs inférieurs : de grandes secousses agitent et bouleversent les em-

pires; acteur, d'abord secondaire, de ces grandes révolutions qui doivent en changer la destinée, l'ambitieux cache tous ses desseins, et par degrés s'élève au souverain pouvoir, employant à le conserver la même adresse qu'il mit à s'en rendre maître. C'est, en deux mots, l'histoire de Cromwel et celle de tous les usurpateurs (1).

Pour arriver à des résultats d'une aussi grande importance, la plus profonde dissimulation comme la plus opiniâtre constance sont également nécessaires; ce sont aussi les qualités les plus éminentes des bilieux. Personne ne les réunissoit à un plus haut degré que ce pape fameux qui, parvenu lentement à la prélature, marche pendant vingt ans le dos courbé, et parlant sans cesse de sa fin prochaine, puis tout à coup se redresse fièrement et s'écrie : *Je suis pape !* (*ego sum papa !*) (2) frappant à la fois d'étonnement et de stupeur tous ceux qui avoient été dupes de son artifice.

Tel étoit encore le cardinal de Richelieu, qui s'éleva à un rang si voisin de la suprême puissance, et sut s'y maintenir; craint d'un roi dont

---

(1) Histoire de Cromwel, par M. Villemain, 2 vol. in-8°. Ceci a été écrit en 1801, lorsque Buonaparte, sous le nom de premier consul, venoit de s'emparer du gouvernement, et a subsisté sans altération dans les six éditions qui ont été successivement publiées depuis cette époque jusqu'à sa chute (1824).

(2) Vie de Sixte-Quint, 2 vol. in-12.

il affermissoit l'autorité, haï des grands dont il détruisoit la puissance, fier et implacable envers ses ennemis, avide de tous les genres de gloire, etc. (1).

Les historiens du temps nous apprennent que ce ministre à jamais célèbre présentoit tous les traits qu'on a coutume d'assigner au tempérament bilieux. Gourville nous instruit qu'il fut toute sa vie sujet à un flux hémorrhoïdal très-incommode (2).

Ce tempérament est encore caractérisé par le développement précoce des facultés morales. Sortant à peine de l'adolescence, les hommes que l'on vient de nommer ont conçu et exécuté des entreprises qui eussent suffi à leur illustration. Un excessif développement du foie, une surabondance marquée des sucs biliaires existant le plus souvent avec cette constitution du corps, dans laquelle le système vasculaire sanguin jouit de la plus grande énergie, au préjudice du système cellulaire et lymphatique, les anciens lui ont donné le nom de *tempérament bilieux*. Les maladies auxquelles sont sujets les individus qui en sont doués présentent, en effet, tantôt comme principal caractère, tantôt comme circonstance

---

(1) *Voyez* son caractère, tracé avec autant de vérité que d'éloquence, par Thomas, dans la dernière édition de l'Essai sur les éloges.

(2) Mémoires de Gourville.

accessoire, ou complication, le dérangement de l'action des organes hépatiques joint à des altérations du liquide biliaire. Parmi les médicamens qu'on oppose à ce genre d'affections, les évacuans, et surtout les vomitifs, méritent la plus grande faveur.

Si tous les caractères assignés au tempérament bilieux sont portés au plus haut degré d'intensité, et qu'à cet état s'ajoute une grande susceptibilité, les hommes sont irascibles, fougueux et s'emportent pour la moindre cause. Tel Homère nous peint Achille et quelques autres de ses héros.

CCXXXII. Lorsqu'au tempérament bilieux se joint l'obstruction maladive de quelqu'un des organes de l'abdomen, un dérangement quelconque dans les fonctions du système nerveux, que les fonctions vitales s'exécutent d'une manière foible ou irrégulière, la peau se teint d'une couleur plus foncée, le regard devient inquiet et sombre, le ventre paresseux; toutes les excrétions se font difficilement; le pouls est dur et habituellement serré; le malaise général influe sur la teinte des idées; l'imagination devient lugubre, le caractère soupçonneux. Les variétés excessivement multipliées que peut offrir ce tempérament, appelé, par les anciens, *mélancolique* ou *atrabilaire;* la diversité des circonstances qui peuvent le produire, telles que les maladies héréditaires, de longs chagrins, des études opiniâtres, l'abus des voluptés, etc., doivent faire adopter l'opinion que Clerc a émise

dans l'histoire naturelle de l'homme malade, où il regarde le tempérament mélancolique moins comme une constitution naturelle et primitive que comme une affection morbifique, héréditaire ou acquise. Les caractères de Louis XI et de Tibère ne laissent rien à désirer pour la détermination morale de ce tempérament. Lisez, dans les Mémoires de Philippe de Comines et dans les Annales de Tacite, l'histoire de ces deux tyrans craintifs, perfides, défians, soupçonneux, cherchant la solitude par instinct, et la souillant par tous les actes de l'atrocité la plus barbare et de la débauche la plus effrénée. La méfiance et la timidité, jointes à tous les déréglemens de l'imagination, forment le caractère moral de ce tempérament. Le morceau dans lequel Tacite peint la conduite artificieuse de Tibère lorsqu'il refuse l'empire qui lui est offert après la mort d'Auguste, peut en être donné comme le tableau le plus parfait. *Versæ indè ad Tiberium preces*, etc. CORN. TACIT., *Ann.*, lib. I (1).

Comme l'observe très-bien le professeur Pinel, dans son Traité sur la manie, l'histoire des hommes célèbres dans les sciences, les lettres et les arts, a fait connoître des mélancoliques d'un caractère

---

(1) Je me contente d'indiquer les sources où je puise, pour tracer l'histoire complète des hommes célèbres, considérés sous le rapport de la détermination de leur tempérament: de plus amples développemens sont réservés pour mes leçons particulières.

opposé : doués d'un sens exquis, d'un tact délicat, dévorés d'un ardent enthousiasme pour le beau, capables de le réaliser dans de riches conceptions, vivant avec les hommes dans une réserve voisine de la défiance, analysant avec soin toutes leurs actions, saisissant dans le sentiment jusqu'à ses nuances les plus délicates; mais prompts aux interprétations défavorables, et voyant tous les objets à travers le prisme lugubre de la mélancolie.

Il est extrêmement difficile de peindre ce tempérament d'une manière générale ou abstraite. Quoique le fond du tableau reste toujours le même, les traits excessivement nombreux sont susceptibles d'une infinité de variations; il vaut donc mieux recourir à l'histoire des hommes illustres qui l'ont offert dans toute sa vérité. Le Tasse, Pascal, J. J. Rousseau, Gilbert, Zimmermann, se présentent parmi plusieurs autres, et méritent, par leur juste célébrité, de fixer plus particulièrement nos regards. Le premier, né sous le climat heureux de l'Italie, proscrit et malheureux dès l'enfance, auteur, à vingt-deux ans, du plus beau poëme épique dont puissent se glorifier les modernes, atteint, au milieu des jouissances d'une célébrité précoce, de l'amour le plus violent et le plus infortuné pour la sœur du duc de Ferrare, dont il habitoit la cour; passion excessive, qui fut le prétexte des plus affreuses persécutions, et le suivit jusqu'à sa mort, arrivée vers la cinquante

et unième année de son âge, la veille d'une pompe triomphale qui lui étoit préparée au Capitole.

L'auteur des Lettres provinciales et des Pensées, jouissant comme le Tasse d'une grande célébrité, presqu'au sortir de l'enfance, fut conduit à la mélancolie, non point comme celui-ci par les travers d'un amour malheureux, mais par une frayeur vive et profonde, qui lui laissa l'idée d'un abîme ouvert sans cesse à ses côtés; idée qui ne le quitta qu'à sa mort, arrivée huit ans après cet accident funeste (1).

Personne peut-être n'a présenté le tempérament mélancolique à un plus haut degré d'énergie que le philosophe de Genève. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire avec quelque attention certains endroits de ses immortels écrits, et surtout les deux dernières parties de ses Confessions et les Rêveries du promeneur solitaire : tourmenté par des défiances et des craintes continuelles, son imagination si féconde lui représente sans cesse tous les hommes comme ses ennemis. A l'entendre, tout le genre humain est ligué pour lui nuire; *les rois et les peuples se sont réunis contre le fils d'un pauvre horloger;* les enfans, les invalides entrent comme exécuteurs de ces complots affreux. Mais laissons parler lui-même l'homme du dix-huitième siècle qui fut le plus éloquent et le plus malheureux.

---

(1) Blaise Pascal mourut à trente-neuf ans. *Voyez* sa Vie, par M. de Condorcet.

« Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de « frère, de prochain, d'ami, de société que moi-« même : le plus sociable et le plus aimant des « humains en a été proscrit par un accord una-« nime : » tel est le début de sa première promenade. Plus loin il ajoute : « Pouvois-je croire que « je serois tenu, sans le moindre doute, pour un « monstre, un empoisonneur, un assassin ; que je « deviendrois l'horreur de la race humaine et le « jouet de la canaille ; que toute salutation que me « feroient les passans seroit de cracher sur moi ; « qu'une génération tout entière s'amuseroit, « d'un accord unanime, à m'enterrer tout vivant ? » Il est inutile de multiplier les citations quand il s'agit des ouvrages d'un philosophe qui, malgré ses erreurs, fera éternellement les délices de tous ceux qui aiment lire et penser (1).

L'histoire de J. J. Rousseau, comme celle de presque tous les mélancoliques qui se sont illustrés dans la carrière des lettres, nous présente le génie aux prises avec l'infortune, et luttant péniblement contre l'adversité ; une âme forte, logée dans un corps débile, d'abord douce, affectueuse, expansive et tendre, aigrie par le sentiment d'une condition malheureuse et de l'injustice des

(1) Consultez les Mémoires des contemporains : de mes Rapports avec J. J. Rousseau, par Dussaulx, Paris, in-8° ; les Études de la Nature, par Bernardin de Saint-Pierre ; les Lettres sur J. J. Rousseau, par madame de Staël, etc.

hommes. Jusqu'au moment où, tourmenté du désir de la célébrité, Rousseau s'élança dans la carrière épineuse des lettres; doué d'un tempérament sanguin, on le voit, présentant toutes les qualités propres à ce tempérament, doux, aimant, généreux et sensible, quoique inconstant; son imagination féconde ne lui présente que des images riantes; et, dans cette illusion du bonheur, il vit d'agréables chimères; mais, graduellement détrompé par les dures leçons de l'expérience, profondément affligé de sa misère et des torts de ses semblables, son physique s'use, se mine, s'épuise; avec lui le moral change, et son exemple peut être donné comme la preuve la plus frappante de l'influence réciproque du moral sur le physique, et du physique sur le moral (1). Il prouve sans

(1) Je ne doute point que l'influence de l'organisation physique sur les facultés intellectuelles ne soit tellement prononcée qu'on ne puisse regarder comme possible la solution du problème suivant, analogue à celui par lequel Condillac termine son livre sur l'Origine des connoissances humaines:

L'homme physique étant donné, déterminer le caractère et l'étendue de son esprit, et dire en conséquence non-seulement quels sont les talens dont il donne des preuves, mais encore quels sont ceux qu'il peut acquérir.

La méditation profonde de l'ouvrage de Galien (*quod animi mores corporis temperamenta sequantur*); la lecture des Vies des hommes illustres de Plutarque, et des autres historiens et biographes de l'antiquité et des siècles modernes; celle des Éloges de Fontenelle, Thomas, d'Alembert, Condorcet, Vicq-d'Azyr, etc.; les travaux médico-philosophiques

réplique que le tempérament mélancolique est moins une constitution particulière du corps qu'une véritable maladie, dont les degrés peuvent varier à l'infini, depuis une certaine originalité dans le caractère jusqu'à la manie la plus décidée.

Gilbert vient à Paris avec les germes d'un talent fait pour ce grand théâtre. Pauvre et rebuté par ceux en qui il avoit fondé son espoir, il se mêle aux rangs de leurs détracteurs, et se signale bientôt parmi les plus redoutables par une vigueur digne d'une meilleure cause. Poursuivi sans relâche par la misère, le spectacle désespérant du bonheur dont jouissoient ses ennemis, et auquel il se croyoit appelé, le conduisit à un état de démence complète. Il se croit poursuivi par les philosophes, qui veulent lui enlever ses papiers; pour les soustraire à leur prétendue rapacité, il serre ses manuscrits dans une armoire dont il avale la clef. Cet instrument s'arrête à l'entrée

---

des Haller, Cullen, Cabanis, Pinel, Hallé, qui ont modifié et enrichi l'ancienne doctrine sur les tempéramens, seront d'un puissant secours dans la recherche de cette solution. « La « philosophie » (s'écrie un écrivain éloquent, dans le noble enthousiasme qui le saisit à la vue des richesses accumulées par Fontana dans le Muséum anatomique de Florence) « la philosophie a eu tort de ne pas descendre plus avant dans « l'homme physique; c'est là que l'homme moral est caché : « l'homme extérieur n'est que la saillie de l'homme intérieur. »

DUPATY, 33e *Lettre sur l'Italie.*

du larynx, gêne l'entrée de l'air, et suffoque le malade, qui meurt à l'Hôtel-Dieu, après trois jours des plus cruelles souffrances (1).

Zimmermann, usé de bonne heure par l'étude, médecin déjà célèbre à un âge peu avancé, vit dans la solitude avec une imagination ardente, jointe à la plus grande susceptibilité; abandonné à lui-même, dévoré de la soif de la gloire, il se livre au travail jusqu'à l'excès, donne le Traité sur l'Expérience, et l'ouvrage sur la Solitude, qui offre si bien la teinte de son âme. Forcé d'abandonner cette solitude qu'il aime, il porte dans les cours où sa réputation l'appelle un fonds inépuisable d'amertume et de tristesse que les événemens politiques viennent encore augmenter. Arrivé par degrés au dernier terme de l'hypocondrie, il meurt

---

(1) On lui eût conservé la vie, si l'on eût reconnu la cause du mal, qu'il indiquoit lui-même en répétant à tout propos: *la clef m'étouffe*. L'état de démence fit que l'on regarda cela comme un trait d'aliénation; mais, à l'ouverture du cadavre, on trouva effectivement la clef, dont la portion qui s'engage dans la serrure étoit accrochée à l'entrée du larynx: il eût été facile de la retirer, en portant les doigts au fond de la gorge.

Ce jeune homme infortuné exprimoit, peu de jours avant sa mort, l'état douloureux de son âme dans des stances remplies de la mélancolie la plus attendrissante; en voici une pleine à la fois d'intérêt et de simplicité:

Au banquet de la vie, infortuné convive,
J'apparus un jour, et je meurs;
Je meurs, et sur la tombe où lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.

assiégé de terreurs pusillanimes, digne de tous les éloges et de tous les regrets (1).

CCXXXIII. Si la proportion des liquides aux solides est trop considérable, cette surabondance des humeurs, qui est constamment à l'avantage du système lymphatique, donne à tout le corps un volume considérable, déterminé par le développement et la réplétion du tissu cellulaire. Les chairs sont molles, l'habitude décolorée, les cheveux blonds ou cendrés, le pouls foible, lent et mou, les formes arrondies et sans expression, toutes les actions vitales plus ou moins languissantes, la mémoire infidèle, l'attention peu soutenue. Les individus qui présentent ce tempérament, auquel les anciens donnoient le nom de *pituiteux*, et que nous mommerons *lymphatique*, parce qu'il dépend réellement de l'excès de développement de ce système, ont pour la plupart, un penchant insurmontable à la paresse, répugnent au travaux de l'esprit comme à l'exercice du corps; aussi ne doit on pas s'étonner de n'en point rencontrer parmi les hommes illustres de Plutarque. Peu propres aux affaires, ils n'ont jamais exercé un grand empire sur leurs semblables, ils n'ont jamais

(1) Consultez son éloge, par Tissot; il se trouve à la tête de la dernière édition du Traité de l'Expérience en médecine. On y voit combien il fut profondément affecté de la révolution française, dont il prévoyoit, par une sorte d'esprit prophétique, les suites désastreuses pour son pays (la Suisse).

bouleversé la surface du globe par des négociations ou par des conquêtes. L'un des amis de Cicéron, Pomponius Atticus, dont Cornélius Népos nous a transmis l'histoire, se conciliant tous les partis qui détruisirent la république romaine dans les guerres civiles de César et de Pompée, nous en offre le modèle. Parmi les modernes, l'indifférent Michel Montaigne, dont toutes les passions furent si modérées, qui raisonnoit sur tout, même sur le sentiment, étoit vraiment pituiteux. Mais, chez lui, la prédominance du système lymphatique n'étoit pas portée si loin, qu'il ne s'y joignît une assez grande susceptibilité nerveuse. Chez les pituiteux, les parties aqueuses dominant dans le fluide qui doit porter partout la chaleur et la vie, la circulation s'effectue avec lenteur; l'imagination en est refroidie, les passions excessivement modérées; et de cette modération dans les désirs naissent, dans bien des occasions, ces *vertus de tempérament*, vertus dont, pour le dire en passant, les possesseurs devroient moins s'enorgueillir.

CCXXXIV. Cette propriété, qui fait que nous sommes plus ou moins sensibles aux impressions que reçoivent nos organes, foible chez les pituiteux, presque nulle pour les athlètes, modérée dans ceux qui sont doués d'un tempérament sanguin, assez vive chez les bilieux, lorsqu'elle est excessive, constitue le tempérament *nerveux*, rarement naturel ou primitif, mais le plus souvent acquis et dépendant d'une vie sédentaire et trop

inactive, de l'habitude du plaisir, de l'exaltation des idées, entretenue par la lecture des ouvrages d'imagination, etc. On reconnoît ce tempérament à la maigreur, au peu de volume des muscles mous et comme atrophiés, à la vivacité des sensations, à la promptitude et à la variabilité des déterminations et des jugemens. Les femmes vaporeuses, dont les volontés sont absolues, mais changeantes, la sensibilité exaltée, le présentent fréquemment avec tous ses caractères; assez souvent néanmoins elles ont un embonpoint médiocre; la prédominance extrême du système nerveux s'alliant à un développement modéré du système lymphatique. Les mouvemens convulsifs ne sont point rares chez ces personnes; et si l'on fait attention que, d'autre part, la constitution athlétique, directement opposée au tempérament nerveux, prédispose au tétanos, ne pourra-t-on pas dire que les deux extrêmes se touchent ou produisent les mêmes effets?

Les antispasmodiques réussissent dans le traitement de leurs maladies, qui prennent toujours plus ou moins la teinte du tempérament. Les stimulans conviennent, au contraire, beaucoup dans les affections auxquelles sont exposées les personnes d'un tempérament pituiteux ou lymphatique. Le tempérament nerveux, comme le mélancolique, est moins une constitution naturelle du corps que le premier degré d'une maladie. Ce tempérament, comme les affections vaporeuses auxquelles il dispose, ne s'est jamais offert qu'au milieu des

sociétés parvenues à ce degré de la civilisation où l'homme est le plus loin possible de la nature. Les dames romaines ne devinrent sujettes aux *maux de nerfs* que par suite de ces mœurs dépravées qui signalèrent l'époque de la décadence de l'empire. Les vapeurs étoient extrêmement communes en France pendant le dix-huitième siècle, dans les temps qui précédèrent la révolution C'est à cette époque qu'on vit éclore à la fois les ouvrages de With, de Raulin, de Lorry, de Pomme, etc., sur les vapeurs. Tronchin, médecin génevois, s'acquit une grande fortune et une immense considération dans le traitement de ces maladies. Tout son secret consistoit à exercer jusqu'à la fatigue des femmes habituellement oisives, en soutenant leurs forces par une nourriture simple, saine et abondante. Les deux hommes les plus remarquables du dix-huitième siècle, Voltaire et le grand Frédéric, peuvent être donnés comme des exemples du tempérament nerveux ; et l'histoire de leur vie, si brillante et si agitée, montre assez combien les circonstances au milieu desquelles ils vécurent contribuèrent à développer leurs dispositions natives.

Nous finirons cet article sur les tempéramens en observant qu'à la vérité nous apportons en naissant ces dispositions particulières du corps; mais que, par l'éducation, la manière de vivre, le climat, les habitudes contractées, elles s'altèrent ou même changent tout-à-fait. En outre, il est infiniment rare de rencontrer des individus qui

présentent dans toute leur pureté les caractères assignés aux divers tempéramens : les descriptions qu'on en donne portent sur une collection d'individus qui ont entre eux de grandes ressemblances; leurs caractères sont de pures abstractions qu'il est difficile de réaliser, parce que tous les hommes sont à la fois sanguins et bilieux, sanguins et lymphatiques, etc. Ici les physiologistes ont imité cet artiste qui réunit dans la statue de la déesse de la beauté mille perfections, que lui offroient séparées les plus belles femmes de la Grèce. C'est ainsi que l'idéal naît dans les arts d'imitation, tantôt de l'exagération des traits, tantôt de la réunion des qualités que la nature présente éparses.

On observe que la constitution appelée *sanguine* est directement opposée à la mélancolique, et s'allie peu avec elle; qu'il en est de même de la bilieuse à l'égard de la lymphatique, quoiqu'il puisse arriver qu'un homme sanguin dans sa jeunesse devienne mélancolique après un laps de temps plus ou moins considérable; car, pour le répéter, l'homme ne reste jamais tel qu'il est sorti des mains de la nature; façonné par tout ce qui l'environne, ses qualités physiques, observées à différentes époques de sa vie, ne présentent pas moins de différences que son caractère.

De toutes les causes qui modifient la nature de l'homme, et vont jusqu'à dénaturer complétement ses dispositions natives, aucune n'est plus puissante que l'action long-temps continuée de l'air,

des eaux et des lieux, comme le disoit le père de la médecine. Le climat, en effet, exerce sur le tempérament l'influence la plus marquée. Ainsi le tempérament bilieux est celui du plus grand nombre des habitans des contrées méridionales; le sanguin, celui des peuples du Nord : la constitution lymphatique règne au contraire dans les pays froids et humides, comme la Hollande. Nous avons vu de quelle manière les tempéramens athlétiques, mélancoliques et nerveux, naissoient des habitudes et des exercices auxquels on se livre : tâchons maintenant d'apprécier de quelle manière l'empire du climat décide la constitution particulière du plus grand nombre des individus.

On sait que telle est l'influence de la chaleur dans la production des maladies bilieuses, qu'extrêmement fréquentes durant l'été, elles disparoissent, ou du moins deviennent beaucoup plus rares avec l'automne. Un accroissement remarquable de la transpiration n'existe jamais sans une diminution proportionnelle dans la quantité des liquides dont les surfaces alimentaires sont humectées. Or, les sucs gastriques étant moins abondans, et la bile se mêlant à une quantité moindre de sérosités, elle irrite plus vivement les surfaces intestinales; les forces digestives languissent; il y a disposition prochaine aux fièvres méningo-gastriques. Les mêmes influences, continuées durant toute l'année dans les pays chauds, doivent nécessairement augmenter avec l'activité du système biliaire

l'empire qu'il exerce sur les autres parties de l'économie, et faire ainsi prédominer la constitution bilieuse, soit dans l'état de santé, soit dans celui de maladie.

Quant au tempérament sanguin, si généralement départi aux nations septentrionales, il est la suite nécessaire de la réaction continuelle et très-énergique des forces circulatoires contre les effets du froid extérieur. Ce n'est que par l'activité soutenue du cœur et des vaisseaux que la calorification peut s'effectuer avec la vigueur nécessaire. Or les effets de cette action redoublée sont les mêmes pour les organes circulatoires que pour les muscles soumis à l'empire de la volonté; dans les deux cas, l'exercice augmente les forces des organes exercés. Les maladies des peuples du Nord, analogues à leur tempérament, ont, pour la plupart, leur siége dans le système des vaisseaux sanguins; leur caractère est éminemment inflammatoire.

Enfin l'état lymphatique des peuples qui vivent sous un climat humide ne doit pas nous étonner davantage que la nature aqueuse des végétaux, et le peu de densité du corps ligneux dans les arbres qui croissent sous l'influence d'un air brumeux. Les corps animaux, comme les plantes, absorbent par leurs surfaces, et se gorgent d'humidités, dont l'excès produit constamment un ralentissement notable dans l'activité des mouvemens organiques.

Le tempérament caractérisé par la prédominance d'un organe ou d'un système d'organes s'éloigne de ce terme idéal, où toutes les forces se balancent réciproquement, de manière que l'économie vivante offre l'image de l'équilibre parfait. Cet état, qui peut-être n'exista jamais que dans l'imagination des physiologistes, que les anciens ont désigné sous le nom de *tempérament tempéré*, *temperamentum temperatum*, étant pris pour le type de la santé, il résulte que le tempérament est déjà un pas de fait vers la maladie. Cependant l'action du système prédominant n'est pas tellement prépondérante, que tout l'équilibre soit détruit, et que le jeu de la vie s'en trouve enrayé; mais que les dispositions constitutionnelles soient exagérées, la maladie existe, et ce passage a lieu dans la conversion du tempérament lymphatique en scrofules (1). Dans la constitution scrofuleuse, il y a à la fois activité des bouches absorbantes, grande facilité d'absorption, inertie des vaisseaux et des glandes lymphatiques, foiblesse des absorbans, et par conséquent, épaississement et stagnation des liquides absorbés : la même chose

---

(1) *Voyez* Nosographie et Thérapeutique chirurgicales, cinquième édition, tome I, l'histoire des ulcères scrofuleux, de laquelle ce paragraphe est extrait en entier. L'auteur, dans cet ouvrage, a cherché à introduire la physiologie dans la chirurgie, jusqu'alors exclusivement livrée aux explications du plus grossier mécanisme.

s'observe dans le tempérament lymphatique, caractérisé par l'activité des bouches inhalantes et la débilité du système lymphatique, comme l'a très-bien vu M. le professeur Cabanis (1), lorsqu'il a réfuté l'opinion de ceux qui font consister le tempérament lymphatique dans l'excès d'activité du système absorbant, quoique la seule portion de ce système réellement activée soit celle qui exerce immédiatement l'absorption, tandis que le reste est frappé d'une atonie presque complète.

CCXXXV. *Variétés de l'espèce humaine.* La faculté de produire par l'accouplement des individus semblables est regardée par les naturalistes comme le caractère le plus sûr d'après lequel on puisse établir les espèces parmi les animaux à sang rouge et chaud. Cette puissance de se perpétuer par une succession constante d'êtres qui ressemblent à ceux dont ils tiennent le jour existe dans toutes les races qui composent l'espèce humaine, quelle que soit la diversité de leur couleur, de leur structure et de leur manière de vivre. Les hommes ne forment donc qu'une seule espèce, et les différences qu'ils présentent, suivant la région du globe qu'ils habitent, n'en peuvent constituer que des races ou des variétés. Nous admettons, d'après Lacépède, quatre races principales de l'es-

(1) Des Rapports du physique et du moral de l'homme, par G. Cabanis.

pèce humaine, que nous nommerons, comme lui, *arabe européenne*, *mongole*, *nègre et hyperboréenne*. On pourroit en ajouter une cinquième, formée par les Américains, s'il n'étoit très-probable que le nouveau continent s'est peuplé des habitans qui, venus de l'ancien, soit par les terres de l'hémisphère boréal, soit en suivant l'immense archipel formé par les îles de l'Océan pacifique, ont été plus ou moins altérés par l'influence de ce climat et de cette terre vierge encore, de manière qu'on doit moins les regarder comme une race que comme une simple variété. Blumenbach admet cinq variétés principales de l'espèce humaine, sous les noms de races *caucasienne*, *mongolique*, *éthiopienne*, *américaine* et *malaise;* d'autres en distinguent jusqu'à sept; mais il n'existe aucune ligne de démarcation bien précise entre les races humaines; quelques Nègres ont offert des figures qui ne différoient que par la couleur de celle des Européens; des individus blancs présentent les traits de la race mongole.

Il y a cette différence entre les variétés et les races, que ces dernières supposent des modifications plus profondes, des différences plus essentielles, des changemens qui ne soient pas bornés aux surfaces, mais s'étendent encore à la charpente même du corps; tandis qu'il suffit, pour déterminer les variétés, des effets de l'influence superficielle qu'exerce le climat sur les tégumens qu'il colore, et sur les poils, qu'il rend longs ou

courts, frisés ou plats, durs ou cotonneux. Un Abyssin, brûlé par les ardeurs d'un ciel voisin du tropique, a la peau aussi noire que le Nègre exposé aux feux de l'équateur; néanmoins il n'est pas permis de les confondre, de les regarder comme formant une seule et même race, puisque, semblable par la couleur au Nègre, l'Abyssin ressemble à la race européenne pour la coupe de son visage et les proportions de toutes ses parties.

Les caractères de la race arabe européenne, qui comprend non-seulement les habitans de l'Europe, mais encore ceux de l'Égypte, de l'Arabie, de la Syrie, de la Barbarie et de l'Éthiopie, sont: un visage ovale ou presque ovale dans le sens vertical, un nez long, un crâne saillant, des cheveux longs et ordinairement plats, une peau plus ou moins blanche. Ces caractères fondamentaux ne sont nulle part plus prononcés que dans le nord de l'Europe. Les peuples de la Suède, de la Finlande et de la Pologne, fournissent comme le prototype de la race : leur taille est élevée, leur peau d'une blancheur parfaite, leurs cheveux longs, lisses et d'un blond clair; la couleur de l'iris le plus souvent bleuâtre. Les Russes, les Anglais, les Danois, les Allemands s'éloignent déjà de ce type primordial : le teint de leur peau est d'une blancheur moins pure; leurs cheveux sont d'un blond plus foncé. Les Français semblent tenir le milieu entre les peuples du nord et ceux du midi de l'Europe. Leur peau se nuance de teintes plus

rembrunies ; leurs cheveux, moins plats, sont moins blonds que châtains et bruns. Les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Turcs d'Europe et les Portugais ont le teint plus brun, les poils le plus souvent de couleur noire. Enfin les Arabes, les Maures et les Abyssins ont les cheveux plus ou moins noirs et crépus, la peau plus ou moins rembrunie, et pourroient servir de passage entre la race arabe européenne et la race nègre, qui en diffère cependant par l'aplatissement du front, la petitesse du crâne, l'obliquité de la ligne qui mesure la hauteur de la face, l'épaisseur des lèvres, la saillie des pommettes, et encore par une peau plus noire, plus épaisse, grasse et comme huileuse, ainsi que par des cheveux plus courts, plus fins, frisés et cotonneux.

La race mongole a le front aplati, le crâne peu proéminent, les yeux regardant un peu obliquement en dehors ; les joues sont saillantes, et l'ovale que représente le visage, au lieu d'aller du front au menton, se dessine d'une pommette à l'autre. Les Chinois, les Tartares, les habitans de la presqu'île du Gange et des autres contrées de l'Inde, et du Tunquin, de la Cochinchine, du Japon, du royaume de Siam, etc., etc., composent cette race, plus nombreuse que toutes les autres, qui paroît aussi la plus ancienne, et se trouve répandue dans un espace bien plus étendu que la race arabe européenne, et surtout que la race nègre, puisqu'elle s'étend du quarantième au soixantième pa-

rallèle, occupant un arc de méridien d'environ soixante-quinze degrés; tandis que celui qui mesure les terres qu'habite la race européenne n'en a que cinquante, et que la race nègre, placée sous l'équateur, entre les tropiques du cancer et du capricorne, se trouve renfermée dans les limites d'un arc de trente à trente-cinq degrés (1).

La race hyperboréenne, placée au nord des deux continens, au voisinage des cercles polaires, formée par les Lapons, les Ostiaques, les Samoïèdes et les Groënlandais, est caractérisée par un visage plat, un corps trapu et une taille très-courte. Cette portion dégradée de l'espèce humaine tient évidemment du climat ses caractères distinctifs. Luttant sans cesse contre l'inclémence d'un ciel rigoureux, et l'action destructive d'un froid glacial, la nature, enchaînée dans ses mouvemens, rapetissée dans toutes ses dimensions, ne peut produire que des êtres dont l'imperfection physique explique l'état presque barbare.

Le peu de progrès des Nègres dans l'étude des sciences et dans la civilisation, leur goût décidé et l'aptitude singulière qu'ils montrent pour tous les arts qui exigent plus de goût et d'adresse que d'entendement et de réflexion, comme la danse, la musique, l'escrime, etc.; la figure de leur tête qui tient le milieu entre celle de l'Européen et de

(1) Lacépède, Géographie zoologique.

l'orang-outang (1), l'existence des os intermaxillaires à un âge où, chez nous, les traces de leur séparation sont complétement effacées; la position relevée, et le peu de développement du gras de la jambe, ont été les argumens moins solides que spécieux dont se sont servis ceux qui ont voulu rabaisser cette portion de l'espèce humaine, dans l'intention de justifier le commerce qu'en font les nations policées, et l'esclavage dans lequel on la réduit.

Sans admettre cette croyance, accréditée par la soif des richesses, on ne peut s'empêcher de convenir que les différences dans l'organisation n'entraînent une inégalité frappante dans le déve-

---

(1) La couleur noire de la peau chez les Nègres paroît due, comme nous l'avons déjà dit, au brûlement de la gélatine, qui fait la base du corps muqueux de Malpighi. Cette couleur, acquise par une longue suite de siècles, perpétuée et transmise par voie de génération, est devenue un des traits caractéristiques de la race nègre. M. Volney, dans un ouvrage que l'on doit proposer pour modèle à tous les voyageurs, établit, sur la figure des Noirs, une conjecture aussi ingénieuse que probable. Il observe qu'elle représente précisément cet état de contraction que prend notre visage lorsqu'il est frappé par la lumière et par une forte verbération de la chaleur; alors, dit ce voyageur philosophe, le sourcil se fronce, la pomme des joues s'élève, la paupière se serre, la bouche fait la *moue*. Cette contraction des parties mobiles n'a-t-elle pas pu et dû, à la longue, influer sur les parties solides, et mouler la charpente même des os? *Voyage en Syrie et en Égypte*, tome I, page 70 de la troisième édition.

loppement des facultés morales et intellectuelles. Cette vérité éclateroit dans tout son jour, si, après avoir sommairement indiqué, comme nous venons de le faire, les caractères physiques des races humaines, nous pouvions développer leurs différences morales, aussi réelles et non moins prononcées, opposer l'activité, la versatilité, l'inquiétude européenne à l'indolence, au flegme, à la patience asiatique; examiner ce que peuvent sur le caractère des nations la fertilité du sol, la sérénité du ciel, la douceur du climat; montrer par quel enchaînement de causes physiques et morales l'empire des coutumes a tant de puissance chez les peuples de l'Orient, que l'on trouve aux Indes et dans la Chine les mêmes lois, les mêmes mœurs, les mêmes cultes qui existoient à une époque de beaucoup antérieure au commencement de notre ère; rechercher par quelle singularité, bien digne des méditations des philosophes et des politiques, ces lois, ce culte et ces mœurs n'ont subi aucun changement, n'ont éprouvé aucune altération au milieu des révolutions qui ont si fréquemment bouleversé ces riches contrées, plusieurs fois conquises par les Tartares belliqueux; faire voir comment, par l'ascendant irrésistible de la sagesse et des lumières, des vainqueurs ignorans et farouches ont adopté les usages des nations qu'ils avoient soumises; et prouver que l'état stationnaire des sciences et des arts chez des peuples qui ont, si long-temps avant nous, joui des bien-

faits de la société et des avantages de la civilisation, tient moins à l'imperfection de leur organisme qu'au joug humiliant d'une religion surchargée de pratiques absurdes, et qui fait du savoir l'apanage exclusif d'une caste privilégiée (1). Mais une pareille entreprise, outre qu'elle excèderoit les bornes que nous nous sommes prescrites, n'appartient point directement à notre sujet.

Les *Albinos* de l'Afrique, les *Cagots* des Pyrénées, et les *Crétins* du Valais ne peuvent point être donnés comme des variétés de l'espèce humaine. Ce sont des êtres infirmes, foibles, dégradés, incapables de reproduire leur existence, et la traînant misérablement au milieu d'une population saine, vigoureuse et robuste.

On ne doit point ajouter foi à ce qu'ont écrit quelques voyageurs sur l'existence des peuplades de géans qui se sont offertes sur les côtes magellaniques. Les Patagons, sur la taille desquels les

---

(1) *Voyez*, sur la religion des Brames et les coutumes indiennes, l'Histoire philosophique et politique, etc., par G. Thomas Raynal. On doit encore assigner pour cause principale du défaut de progrès des peuples de l'Inde et de la Chine dans les arts et dans les sciences nées de la civilisation, l'imperfection de leur alphabet, composé d'une multitude de caractères qui, comme les nôtres, ne représentent pas les sons, mais les idées. Il n'est pas de mon objet de démontrer combien des signes aussi défectueux doivent en restreindre la sphère et en entraver les combinaisons.

diverses relations s'accordent si peu, sont des hommes très-bien conformés, et dont la stature n'excède guère la nôtre de plus d'un quart de mètre (9 à 10 pouces). Les Lapons, dont la taille est la plus raccourcie, ont en moins ce que les Patagons offrent en plus; elle ne va pas au delà de quatre pieds à quatre pieds et demi. Au milieu de nos sociétés, quelques individus s'élèvent de temps à autre assez au-dessus de la hauteur commune pour mériter le nom de géans, tandis que d'autres, rapetissés dans toutes leurs proportions, offrent l'image des pygmées. Tel étoit, parmi ceux-ci, Bébé, nain de Stanislas, roi de Pologne; et parmi les premiers, Goliath, dont il est parlé au livre des Rois, chapitre XVII, verset 4; le roi Og, également cité dans l'Écriture (Deutéronome, chapitre III, verset 2), et plusieurs autres, dont la taille varie entre un mètre 943 millimètres à 3 mètres 247 millimètres (6 et 10 pieds) de hauteur.

CCXXXVI. *De la vieillesse et de la décrépitude.* Le corps humain, qui, dès la vingtième année de la vie, a cessé de croître en hauteur, augmente dans toutes ses autres dimensions pendant les vingt années qui suivent; après quoi, loin de s'accroître, il dépérit, et perd chaque jour des forces qu'il avoit acquises. Le décroissement suit la même marche que l'accroissement; il n'est pas plus rapide, puisque l'homme, qui met de trente

à quarante années pour arriver à l'apogée de sa vigueur, emploie un même espace de temps pour descendre vers la tombe, lorsque aucun accident ne l'y précipite et ne hâte sa mort (1). Le volume total du corps diminue, le tissu cellulaire s'affaisse, la peau se ride, principalement celle du front et du visage; les cheveux et les autres poils grisonnent, puis blanchissent; l'action organique devient languissante; les humeurs sont plus disposées à la putréfaction (Hunter); aussi toutes les maladies par débilité sont-elles et plus graves et plus fréquentes.

La diminution du volume total du corps, chez les vieillards, fait souvent place à une augmentation réelle. L'individu croît en embonpoint; mais le système graisseux est le siége exclusif de ce développement : il paroît résulter d'un défaut de forces suffisantes pour l'assimilation complète de la matière nutritive, et dépendre du ralentissement que le sang éprouve dans son cours, retardation progressive, dont l'effet nécessaire est la prédominance encore plus marquée de l'hydrogène et du carbone dans le sang veineux. Cette

(1) La durée de la vie peut se mesurer par celle de l'accroissement. Un chien, qui ne croît que pendant deux ou trois années; ne vit que dix ou douze; l'homme, qui est trente ans à croître, vit quatre-vingt-dix ou cent ans. Les poissons vivent des siècles, parce qu'ils mettent à se développer un grand nombre d'années, etc.

grosseur, acquise par l'effet de l'embonpoint chez les personnes avancées en âge, est loin d'être favorable à l'exercice libre, régulier et facile des fonctions; certains organes surchargés de graisse paroissent comme embarrassés d'un poids incommode, cause nouvelle de lenteur et d'embarras dans les mouvemens organiques : aussi a-t-on cru remarquer qu'en général la maigreur est, chez les vieillards, préférable à l'embonpoint; qu'elle est pour eux un gage plus assuré de longévité.

La caducité succède à la vieillesse. La sensibilité des organes est émoussée; les forces morales et physiques baissent sensiblement : l'homme cesse d'être affecté de la même manière par les corps qui l'environnent; il porte sur ce qui l'émeut des jugemens faux, parce que, son amour-propre l'empêchant de tenir compte des changemens qu'il a subis, il aime mieux attribuer à une dégénération universelle la différence qui existe entre les sensations qu'il éprouve maintenant et celles qu'il éprouvoit dans les temps de sa jeunesse : *Laudator temporis acti.* Les digestions sont mauvaises, le pouls foible et tardif, l'absorption difficile par la presque oblitération des vaisseaux lymphatiques, et le durcissement des glandes conglobées, les sécrétions languissantes; la nutrition imparfaite. Le vieillard met de la lenteur dans toutes ses actions, de la roideur dans tous ses mouvemens : ses cheveux tombent, ses dents abandonnent leurs alvéoles; les cartilages s'ossifient; les

os poussent des végétations irrégulières, et se soudent les uns aux autres; leur cavité intérieure s'agrandit; tous les organes s'appauvrissent; les fibres se dessèchent et se racornissent. Les os deviennent plus légers : comme tous les autres tissus, ils perdent plus qu'ils ne réparent, s'amincissent, et cette espèce de consomption est surtout marquée dans les os du crâne, que les mouvemens continuels du cerveau usent et détruisent en quelque sorte par leur surface intérieure (CXLIX).

L'ossification de certains cartilages, tels que ceux des côtes et des vertèbres, a des effets remarquables. Les côtes, se soudant en quelque manière au sternum, n'éprouvent plus qu'imparfaitement le double effet d'élévation et de torsion (LXXI), d'où résulte l'agrandissement de la poitrine. Cette cavité se dilatant moins amplement, les combinaisons pulmonaires, sources abondantes de la chaleur animale, s'effectuent moins pleinement; ce qui, joint au défaut de ton et d'énergie dans les poumons et tous les organes, fait que la température du corps, quoi qu'en ait dit De Haën, baisse un peu dans la vieillesse, comme c'étoit l'avis du père de la médecine (1).

Ces lames fibro-cartilagineuses, à fibres obliques et croisées, qui unissent si fortement ensemble les corps des vertèbres, se durcissent, se

---

(1) *Senibus autem modicus est calor..... frigidum est enim ipsorum corpus.* Hipp. aph. 14, sect. 2.

dessèchent, se racornissent, s'affaissent sous le poids du corps, et ne se rétablissent plus dans leur première épaisseur; de manière que la stature baisse, que le corps se raccourcit et décroît véritablement; en outre l'affoiblissement des muscles érecteurs du tronc fait que le poids des viscères courbe en avant la colonne vertébrale, dont les diverses pièces peuvent se souder dans cette attitude, de manière que toute la colonne, formée de vingt-quatre vertèbres, se réduise à sept ou huit os bien distincts. Il ne faut cependant point croire que toutes les parties molles deviennent plus compactes; car plusieurs, telles que les muscles, se ramollissent (1), comme l'a observé Haller, et semblent, en perdant de leurs propriétés vitales, incliner vers une prochaine dissolution; ni que la mort soit uniquement due à l'accumulation du phosphate calcaire, qui se dévie sur tous les organes, ossifie les vaisseaux, et enraie le jeu de tous les rouages de la machine animée. Si cette matière terreuse envahit toutes les parties du système animal, c'est que les forces digestives, graduellement affoiblies, cessent de frapper les substances alimentaires du caractère qui leur convient. L'exubérance des sels calcaires est donc moins la cause

---

(1) *Non ergò in solâ rigiditate causam senii mortis oportet ponere; nam ex defectu irritabilitatis, plurimi in senibus musculi languent, mollesque pendent.* Elem. phys., t. VIII, in-4°, lib. xxx.

que l'effet de la destruction successive des puissances vitales.

La lenteur, la roideur, la difficulté des mouvemens, ne tiennent point, autant qu'on le pense, au durcissement des ligamens et des autres organes fibreux : les ligamens se relâchent et se ramollissent au point qu'il est plus facile d'effectuer des luxations sur les cadavres des personnes avancées en âge. Chez elles aussi, des organes consistans dans la jeunesse deviennent flasques et mous; tel le cœur, qui s'affaisse sur lui-même chez les vieillards, tandis que ses cavités se conservent, leurs parois ne se rapprochant point tout-à-fait chez les jeunes gens et chez les adultes.

Le cerveau devient plus dur, plus consistant, moins soluble dans les alkalis; son albumine paroît plus complétement oxidée que celle des jeunes sujets; les impressions y sont plus difficiles, et les mouvemens nécessaires aux opérations de l'intelligence s'exécutent avec peine. Ainsi, dans la décrépitude, l'homme moral descend à une seconde enfance; borné à quelques souvenirs qui, bientôt confus, finissent par disparoître, incapable de juger et de vouloir, fermé à de nouvelles impressions, le sommeil reprend son empire; réduit à une existence végétative, il dort la plus grande partie de la journée, ne se réveille que pour satisfaire à ses besoins physiques, pour prendre des alimens qu'il digère toujours mal; car d'abord le défaut de dents l'empêche d'en diviser assez les

molécules; en second lieu, les sources de la salive, des sucs gastriques et intestinaux, sont presque taries, la bile et toutes les liqueurs ont moins d'activité, le tube intestinal est sans vigueur et sans force. On regardera la rigidité universelle comme une des principales causes de la mort, si l'on fait attention que les femmes, dont les organes, naturellement plus mous, arrivent plus tard à cet état, sont plus vivaces que les hommes, et offrent des exemples plus nombreux de longévité.

Le corps meurt donc peu à peu et par degrés, dit l'éloquent M. de Buffon; la vie s'éteint par nuances successives, et la mort n'est que le dernier terme de cette suite de degrés, *la dernière nuance de la vie.*

CCXXXVII. *De la mort.* Long-temps, en effet, avant le terme de sa fin naturelle, l'homme est privé de la faculté de se reproduire; et, dans le cours de l'agonie plus ou moins prolongée qui sert de passage entre la vie et la mort, ce sont d'abord les organes des sens qui deviennent insensibles à toutes sortes d'impressions; les yeux s'obscurcissent, la cornée se flétrit, les paupières se ferment, la voix s'éteint, les membres et le tronc sont sans mouvement, et cependant la circulation et la respiration continuent à s'exécuter : elles finissent par s'éteindre, la première d'abord dans les vaisseaux éloignés du cœur, puis, de proche en proche, le sang s'arrête dans les troncs voisins

de cet organe. La respiration, graduellement ralentie, étant tout-à-fait suspendue après une forte expiration (1), les poumons ne donnent plus passage à celui que les veines rapportent de toutes parts au cœur. Ce liquide séjourne dans les cavités droites de cet organe, qui meurent les dernières (*ultimum moriens*), et, se laissant distendre par le sang qui s'y accumule, acquièrent une capacité bien supérieure à celle des cavités gauches, qui se vident d'une manière plus ou moins complète.

Tel est le mécanisme suivant lequel s'accomplit la mort naturelle. Le cerveau ne reçoit dejà plus du cœur affoibli une quantité de sang assez considérable pour que la sensibilité subsiste; il reste encore un peu de contractilité dans les muscles respiratoires; elle se consume, et le mouvement circulatoire du sang s'arrête avec la vie de tous les organes, dont ce liquide est un des principaux moteurs.

Quant à la mort accidentelle, c'est toujours la cessation de l'action du cœur et du cerveau qui la détermine; car la mort des poumons n'entraîne celle de tout le corps qu'en empêchant l'action du

---

(1) Cette puissante et dernière expiration, que souvent le soupir accompagne, dépend-elle de la contraction spasmodique des muscles expirateurs? ou ne tient-elle pas plutôt à la réaction des pièces élastiques qui entrent dans la composition de la poitrine, réaction qui cesse tout à coup d'être contre-balancée par les propriétés vitales?

cœur, en interrompant son influence sur l'organe encéphalique. La vie s'éteint donc de la circonférence au centre, dans la mort naturelle : la mort accidentelle frappe, au contraire, le centre avant les extrémités.

L'ouvrage de Bichat (*Recherches sur la vie et sur la mort*) laisse peu de choses à désirer sur la manière dont les organes de l'économie animale cessent d'agir à notre dernière heure; mais cet auteur, comme tous ceux qui l'ont précédé, a borné ses recherches à certaines fonctions; aucun d'eux n'a essayé de les étendre jusqu'aux phénomènes de l'action cérébrale, et n'a tracé l'ordre suivant lequel s'évanouissent les diverses facultés des sensations et de la pensée. Je vais, historien fidèle, exposer les résultats de plusieurs centaines d'observations que j'ai faites sur cet objet.

Les phénomènes par lesquels a commencé la vie sont aussi ceux par lesquels elle s'achève. La circulation s'est offerte la première; elle est aussi la dernière qui s'exécute. Les battemens de l'oreillette droite sont le premier mouvement qu'on observe sur l'embryon; c'est aussi le dernier que l'on aperçoit chez l'agonisant. Les phénomènes nutritifs auxquels l'existence du fœtus est, comme on l'a dit, presque entièrement bornée, continuent encore lorsque les organes destinés à nous mettre en rapport avec les êtres qui nous environnent sont plongés depuis long-temps dans un sommeil dont ils ne se réveilleront plus.

Voici l'ordre dans lequel les facultés intellectuelles cessent et se décomposent (1). La raison, cet attribut dont l'homme se prétend le possesseur exclusif, l'abandonne la première. Il perd d'abord la puissance d'associer des jugemens, et bientôt après celle de comparer, d'assembler, de combiner, de joindre ensemble plusieurs idées pour prononcer sur leurs rapports. On dit alors que le malade perd la tête, qu'il déraisonne, qu'il est en délire. Celui-ci roule ordinairement sur les idées les plus familières à l'individu; la passion dominante s'y fait aisément reconnoître. L'avare tient sur ses trésors enfouis les propos les plus indiscrets; tel autre meurt assiégé de religieuses terreurs. Souvenirs délicieux de la patrie absente, vous vous réveillez alors avec tous vos charmes et dans toute votre énergie!

Après le raisonnement et le jugement, c'est la faculté d'associer des idées qui se trouve frappée de la destruction successive. Ceci arrive dans l'état connu sous le nom de *défaillance*, comme je l'ai éprouvé sur moi-même. Je causois avec un de mes

---

(1) Il n'est pas besoin d'avertir le lecteur qu'il n'est point ici question de l'âme immortelle; de cette émanation divine qui survit à la matière, et, dégagée des liens qui l'unissoient à cette portion périssable de nous-mêmes, revole au sein de l'Éternel. On parlera seulement des facultés intellectuelles communes à l'homme et aux animaux qui, comme lui, ont un cerveau.

amis, lorsque j'éprouvai une difficulté insurmontable à joindre deux idées sur la ressemblance desquelles je voulois former un jugement; cependant la syncope n'étoit pas complète, je conservois encore la mémoire et la faculté de sentir, j'entendois distinctement les personnes qui étoient autour de moi dire, *il s'évanouit*, et s'agiter pour me faire sortir de cet état, qui n'étoit pas sans quelque douceur.

La mémoire s'éteint ensuite. Le malade qui, dans son délire, reconnoissoit encore ceux qui l'approchoient, méconnoît enfin ses proches, puis ceux avec lesquels il vivoit dans une grande intimité.

Enfin il cesse de sentir; mais les sens s'éteignent dans un ordre successif et déterminé: le goût et l'odorat ne donnent plus aucun signe de leur existence; les yeux se couvrent d'un nuage terne et prennent une expression sinistre; l'oreille est encore sensible aux sons et au bruit. Voilà pourquoi sans doute les anciens, pour s'assurer de la réalité de la mort, étoient dans l'usage de pousser de grands cris aux oreilles du défunt. Le mourant ne flaire, ne goûte, ne voit et n'entend plus, qu'il lui reste la sensation du toucher; il s'agite dans sa couche, promène ses bras au dehors, change à chaque instant de posture; il exerce, comme nous l'avons déjà dit, des mouvemens analogues à ceux du fœtus qui remue dans le sein de sa mère. La mort qui va le frapper ne peut lui inspirer aucune

frayeur, car il n'a plus d'idées, et il finit de vivre comme il avoit commencé, sans en avoir la conscience.

CCXXXVIII. *Époque de la mort.* Elle est à peu près la même pour tous les hommes, qu'ils vivent près des pôles ou sous l'équateur, qu'ils n'usent que d'alimens végétaux ou qu'ils se nourrissent exclusivement de chair, qu'ils mènent une vie laborieuse ou qu'ils consument leur existence dans une paresse honteuse et dans une coupable oisiveté, on n'en voit guère qui prolongent leur carrière au delà de la centième année. On possède cependant plusieurs observations d'hommes qui l'ont poussée bien au delà; tels ces vieillards dont il est fait mention dans les Transactions philosophiques, et dont l'un a vécu cent soixante-cinq ans. Le plus grand nombre ne finit pas la révolution séculaire, et la mort, même naturelle, nous atteint de la soixante-quinzième à la centième année.

La différence des climats, qui n'en produit aucune dans la durée de la vie, jouit cependant d'une influence bien prononcée sur la rapidité de l'accroissement. La puberté, l'âge viril, la vieillesse, arrivent beaucoup plus tôt dans les pays chauds que dans les contrées septentrionales; mais ce développement précoce, qui abrége la durée des premières périodes de la vie, augmente proportionnellement celle de la vieillesse.

Il est, au reste, difficile de dire à quelle époque commence précisément ce dernier âge. Est-ce vers

la quarantième année, lorsque le corps commence à décroître et à s'affoiblir? Prendra-t-on le changement de couleur des cheveux comme le signe certain de la vieillesse? Mais on voit chaque jour des jeunes gens blanchir avant l'âge. S'en tiendra-t-on à la cessation des fonctions génitales, à l'impossibilité de se reproduire? Mais la fécondité, dont le terme, marqué par la cessation de l'excrétion menstruelle, est si facile à fixer chez la femme, n'a rien de certain, pour sa durée, chez l'homme; l'émission de la liqueur séminale n'en est pas un signe assuré, par la difficulté qu'il y a de distinguer les mucosités des vésicules et l'humeur que fournit la prostate, du sperme vraiment prolifique. L'érection n'en est pas non plus un symptôme plus sûr, cet état pouvant dépendre de quelque irritation sympathique, de la compression des vésicules par la vessie pleine d'urine. Il est plus difficile qu'on ne pense de constater par l'observation l'âge auquel les mâles, dans l'espèce humaine, sont tout-à-fait privés du pouvoir d'engendrer; et l'on peut dire qu'en fixant de quarante-cinq à cinquante-cinq ans, pour nos climats, le commencement de la vieillesse, il est cependant des individus vieux avant cet âge, comme on en voit qui, après cinquante-cinq ans, offrent tous les attributs de la virilité. L'époque climatérique de soixante-trois ans est celle de la vieillesse, confirmée ou décidée. Quelles que soient les précautions dont il ait usé dans le régime, tout homme est

vieux à cet âge ; et il lui est impossible de se le dissimuler.

CCXXXIX. *Probabilités de la vie humaine.* L'homme meurt à tout âge ; et si la durée de sa vie surpasse celle des animaux, la multitude des maladies auxquelles il est exposé la rend bien plus incertaine, et fait que le plus petit nombre arrive au terme naturel de l'existence. On a cherché à connoître les probabilités de la vie, c'est-à-dire à constater par l'observation combien d'années peut encore espérer celui qui en a déjà un nombre déterminé. D'après des recensemens faits avec le plus grand soin, de l'âge auquel sont morts un grand nombre d'individus, et la comparaison du nombre des décès avec celui des naissances, on est parvenu à constater que le quart environ des enfans meurt dans les premiers onze mois de la vie ; le tiers avant vingt-trois mois; la moitié à peu près avant d'avoir atteint l'âge de huit ans. Les deux tiers du genre humain périssent avant la trente-neuvième année, les trois quarts avant la cinquante-unième; en sorte que, comme l'observe Buffon, de neuf enfans qui naissent, un seul arrive à soixante et dix ans ; de trente-trois, un seul à quatre-vingts ; tandis que, sur deux cent quatre-vingt-onze, un seul se traîne jusqu'à quatre-vingt-dix ans : et enfin un seul, sur onze mille neuf cent quatre-vingt-seize, languit jusqu'à cent ans révolus.

Le terme moyen de la vie est de huit ans, suivant le même auteur, dans un enfant qui vient de

naître. A mesure qu'il avance en âge, son existence devient plus assurée, et, lorsqu'il a passé sa première année, il peut raisonnablement espérer de vivre jusqu'à la trente-troisième. La vie s'affermit de plus en plus jusqu'à sept ans, âge auquel l'enfant qui a résisté aux orages de la première dentition, peut compter sur quarante-deux ans et trois mois de vie. Après cette époque, la somme des probabilités, jusqu'alors graduellement accrue, éprouve une diminution progressivement décroissante; en sorte que l'enfant qui a atteint sa quatorzième année, ne doit plus espérer que trente-sept années et cinq mois ; l'homme de trente ans, vingt-huit ans encore; et enfin celui de quatre-vingt-quatre ans, une seule année. De la quatre-vingt-cinquième à la quatre-vingt-dixième, la probabilité reste stationnaire; mais, passé ce temps, l'existence est on ne peut plus précaire, et se traîne péniblement jusqu'à sa fin. Tel est le résultat moyen des observations et des calculs sur les divers degrés de probabilité de la vie humaine, faits par Halley, Grant, Kersboom, Wargentin, Symson, Desparcieux, Dupré de Saint-Maur, Buffon, d'Alembert, Barthez et Mourgues.

Des observations faites dans le cours de ces derniers temps il résulte que la durée moyenne de la vie humaine s'est accrue de deux à trois années. C'est à la vaccine qu'est due cette amélioration. L'introduction de cette pratique salutaire, la suppression du célibat monastique, jointes à

quelques autres influences morales, ont jusqu'ici préservé la population européenne d'une diminution sensible, malgré les causes qui, depuis un certain nombre d'années, tendent si efficacement à en arrêter les progrès. Bien plus la nation française, qui, vers la fin du dix-huitième siècle, et surtout pendant les premières années du dix-neuvième, a vu l'élite de sa population moissonnée par la faux de la guerre, présente, durant les vingt-cinq années qui viennent de s'écouler, un accroissement incontestable dans le nombre des individus qui la composent. Les dénombremens les plus exacts, faits au commencement de la révolution (1789), donnent à peine vingt-cinq millions d'habitans pour la France entière, peuplée de trente et un à trente-deux millions en 1824, après un tiers de siècle écoulé au milieu des troubles de la guerre et des agitations de la politique (1).

---

(1) *Voyez*, pour la population de la France en 1824, l'Annuaire publié par le bureau des longitudes pour la même année. L'introduction de la vaccine, la suppression du célibat monastique, ne suffisent pas à l'explication d'un tel phénomène; il faut y joindre la division des propriétés opérée par la vente des biens dits *nationaux*, division qui a multiplié les propriétaires dans la classe des cultivateurs, et de plus l'essor vraiment prodigieux de l'industrie et de l'activité nationales. Doit-on ajouter l'énorme consommation d'hommes qu'entraînoit un état de guerre habituel? En seroit-il de l'espèce humaine comme de toutes les autres productions, dont la masse augmente avec les demandes et les besoins des consomma-

Nous entrerions dans de plus grands détails sur cet objet, s'ils n'appartenoient bien plus encore à la science de l'économie politique qu'à celle de l'économie animale.

Les calculs sur les probabilités de la vie humaine offrent-ils des résultats généralement applicables ? et la durée moyenne de l'existence est-elle à peu près la même pour les hommes de tous les pays et de tous les climats ? Le pâtre des Pyrénées, qui coule d'heureux jours dans l'innocence de la vie pastorale, respirant l'air pur de ses montagnes, est-il, sous ce rapport, sujet aux mêmes lois que l'habitant des cités populeuses, soumis à tous les inconvéniens attachés à ces grandes réunions d'hommes; inconvéniens qui, philosophiquement appréciés, ou bien emphatiquement exagérés, ont tant de fois servi de texte aux utiles réflexions des sages comme aux vaines déclamations des rhéteurs?

Pour résoudre ces questions d'une manière satisfaisante, il seroit nécessaire d'avoir sous les yeux et de comparer des tables de mortalité dressées avec soin en divers lieux de la terre; mais les préjugés religieux opposent d'invincibles obstacles à de semblables recherches dans les vastes contrées soumises au joug de l'islamisme, et la statistique

---

teurs? ou bien enfin, les sociétés humaines ressembleroient-elles à ces animaux dont les garennes ou les volières se dépeuplent, si l'on néglige d'en enlever périodiquement un certain nombre d'individus ?

est peu cultivée dans le midi de l'Europe. Cependant, à en juger par les résultats obtenus dans le nord, les pays septentrionaux sont ceux où l'homme vit le plus long-temps. Les tables de mortalité de l'empire russe pour l'année 1811 offrent, sur huit cent vingt-huit mille cinq cent soixante et un individus décédés, appartenant à l'église grecque, neuf cent quarante-sept centenaires, parmi lesquels il s'est trouvé quatre-vingt-trois vieillards âgés de plus de cent quinze ans, cinquante et un qui avoient dépassé cent vingt ans, vingt et un au delà de cent vingt-cinq, sept qui avoient plus de cent trente ans, un cent trente-cinq, et un autre cent quarante. Cette prolongation de la vie humaine au delà de son terme ordinaire dans les pays du nord nous paroît tenir à l'influence du climat. C'est en retardant l'accroissement du corps que cette influence en prolonge la durée. L'habitant du midi arrive plus promptement au terme de son développement complet, vieillit de bonne heure, et doit mourir plus tôt. Dans cette multitude d'hommes du nord que les événemens de la guerre ont amenés parmi nous, les hommes de quarante à cinquante ans paroissoient en général avoir à peine accompli leur sixième lustre. Ajoutez à cette influence du climat favorable à la longévité l'habitude contractée de bonne heure des variations de la température (1), variations subites, chez nous

(1) Prolégomènes, tome I, page 100.

si souvent mortelles pour les personnes avancées en âge.

Enfin la durée de la vie éprouve-t-elle une diminution progressive à mesure que les siècles se succèdent? et, sans parler des temps antérieurs au déluge, époque à laquelle, suivant la Genèse, les hommes poussoient leur carrière au delà de plusieurs centaines d'années, les hommes d'autrefois vivoient-ils plus long-temps que ceux de notre âge? Rien n'est moins fondé qu'une semblable croyance; les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs et les Romains, voyoient parmi eux un très-petit nombre de centenaires, et les exemples de longévité sont peut-être moins rares chez les modernes.

L'art usuel de la vie faisant chaque jour d'incontestables progrès, il n'est pas hors de toute probabilité que, loin de s'abréger, le terme de la vie humaine ne puisse être reculé d'une certaine quantité d'années au delà de la durée actuelle et ordinaire. Cette idée est, à la vérité, contraire à l'opinion assez répandue de la dépravation successive de l'espèce humaine dans la suite des âges; mais l'âge d'or n'exista jamais que dans l'imagination des poëtes; et les plaintes chaque jour proférées par la vieillesse chagrine naissent d'un motif facile à apprécier pour le physiologiste. Celui dont les années ont émoussé le sentiment est affecté d'une manière bien différente par tous les objets qui l'environnent. Pour le vieillard, les fleurs ont perdu leur parfum et leur éclat, les fruits leur saveur;

toute la nature semble triste et décolorée. Mais la cause de ces changemens est en lui; autour de lui tout est resté le même. Toujours également féconde, la nature fait passer tous les êtres dans son inépuisable creuset, éternise sa jeunesse, et conserve une fraîcheur toujours nouvelle. Les individus meurent, les espèces se perpétuent; partout la vie naît au sein de la mort; les matériaux des corps organisés entrent dans d'autres combinaisons, et servent à la formation de nouveaux êtres, lorsque, la vie cessant d'animer ceux auxquels ils ont appartenu, la putréfaction s'en est emparée pour les détruire.

CCXL. *De la putréfaction.* Ici devroit se terminer l'histoire de la vie : cependant, si l'on fait attention que les changemens qu'éprouvent, après sa privation, les corps qui en ont joui, jettent une grande lumière sur ses moyens, ses fins et sa nature, on sentira la nécessité de jeter un coup d'œil rapide sur les phénomènes qui accompagnent la décomposition du corps; il ne cesse d'appartenir à la physiologie que lorsque son aspect ne peut plus réveiller l'idée de son état antérieur, qu'après que les derniers linéamens de l'organisation sont complétement effacés. Aussitôt que la vie abandonne les organes, ils rentrent sous l'empire des lois physiques, auxquelles obéissent pleinement tous les corps non organisés. Un mouvement intestin s'établit dans leur substance, et leurs molé-

cules ont une tendance d'autant plus forte pour s'abandonner, que leur composition est plus avancée. La chimie apprend que l'altérabilité des corps est en raison directe de la multiplicité de leurs élémens, et que l'existence cadavérique d'un être organisé se prolonge d'autant plus que sa composition est plus simple, ses principes constituans moins nombreux et moins volatils.

Pour que la putréfaction s'établisse dans le corps humain, il doit être absolument privé de la vie; car les forces qui l'entretiennent sont l'antiseptique le plus puissant; et l'on pourroit soutenir que cet état n'est autre chose qu'une lutte permanente contre les lois physiques et chimiques. Cette résistance vitale, exprimée par les anciens, lorsqu'ils disoient que les lois du petit monde (microcosme) étoient en perpétuelle contradiction avec celles du grand monde, qui finissoient par l'emporter; cette force, toujours réagissante, se manifeste par la vie: celle-ci, si l'on n'avoit égard qu'aux résultats, pourroit donc être définie *la résistance qu'opposent les corps organisés aux causes qui tendent sans cesse à les détruire.* Que l'on examine tous ses phénomènes, et l'on verra que tous, dirigés vers le but de sa conservation, ne le remplissent qu'en soutenant une lutte continuelle avec les lois qui régissent les corps inorganiques.

Aussi Bichat a-t-il cru pouvoir définir la vie, *l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort;* mais cette résistance est elle-même un effet de la

vie ; de la vie, ce résultat de causes ignorées que l'on appelle *forces vitales?* Les physiologistes qui regardent la vie comme une puissance, une force, parce que ce mot dérive du terme *vis* des Latins, ne s'aperçoivent point qu'ils donnent d'un problème physiologique une solution purement grammaticale. La, vie comme nous l'avons dit en commençant cet ouvrage, consiste dans cette succession de phénomènes coordonnés que nous présentent certains corps de la nature durant la plus grande partie de leur existence. Ces phénomènes viennent-ils à s'interrompre, l'anéantissement suivra bientôt leur cessation.

On s'étonneroit peut-être de trouver dans la mort la plus juste idée de la vie, si l'on ne savoit que ce n'est qu'en comparant que nous pouvons distinguer, juger et connoître.

Entièrement dépouillé par la mort de ses propriétés vitales, le cadavre jouit encore des propriétés de tissu, et celles-ci ne disparoîtront qu'au moment où l'organisation à laquelle elles sont intimement liées s'effacera par l'effet de la putréfaction. Favorisée ou retardée par diverses circonstances, celle-ci s'empare enfin des membres, dans lesquels se dissipe la roideur cadavérique, dernier effet de la contractilité de tissu qui s'anéantit avec l'organisation.

La roideur cadavérique ne nous paroît pas cependant, ainsi que le veut M. Nysten, pouvoir être regardée comme le signe le plus certain de la

mort; tant d'autres causes, le froid extérieur, la nature de la maladie, peuvent donner lieu à ce phénomène, que la putréfaction reste, selon nous, la seule preuve infaillible de l'impossibilité de rappeler un cadavre à la vie. Un fait assez récent nous a confirmé dans cette doctrine. M. Thouret, ancien doyen de la Faculté de Médecine de Paris, s'étoit long-temps occupé de questions de cette nature. Chargé par le gouvernement de diriger l'exhumation des cadavres du cimetière des Innocens, il s'étoit trouvé conduit à approfondir toutes les questions relatives à l'état de cadavre : eh bien! après une vie presque tout entière consacrée à l'étude de la mort, ce savant, doué d'un esprit étendu autant que solide, reste convaincu que la putréfaction peut seule nous fournir la certitude de cet état, et prescrit par ses dispositions testamentaires, religieusement exécutées, qu'on ne procède à son inhumation qu'au moment où son corps donnera des signes évidens de fermentation putride.

La putréfaction ne s'établit, ne s'opère, ne s'achève que dans les substances mortes. Un membre gangrené perd la vie avant que la putréfaction s'en empare; et si la nature conserve assez de force pour s'opposer à ce mouvement contraire, elle pose, par un cercle inflammatoire, la ligne de démarcation entre le vif et le mort. Vie et putréfaction sont donc deux idées absolument contradictoires; et lorsque, dans quelques maladies,

on remarque une certaine tendance des parties solides et fluides à la décomposition spontanée, il ne faut point confondre cette tendance à la putridité avec la putridité elle-même.

Dans les maladies appelées *putrides*, l'odeur particulière et fétide qu'exhalent les matières fécales, les urines, les sueurs, et en général tout le corps des malades, a fait croire long-temps à une dissolution putride des élémens dont sont formés nos humeurs et nos solides. Mais ces humeurs excrémentitielles sont en quelque sorte hors du domaine de la vie, lorsqu'elles éprouvent ce commencement de fermentation septique; les matières fécales et les urines amassées dans leurs réservoirs frappés d'adynamie, l'humeur de la transpiration déposée à la surface de la peau, peuvent obéir à l'empire des forces chimiques. L'élimination de ces matières étrangères se trouve presque achevée; le sang, soumis à l'influence des forces vitales, n'a jamais offert des signes de putréfaction. « Com-
« bien donc étoit vaine la prétention des médecins
« chimistes dans l'emploi des médicamens anti-
« putrides, qu'ils regardoient comme propres à
« neutraliser les effets de la putréfaction en se com-
« binant avec les matières dans lesquelles on la
« supposoit déjà existante.....
« Internes ou topiques, tous les médicamens
« n'agissent que par l'entremise des forces vitales
« sur les organes, dont ils augmentent, dimi-
« nuent, accélèrent, retardent, intervertissent,

« régularisent, éteignent ou rétablissent l'ac-
« tion (1). »

Plusieurs conditions sont nécessaires pour que la putréfaction s'empare du corps humain privé de vie : 1° une température douce, c'est-à-dire au-dessus de dix degrés du thermomètre de Réaumur; 2° une certaine humidité; 3° le contact de l'air. Mais cette dernière condition n'est point indispensable comme les deux autres, puisque les corps pourissent dans le vide, quoique d'une manière plus lente. L'air favorise donc seulement la décomposition, en volatilisant les élémens qui s'élèvent en vapeurs. Au contraire, un froid glacial, ou une chaleur excessive et voisine du degré d'ébullition l'empêchent, le premier, en condensant les parties ; la seconde, en leur enlevant cette humidité dont l'absolue privation explique la conservation des momies égyptiennes.

Les phénomènes de la putréfaction, résultant d'une série d'attractions particulières, se modifient diversement, selon les matières animales qui l'éprouvent, les milieux dans lesquels elle s'opère, les différens degrés de température et d'humidité, et même suivant ses différentes périodes. Nonobstant ces innombrables variétés, on peut dire que toutes en général laissent d'abord exhaler l'odeur de *relent* ou de cadavre, se ramollissent, augmen-

---

(1) Erreurs populaires relatives à la médecine, deuxième édition, page 178.

tent de volume, s'échauffent, changent de couleur, verdissent, passent du vert au bleu, et de celui-ci au brun noirâtre; elles laissent en même temps dégager un grand nombre de produits gazeux, parmi lesquels l'ammoniaque tient le premier rang, soit par sa quantité, soit parce que la matière animale en fournit depuis l'instant où son altération commence jusqu'à celui de sa dissolution la plus complète. C'est à ce gaz qu'est due l'odeur piquante et septique que répandent les cadavres.

Vers la fin de la putréfaction, il se dégage du gaz acide carbonique, qui, s'unissant à l'ammoniaque, forme un sel fixe et cristallisable. A ces produits s'ajoutent l'hydrogène phosphoré, sulfuré, azoté, carboné, et toutes les matières qui peuvent résulter de leurs combinaisons respectives. Enfin la matière animale, réduite à un résidu qui contient des huiles et des sels de différentes espèces, forme un terreau dans lequel les plantes puisent les principes d'une végétation très-riche et très-vigoureuse. Les os, ces parties les moins altérables de la machine organisée, se dessèchent à la longue par la combustion lente de leur partie fibreuse et l'évaporation des sucs médullaires. Enfin, réduits à un squelette terreux, ils tombent en poussière, et cette poussière se dissipe lorsqu'on ouvre les tombeaux qui les recèlent.

C'est ainsi que s'efface à la longue tout ce qui pouvoit rappeler l'idée de notre existence matérielle.

La putréfaction, philosophiquement envisagée, paroît un moyen employé pour ramener nos organes privés de la vie à une composition plus simple, afin que leurs élemens puissent être employés à de nouvelles créations (*circulus æterni motûs*) (1). Rien n'est donc mieux prouvé que la métempsycose de la matière (2); ce qui autorise à croire que ce dogme religieux, comme la plupart des cultes et des conceptions fabuleuses de l'antiquité, n'est qu'un voile mystérieux, adroitement jeté par la philosophie entre le vulgaire et la nature.

---

(1) Becker, *Physica subterranea.*

(2) La matière est éternelle en ce sens, que les molécules des corps ne font que passer de l'un à l'autre; elles survivent à la destruction ou plutôt à la dissolution des êtres inorganiques et organisés, lorsque ces derniers, cessant de vivre, rendent au fonds inépuisable de la nature ces élémens qu'elle prête toujours et n'aliène jamais.

Mancupio nulli datur, omnibus usu.

LUCRET., lib. III.

FIN.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME.

CHAPITRE VII.

Des Sensations.

Fonctions qui servent à la conservation de l'individu, en établissant ses rapports avec les êtres qui l'environnent. Des sensations, *pag.* 2. Succession naturelle des phénomènes du sentiment, 3.

De la lumière et des couleurs, 3-6. Organe de la vue, 7. Il est formé de trois parties bien distinctes, 8. Usages des sourcils, des paupières et des voies lacrymales, 9-16 Globe de l'œil, sa structure, 17-23. Mécanisme et phénomènes de la vision; la surface de la rétine est d'autant plus étendue, que l'animal a un champ de vision moins limité, 24. Mouvemens de l'iris, 25. Réfraction des rayons lumineux par les membranes et par les humeurs de l'œil; situation renversée dans laquelle les objets se peignent sur la rétine; point de vision distincte, 28. Strabisme, myopie, presbytie, nyctalopie, héméralopie, goutte sereine, 27-32. Autres affections de l'organe de la vue; de la décoloration de la choroïde chez les vieillards, 34. Du développement des yeux et de leurs mouvemens, 35. Erreurs dans lesquelles le sens de la vue nous entraîne, 36. Différence qu'il présente dans les divers animaux, 37.

Organe de l'ouïe; du son, 41. Structure de l'oreille externe, moyenne et interne; mécanisme de l'audition, 44-48. Diffé-

rence de cet organe dans les animaux, 54. Maladies de l'ouïe; surdité, 56-58.

Des odeurs, 57. Classification de Linné, de Lorry et de Fourcroy, 60. Organe de l'odorat, 61. Sensation des odeurs, 65.

Des saveurs, 66. Divisions admises par Boerhaave, Haller et Linné, *ibid.* Leurs différences tiennent à la nature particulière des corps, et non à la forme de leurs molécules; tout corps insoluble est insipide; sens du goût, 67. De la langue et de ses papilles nerveuses, 68. De l'organe du goût, considéré dans les différens animaux, *ibid.* Des usages attribués aux nerfs de la langue, 70. Expériences galvaniques à ce sujet, *ibid.* Les trois nerfs de la langue ont des fonctions distinctes, 71. Symétrie de cet organe, 73.

Du toucher, 74. De sa certitude et de ses erreurs, 75. Des tégumens, 76. Panicule graisseux; panicule charnu; derme; réseau muqueux de Malpighi; épiderme, 70. Il est le résultat d'une véritable excrétion, 80. Huile cutanée, 81. Des ongles 84. Des cheveux et des poils, 88. De la main; siége d'un toucher plus délicat, 95. Sens du toucher comparé dans les divers animaux, 97. Prééminence du toucher, 99.

Des nerfs, 101. De leur origine dans les parties sensibles; des rapports qui existent entre la nature de leurs fonctions et le degré de leur consistance, 102. De leur structure, 103. Opinion de Reil à ce sujet, 104. De la manière dont les nerfs naissent et se détachent les uns des autres, 105. Les nerfs ont des fonctions distinctes, et peuvent sous ce rapport être partagés en quatre classes, *ibid.* Travaux de Ch. Bell sur ce sujet, 106. De leur terminaison au cerveau, de leur volume comparé dans les différens animaux qui en sont pourvus, et dans les divers âges de la vie humaine, 110. De la moelle de l'épine et de ses fonctions, 112. Elle peut être regardée comme la base de l'appareil nerveux, 113. Organe spécial des mouvemens, tandis que le cerveau est exclusivement celui de la pensée, 114. La colonne vertébrale représente-t-elle une pile galvanique dont la moelle de l'épine seroit le conducteur? 116.

Des enveloppes du cerveau, 117. Mécanisme des os du crâne et de la face; solution d'un problème proposé par Bordeu à ce sujet 118. Usages du sphénoïde, 119. Avantages attachés à la forme arrondie du crâne, 126. Usages de la dure-mère et de ses replis, de l'arachnoïde et de la pie-mère, 127. Volume du cerveau, 128. La surface du cervau de l'homme l'emporte de beaucoup, pour l'étendue, sur celle que présente le cerveau, également plissé sur lui-même, des animaux les plus intelligens, 129. Forme et grosseur de la tête: de la ligne faciale, 130. Rapports entre la capacité du crâne et l'étendue des facultés intellectuelles, 132. Structure de la masse cérébrale, 134. De l'entrecroisement des nerfs, 135. Il y a dans le cerveau deux ordres de fibres, divergentes et convergentes, 136. L'action nerveuse, comme l'électricité, paroît s'exercer sur les surfaces 139. C'est par le cerveau surtout que les animaux diffèrent entre eux, 140. De ses principales différences chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons, 141. Des fonctions spéciales des diverses parties de l'encéphale, 143. Circulation cérébrale, 144. Le cerveau reçoit une grande quantité de sang artériel, qui y arrive par un mouvement dont plusieurs obstacles retardent considérablement la vitesse, 145. Structure des veines jugulaires, 147. Liaisons entre l'action du cerveau et celle du cœur, 148. La vie cesse au moment où le premier de ces viscères ne reçoit plus de sang artériel, 150. Théorie de la syncope, 151. Cet état dépend toujours de la cessation instantanée de l'action du cœur sur l'organe cérébral, 152. Ses causes immédiates ou sympathiques, 154. Des mouvemens du cerveau, 157. Erreurs des anciens, de Schlitting, de Haller et de Lamure à ce sujet, 158. Les mouvemens du cerveau lui sont communiqués par l'ensemble des artères placées à sa base, et sont parfaitement isochrones aux battemens de ces vaisseaux; la respiration n'est pour rien dans ce phénomène, 165. Expériences qui éclairent ce point de doctrine, 167. Action des nerfs et du cerveau, 175. Du principe du mouvement et du sentiment, 179. Du *sensorium commune*,

180. Il est probable que les différentes fonctions de l'entendement sont attribuées aux diverses parties du cerveau, 181. De notre ignorance à ce sujet, 182.

Analyse de l'entendement, 183. C'est le cerveau, et non point les nerfs, qui sent les impressions produites sur ces derniers. Sensibilité célébrale; sensibilité nutritive, 184. Le cerveau préexiste aux idées, 185. Perception; nous sentons en nous-mêmes, il n'est pas d'idées innées, 186. Du raisonnement et de l'instinct, 187. Des déterminations rationnelles et instinctives, 188. De l'instinct et de ses premières déterminations, 190. Génération des facultés de l'âme. Sensation, perception, attention, réminiscence, mémoire, imagination, association des idées, comparaison, jugement, raisonnement, 196-200. Nécessité d'exercer ces facultés, 200. De l'influence des signes sur la faculté de penser, 204. Analyse des idées, par Tracy; sensations, mémoire, jugement et volonté, 206. Altérations de la pensée, 208. Des rapports de l'état physique de ses organes avec ses dérangemens, 210. De l'idiotisme, 211. Du crâne et du cerveau des idiots; observations à ce sujet. Développement remarquable de leurs parties génitales; opposition entre l'énergie relative de l'organe reproducteur et de l'organe pensant, 212. Faits sur la dépendance dans laquelle la physique retient le moral, 214.

Des passions, 215. Toutes naissent des besoins, et supposent l'exaltation plus ou moins grande des facultés intellectuelles, 216. De leurs effets sur l'économie animale, 220.

Sommeil et veille, 223. Repos des fonctions qui mettent l'individu en rapport avec les objets qui l'environnent; état des fonctions assimilatrices pendant sa durée, 224. De sa durée, 226. De sa cause prochaine, 230. Songes et somnambulisme, 233. Ce sont des sommeils imparfaits, *ibid.* Les animaux y sont sujets comme l'homme, 234. Les sens ne peuvent se déplacer et se transporter dans l'épigastre et au bout des doigts. Conte ridicule à ce sujet, 239.

CHAPITRE VIII.

des Mouvemens.

Ce chapitre ne traite que des mouvemens volontaires, dont les organes peuvent être distingués en actifs et en passifs (os et muscles), 241. Structure et propriétés de la fibre musculaire, 242. Des tendons et des aponévroses, 245. Des déplacemens des muscles et de leurs tendons, 246. Phénomènes de la contraction musculaire, déterminée par un acte de la volonté, 247. L'intégrité des nerfs, des artères et des veines qui appartiennent à un muscle, est nécessaire à son action, 248. Théorie de cette action, 250. Observation de MM. Prévost et Dumas sur le mécanisme de la contraction musculaire, 252. Prépondérance des muscles fléchisseurs sur les extenseurs, 253. Les premiers sont plus forts, parce que leurs fibres sont plus longues, plus nombreuses, parce que leur insertion se fait aux os, plus loin du centre de leurs mouvemens, sous un angle plus ouvert, et qui s'agrandit encore à mesure que la flexion s'exécute, 256. Degrés variables de cette prépondérance, suivant l'âge, les maladies, l'état de force ou de foiblesse, 257. De la prostration, 259. De l'état général des forces dans les maladies, 260. Force des muscles : elle est relative au nombre de leurs fibres, 261. Degré de raccourcissement en raison de la longueur de ces mêmes fibres, 262. Déchet qu'elle éprouve, 263. Raisons de ce déchet, 264. Du fréquent emploi du levier du troisième genre dans le corps humain, 266. Du point fixe de l'action d'un muscle, 267. Direction des mouvemens imprimés par l'action des muscles, 269. Nature de la chair musculaire, 270. Du galvanisme, 272. Appareil de Volta, ou pile galvanique, 274. Des poissons électriques, 284. Applications de ce moyen au traitement des maladies, 285. De la cause productrice des phénomènes de la vie, 290.

Considération générale du système osseux, 294. De la colonne

vertébrale ; elle forme la partie vraiment essentielle et fondamentale du squelette, 296. Différences dans la hauteur de la stature mesurée le matin et le soir, 299. Composition des membres inférieurs, *ibid.* Structure des os, 301. Ce sont des moules celluleux, encroûtés de phosphate calcaire, 302. Usages du périoste et des sucs médullaires, 308. Théorie de la nécrose, 309. Articulations, 310. Cartilages articulaires, 311. Synovie, 312. Théorie de l'ankylose, 313. Ligamens et autres moyens d'union ou de symphyse, 316.

Mécanique animale. De la station, 319. Du centre de gravité du corps, 320. Tendance du corps à la chute, 321. La station est un état d'effort de la part des muscles extenseurs de nos membres, 322. Mode de station particulier aux oiseaux échassiers, *ibid.* Causes qui rendent, pour l'enfant nouveau-né, la station bipède impossible, 323. Pourquoi la station verticale est-elle particulière à l'espèce humaine, 333. Disposition avantageuse des organes, 334. Phénomènes et lois de la station, 335. Des chutes, 338. Station sur un seul pied, 339. Degré d'écartement des pieds, requis pour la solidité de la station, *ibid.* Station sur les genoux. Attitude assise, 341. Du coucher, *cubitus*, 342. Coucher sur les côtes, 343. Coucher sur le dos, 345. Sur le ventre, 346. Les diverses positions du coucher sont principalement relatives à la plus ou moins grande facilité de la respiration. Variétés suivant les âges, 348. Coucher sur un plan incliné. Nécessité de cette inclinaison, surtout pour les vieillards, 349. Mouvemens progressifs. De la marche, 350. De son mécanisme, de son obliquité, 352. De l'action de monter et de descendre, 353. Mécanisme de l'articulation du pied avec la jambe ; usages du mollet et du talon, 255. De la course, 360. De la force d'haleine, 361. Du saut, 363. Il résulte du déploiement subit des membres inférieurs, dont les articulations ont été préliminairement fléchies, 364. Animaux sauteurs, 365. Saut vertical ou oblique, 368. De la nage, 369. Difficile dans l'homme, facile dans les poissons, 370. De son mécanisme, 371. Des poissons volans, 372. Du vol, 373. De la structure du

corps des oiseaux, extrêmement avantageuse pour ce mouvement, 374. Manière dont ils l'exécutent, 375. De la reptation, 376. Tous les phénomènes qu'embrasse la mécanique animale se rapportent à la théorie du troisième levier, 382. Mouvemens partiels exécutés par les membres supérieurs, 383. Du grimper; répulsion, 384. Attraction, 385. De l'action de lancer au loin un mobile, *ibid.* De saisir et de presser, 386. Des mouvemens partiels étudiés comme signes expressifs des idées, 388. Des gestes et des attitudes, 389.

CHAPITRE IX.

De la Voix et de la Parole.

Définition de la voix et de la parole; condition nécessaire pour la formation de la voix, 370. Du larynx, de ses cartilages, de ses muscles intrinsèques et de ses nerfs; usages de ceux-ci; 392. La glotte est le véritable organe de la voix, 393. Opinions de Ferrein et de Dodart sur la matière dont elle y sert, 395. La production de la voix est l'effet de la contraction des muscles intrinsèques du larynx, et principalement des thyro-aryténoïdiens: ce son est donc le produit de l'action vitale, *ibid.* Le larynx remplit à la fois l'office d'un instrument à vent et d'un instrument à cordes, 398. De la force de la voix, 400. De la parole, 401. Pourquoi l'homme jouit-il seul de ce moyen de communiquer ses pensées, *ibid.* Des voyelles, 403. Génie des langues, 404. Des consonnes, 405. Chant et musique, *ibid.* Bégaiement et grasseyement, 407. Mutisme accidentel et de naissance, 409. Éducation des sourds et muets, 410. Engastrimsyme, 411. Explication de ce phénomène, 412. En quoi l'art du ventriloque diffère de celui du mime, 414.

DEUXIÈME CLASSE.

Fonctions de reproduction.

CHAPITRE X.

De la Génération.

Les fonctions de reproduction, si l'on n'avoit égard qu'à leur généralité et à leur importance, devroient précéder celles de relation, 417.

Différence de sexes, 418. Observation sur un défaut absolu de parties sexuelles, 419. L'hermaphrodisme n'existe jamais dans l'espèce humaine, 422. L'homme n'est point assujetti à l'influence des saisons dans l'exercice de ses fonctions génitales, 423. Des organes génitaux en général, 425. De ceux de l'homme, 426. Des organes de la génération dans la femme, 431. De la virginité physique, 434.

Conception, 436. Érection, 437. Du sperme humain, 439. Observations microscopiques de MM. Prévost et Dumas touchant les animalcules spermatiques, 440. Influence de la syphilis sur la fécondité, 441. Copulation, 443.

Conception, 444. De la part de chaque sexe dans l'acte reproducteur 447. Hypothèse de MM. Dumas et Prévost, 448. Le germe, d'abord amorphe, revêt successivement tous les caractères de l'animalité, 449. Usages des ovaires et des trompes de Fallope, 450. La mère secrète l'œuf que la liqueur spermatique doit animer, *ibid.* De la ressemblance des fils aux parens, 453. Des mulets, *ibid.* Des conceptions extra-utérines, 455. De la stérilité et de ses causes, 457. Systèmes sur la génération, 459. De la grossesse et de ses phénomènes, 460. Histoire

du fœtus et de ses enveloppes, 466. Du développement de ses organes, 467. Les animaux se forment de la circonférence au centre, et non du centre à la circonférence, comme on l'a enseigné jusqu'ici, 468. Preuves, 469. Mécanisme de la circulation du sang dans le fœtus, 475. Usages du placenta, 476. Du cordon ombilical, 478. Vie propre du fœtus, mode particulier de nutrition, 480. Il se nourrit par le cordon ombilical, 485. Maladies qu'il éprouve dans le sein de sa mère, 494. Des monstres, 496. De leurs diverses espèces, et de leurs causes, 497. La plupart des monstruosités existent sur la ligne médiane et dépendent de la non-réunion des deux moitiés du corps, 500. Observation sur une monstruosité remarquable, 501. De l'arrière-faix, du chorion, 505. De la membrane caduque : observations qui tendent à prouver qu'elle ressemble aux membranes séreuses, 506. De l'amnios et de sa liqueur, 507. De l'allantoïde et de l'ouraque, 508. Du terme naturel de la grossesse, 510. Des naissances tardives, 511. De l'accouchement et de ses causes déterminantes, 512. De son mécanisme; de la manière dont la tête du fœtus et les parties de la femme se prêtent à l'effectuer, 513. Du relâchement des symphyses, 514. Des jumeaux, 520. Le nombre des petits garçons est généralement supérieur à celui des petites filles, 522. Des superfétations, 523.

Allaitement, 524. Sympathie entre l'utérus et les mamelles; structure de celles-ci, 525. Mécanisme de leur sécrétion, 526. Le lait sembleroit apporté aux mamelles par les vaisseaux lymphatiques, 529. Il est cependant fourni par les artères, 530. Propriétés physiques du lait, 531. Nature chimique de cette humeur, 532. Des rapports qu'entretient l'enfant nouveau-né avec celle dont il tient le jour, 533. Nécessité d'une sorte d'incubation maternelle, 534. Fièvre puerpérale et lochies, 535. Du développement imparfait des poumons, 536.

CHAPITRE XI.

Contenant l'Histoire des Ages, des Tempéramens et des Variétés de l'espèce humaine; de la Mort et de la Putréfaction.

De l'enfance, 539. Ce n'est que vers le milieu du second mois que l'enfant exprime par le rire les sentimens agréables, *ibid.* Phénomènes de la dentition, 540. Ossification, 542. Développement des facultés intellectuelles, 545. Phénomènes de la puberté, 546. Rapport entre le développement des parties sexuelles et celui des organes de la voix, 547. Menstruation, 548. De l'apparition des règles; de leurs déviations, 550. De leur quantité et de leur durée, 552. De leurs causes, 553. De leur cessation, 554. Age viril, 556.

Tempéramens, 557. Sanguin, ou dépendant de la prédominance du système circulatoire, 560. Musculaire, produit par l'excessif développement des muscles, 562. Bilieux, provenant de l'énergie relative du foie, jointe à une grande activité du système sanguin, 565. Mélancolique, 566. Exemples, 567. Tempérament lymphatique caractérisé par la réplétion de ce système, 575. Nerveux, 578. Tempéramens mixtes et acquis, 579. Influence du climat sur les tempéramens, 580.

Variétés de l'espèce humaine, 583. Race arabe européenne, 584. Nègre, 585. Mongole, *ibid.* Hyperboréenne; 586. Caractères moraux des races humaines, 587. Des géans et des nains, 590.

De la vieillesse et de la décrépitude, 591. Chute des forces, perte des propriétés, ramollissement de certains organes, durcissement de plusieurs autres, 593. Maigreur favorable à la longévité, *ibid.* De la mort, 597. De la manière graduelle dont la vie s'éteint, et des organes qui cessent les derniers d'agir, 598. Abolition successive des facultés intellectuelles, 600.

Époque de la mort, 602. Probabilités de la vie humaine, 604. Terme moyen de sa durée, 608. Histoire de la putréfaction, 610. De son objet, 617.

FIN DE LA TABLE.

KING'S COLLEGE LONDON